平成 27 年度

# 事　業　年　報

公益財団法人福岡県結核予防会

平成 29 年 7 月 1 日発行

# 目　　次


１．事業概要　・・・・・　1
（1）巡回健診事業
（2）福岡結核予防センター事業
（3）県庁内診療所事業

２．学校保健　・・・・・　3
（1）胸部Ｘ線
（2）尿検査

３．地域保健　・・・・・　5
（1）特定健康診査
（2）結核
（3）胃がん
（4）大腸がん
（5）前立腺がん

４．産業保健　・・・・・　16
（1）定期健診・生活習慣病健診
（2）人間ドック
（3）胸部Ｘ線
（4）胃がん
（5）大腸がん
（6）子宮がん
（7）乳がん
（8）前立腺がん
（9）腹部超音波
（10）特殊検診
（11）特定健診（再掲）

５．健康支援　・・・・・　49

６．精度管理　・・・・・　50

７．普及啓発　・・・・・　52

８．調査研究　・・・・・　55

## １．事業概要

労働安全衛生法、高齢者の医療の確保に関する法律、学校保健安全法及び感染症法等に基づき、福岡結核予防センター及び県庁内診療所において事業所、地域住民及び児童・生徒等を対象とした定期健康診断、生活習慣病予防健診、人間ドック、がん健診、特定健診・特定保健指導及び予防接種並びに一般診療、療養指導、保健指導等を実施するとともに、県内各地に所在する市町村、事業所及び学校等を対象に総合的な巡回健康診断を実施した。

| （1）巡回健診事業 | 平成 27 年度 | （平成 26 年度） |
|---|---|---|
| 胸部間接撮影 | １，４０４人 | （ ３２，０３９人） |
| 胸部直接撮影 | ０人 | （ ２５２人） |
| 胸部ＣＲ撮影 | ８０，３０４人 | （ ４７，５２９人） |
| 高齢者医療確保法健診 | ２，４２３人 | （ ２，０５６人） |
| 労働安全衛生法健診 | ２４，１０４人 | （ ２３，９５２人） |
| 生活習慣病予防健診 | ２６，３７７人 | （ ２７，２５０人） |
| 特定健康診査（再掲） | ２６，８６１人 | （ ２７，７３７人） |
| 胃部間接撮影 | ２，１９２人 | （ ２，１８１人） |
| 胃部ＤＲ撮影 | ７，８９７人 | （ ７，９１６人） |
| 心電図検査 | ３７，３０２人 | （ ３７，８１０人） |
| 喀痰細胞診検査 | １３０人 | （ ２０人） |
| 特殊検診 | １０，８８４人 | （ ９，９２３人） |

| （2）福岡結核予防センター事業 | 平成 27 年度 | （平成 26 年度） |
|---|---|---|
| 新　患 | １，２１２人 | （ １，３１５人） |
| 旧患（延） | ２，６１８人 | （ ２，１６３人） |
| 胸部ＣＲ撮影 | ２９，６８０人 | （ ２９，９５２人） |
| ＣＴスキャナ | ４７０人 | （ ４９７人） |
| 胃部直接撮影 | １，３７３人 | （ １，２６１人） |
| 胃部ＤＲ撮影 | ９，５９７人 | （ １０，１７４人） |
| 胃カメラ検査 | ２，６５８人 | （ ２，３５２人） |
| マンモグラフィー検査 | ２，８６７人 | （ ２，７７０人） |
| 乳腺エコー検査 | ７１５人 | （ ５５３人） |
| 労働安全衛生法健診 | ８，６９８人 | （ ９，０４５人） |
| 生活習慣病予防健診 | ９，２３９人 | （ ８，７４９人） |
| 人間ドック健診 | ３，８７７人 | （ ３，９０５人） |
| 特定健康診査（再掲） | １１，４６４人 | （ １１，４０８人） |
| 採用時健診 | ３，９３９人 | （ ４，７９８人） |
| 進学時健診 | １３２人 | （ １２０人） |
| 特殊健診 | ９６５人 | （ ９０５人） |
| 海外渡航ビザ健診 | ６７９人 | （ ９１５人） |

| (3) 県庁内診療所事業 | 平成 27 年度 | （平成 26 年度） |
|---|---|---|
| ［内　科］ | | |
| 新　患 | １，０６３人 | （　１，０６４人） |
| 旧患（延） | １，１９６人 | （　１，２８７人） |
| ［歯　科］ | | |
| 新　患 | ６３５人 | （　６６０人） |
| 旧患（延） | ２，３４９人 | （　２，１９０人） |
| ［健診内科］ | | |
| 胸部ＣＲ撮影 | ３，８４１人 | （　４，３１０人） |
| 胃部ＤＲ撮影 | ３１３人 | （　２９８人） |
| 労働安全衛生法健診 | ８１人 | （　４６人） |
| 生活習慣病予防健診 | ２，１８５人 | （　２，１８４人） |
| 人間ドック健診 | １４６人 | （　１３９人） |
| 特定健康診査（再掲） | １，２１９人 | （　１，３９５人） |
| 採用時健診 | ７０７人 | （　１，３５２人） |
| 進学時健診 | ８人 | （　１８人） |
| 特殊検診 | ５１６人 | （　６５２人） |
| ［健診歯科］ | | |
| 産業歯科健診 | ７４人 | （　２１人） |
| 産業歯科特殊健診 | ４０人 | （　２１人） |

## ２．学校保健

（1）胸部Ｘ線

平成 27 年度の学校健診のうち、間接撮影・直接撮影・デジタル撮影による高校、大学、その他学校の胸部Ｘ線受診者は、25,363 人でした。精検指示数は 76 人（精検指示率 0.30％）、精検受診者 67 人（精検受診率 88.16％）で、結核発見者は 3 人でした。

**平成27年度学校胸部X線統計（間接・デジタルの合計）**

| 単位人 | 学年 | X線撮影数 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精検指示数 | 精検受診数 | 肺・縦隔腫瘍 | 肺結核要医療 | 肺結核要観察 | 肺結核治療不要 | その他呼吸器疾患 | 循環器系疾患 | その他異常 | 異常なし | 結果不明 |
| 男 | 高校1年 | 5,046 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 13 | 0 |
| | 高校その他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 短大・大学 | 4,171 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | その他学校 | 1,850 | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 男計 | 11,069 | 37 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 15 | 0 |
| 女 | 高校1年 | 4,931 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| | 高校その他 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 短大・大学 | 7,793 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| | その他学校 | 1,418 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 女計 | 14,294 | 39 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 20 | 0 |
| | 合計 | 25,363 | 76 | 67 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 9 | 35 | 0 |
| | （%） | | (0.30) | (0.26) | (0.00) | (0.01) | (0.00) | (0.01) | (0.03) | (0.03) | (0.04) | (0.14) | (0.00) |

（2）尿検査

平成 27 年度の学校健診のうち、尿検査の小学校、中学校、高校、その他学校の一次受診者は、18,489 人でした。陽性者数は 660 人（精検指示率 3.57%）でした。一次陽性者は、早朝尿を持参し、再度の陽性であれば福岡市立学校は、福岡市医師会腎臓検診部会の判定を経て、精密検査となります。他の学校は、専門医受診となっています。

**平成27年度学校尿検査統計**

| 単位人 | 学年 | 一次実施数 | 陽性者数 | 陽性者内訳 | | | 一次もれ含む二次実施数 | 陽性者数 | 陽性者内訳 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 蛋白 | 糖 | 潜血 | | | 蛋白 | 糖 | 潜血 |
| 男 | 幼稚園 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小学校 | 6549 | 70 | 20 | 0 | 52 | 164 | 14 | 1 | 0 | 13 |
| | 中学校 | 2948 | 75 | 42 | 2 | 31 | 147 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| | 高校 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | その他学校 | 115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 男計 | 9644 | 147 | 63 | 2 | 84 | 327 | 29 | 10 | 0 | 19 |
| 女 | 幼稚園 | 27 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 小学校 | 6058 | 202 | 36 | 2 | 167 | 261 | 26 | 3 | 0 | 24 |
| | 中学校 | 2681 | 302 | 37 | 1 | 269 | 372 | 30 | 12 | 0 | 21 |
| | 高校 | 0 | | | | | 0 | | | | |
| | その他学校 | 79 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 女計 | 8845 | 513 | 75 | 4 | 443 | 654 | 59 | 15 | 1 | 46 |
| | 合計 | 18489 | 660 | 138 | 6 | 527 | 981 | 88 | 25 | 1 | 65 |
| | (%) | | (3.57) | (0.75) | (0.03) | (2.85) | (5.31) | (0.48) | (0.14) | (0.01) | (0.35) |

## ３．地域保健

（1）特定健康診査

平成 20 年度より老人保健法が廃止され、新たに高齢者の医療の確保に関する法律が制定されました。これによりメタボリックシンドロームに着目した特定健康診査を行い、生活習慣病の発症・重症化の危険因子の保有状況により受診者を階層化し、特定保健指導を行うことになりました。

平成 27 年度の特定健診の受診者は 1,640 人、メタボリック症候群該当者は 256 人（15.6%）、予備群は 177 人（10.8%）となりました。保健指導区分としては、積極的支援 39 人（2.4%）、動機付け支援 118 人（7.2%）となっています。

**平成27年度住民健診統計1**

| | | 受診者数 | メタボリックシンドローム | | | 保健指導区分別実人員 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 単位:人 | 健康診査 | 該当者 | 予備群 | 非該当 | 情報提供 | 動機付け支援 | 積極的支援 | 受診勧奨服薬中 |
| 男 | ～39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40～49歳 | 65 | 8 | 6 | 51 | 45 | 5 | 9 | 6 |
| | 50～59歳 | 66 | 21 | 6 | 39 | 31 | 2 | 11 | 22 |
| | 60～64歳 | 100 | 25 | 17 | 58 | 42 | 4 | 11 | 43 |
| | 65～69歳 | 267 | 83 | 47 | 137 | 83 | 43 | 0 | 141 |
| | 70～74歳 | 176 | 42 | 34 | 100 | 46 | 22 | 0 | 108 |
| | 75歳以上 | 23 | 8 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 16 |
| | 男計 | 697 | 187 | 114 | 396 | 252 | 78 | 31 | 336 |
| 女 | ～39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40～49歳 | 99 | 1 | 5 | 93 | 91 | 4 | 1 | 3 |
| | 50～59歳 | 128 | 10 | 6 | 112 | 91 | 2 | 5 | 30 |
| | 60～64歳 | 198 | 9 | 10 | 179 | 119 | 6 | 2 | 71 |
| | 65～69歳 | 312 | 29 | 29 | 254 | 140 | 23 | 0 | 149 |
| | 70～74歳 | 190 | 20 | 11 | 159 | 73 | 4 | 0 | 113 |
| | 75歳以上 | 16 | 0 | 2 | 14 | 4 | 1 | 0 | 11 |
| | 女計 | 943 | 69 | 63 | 811 | 518 | 40 | 8 | 377 |
| 合計 | | 1,640 | 256 | 177 | 1,207 | 770 | 118 | 39 | 713 |
| （%） | | | (15.6) | (10.8) | (73.6) | (47.0) | (7.2) | (2.4) | (43.5) |

年度ごとの人数推移

| | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定健康診査 | | 3,526 | 3,474 | 1,526 | 1,644 | 1,640 |
| メタボリックシンドローム | 該当者 | 417 | 442 | 215 | 254 | 256 |
| | 予備群 | 374 | 376 | 174 | 190 | 177 |
| | 非該当 | 2,735 | 2,656 | 1,137 | 1,200 | 1,207 |
| 保健指導区分 | 情報提供 | 3,096 | 3,054 | 1,373 | 1,488 | 1,483 |
| | 動機付け支援 | 301 | 303 | 122 | 127 | 118 |
| | 積極的支援 | 129 | 117 | 31 | 29 | 39 |






**平成27年度住民健診統計2**

| | 単位:人 | 血圧 | | 脂質 | | 糖尿病 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 正常高値 | 高血圧症有病者 | 脂質異常 | 脂質異常有病者 | 糖尿病予備軍 | 糖尿病有病者 | 貧血(疑いを含む。) |
| 男 | ～39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40～49歳 | 11 | 11 | 21 | 19 | 6 | 2 | 2 |
| | 50～59歳 | 8 | 28 | 22 | 26 | 6 | 4 | 3 |
| | 60～64歳 | 8 | 55 | 30 | 41 | 30 | 2 | 0 |
| | 65～69歳 | 31 | 159 | 80 | 122 | 54 | 15 | 7 |
| | 70～74歳 | 19 | 102 | 44 | 69 | 31 | 20 | 4 |
| | 75歳以上 | 1 | 14 | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 |
| | 計 | 78 | 369 | 200 | 286 | 131 | 44 | 16 |
| 女 | ～39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40～49歳 | 3 | 9 | 17 | 17 | 2 | 1 | 14 |
| | 50～59歳 | 9 | 36 | 25 | 57 | 16 | 4 | 13 |
| | 60～64歳 | 15 | 58 | 42 | 119 | 21 | 4 | 7 |
| | 65～69歳 | 48 | 136 | 65 | 204 | 47 | 7 | 10 |
| | 70～74歳 | 21 | 98 | 37 | 112 | 28 | 5 | 3 |
| | 75歳以上 | 1 | 11 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| | 計 | 97 | 348 | 188 | 520 | 114 | 23 | 47 |
| 合計 (%) | | 175 (10.7) | 717 (43.7) | 388 (23.7) | 806 (49.1) | 245 (14.9) | 67 (4.1) | 63 (3.8) |

**平成27年度住民健診統計3**

| | 単位:人 | 肝疾患（疑いを含む。） | （再掲）うちアルコール性（疑いを含む。） | 腎機能障害（疑いを含む。） | たばこ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 吸っていない | 吸っている |
| 男 | ～39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40～49歳 | 26 | 19 | 18 | 33 | 32 |
| | 50～59歳 | 22 | 17 | 27 | 38 | 28 |
| | 60～64歳 | 45 | 26 | 38 | 59 | 41 |
| | 65～69歳 | 89 | 63 | 118 | 197 | 70 |
| | 70～74歳 | 57 | 36 | 88 | 150 | 26 |
| | 75歳以上 | 2 | 1 | 16 | 20 | 3 |
| | 計 | 241 | 162 | 305 | 497 | 200 |
| 女 | ～39歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40～49歳 | 7 | 2 | 39 | 83 | 16 |
| | 50～59歳 | 26 | 6 | 62 | 117 | 11 |
| | 60～64歳 | 33 | 8 | 106 | 190 | 8 |
| | 65～69歳 | 50 | 2 | 208 | 304 | 8 |
| | 70～74歳 | 27 | 2 | 129 | 187 | 3 |
| | 75歳以上 | 3 | 1 | 13 | 15 | 1 |
| | 計 | 146 | 21 | 557 | 896 | 47 |
| 合計 | | 387 | 183 | 862 | 1,393 | 247 |
| （%） | | (23.6) | (11.2) | (52.6) | (84.9) | (15.1) |

(2) 結核、肺がん検診

平成 27 年度の住民健診の結核、肺がん検診胸部Ｘ線受診者は、1,710 人でした。精検指示者 17 人（0.99%）、精検受診者 14 人（精検受診率 82.35%）でした。肺がん 2 人、結核 1 人を発見しています。

**平成27年度住民肺がん検診統計**

| | | 受診者数 | | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年齢<br>単位:人 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影 | 喀痰細胞診 | 精検指示数 | 精検受診数 | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核要医療 | 肺結核要観察 | 肺結核治癒 | 他呼吸器 | 循環器 | 他異常 | 異常無 | 結果不明 |
| 男 | ～19 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 25～29 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 60 | 3 | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 39 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 31 | 5 | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 47 | 11 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| | 60～64 | 122 | 16 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| | 65～69 | 265 | 37 | 3 | 2 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 |
| | 70～74 | 153 | 18 | 4 | 4 | | | | | | | | | 4 | | |
| | 75～79 | 49 | 10 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| | 80～ | 13 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | 男計 | 779 | 103 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 女 | ～19 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 25～29 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 73 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 57 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 70 | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 95 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| | 60～64 | 189 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| | 65～69 | 255 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 70～74 | 142 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| | 75～79 | 41 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80～ | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| | 女計 | 931 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計<br>(%) | | 1,710 | 111 | 17<br>(0.99) | 14<br>(0.82) | 2<br>(0.12) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 1<br>(0.06) | 0<br>(0.00) | 1<br>(0.06) | 3<br>(0.18) | 0<br>(0.00) | 7<br>(0.41) | 0<br>(0.00) | 3<br>(0.18) |

年度ごとの人数推移（結核、肺がん検診の胸部X線）

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸部X線受診者 | 4,730 | 5,482 | 4,110 | 1,808 | 1,710 |
| 精検指示数 | 139 | 107 | 85 | 13 | 17 |
| 精検指示率 | 2.94 | 1.95 | 2.07 | 0.72 | 0.99 |
| 精検受診数 | 129 | 97 | 70 | 10 | 14 |
| 精検受診率 | 92.81 | 90.65 | 82.35 | 76.92 | 82.35 |






(3) 胃がん

平成 27 年度の住民健診の胃部X線受診者は、1,470 人でした。精検指示者 110 人（7.48%）、精検受診者 93 人（精検受診率 84.55%）でした。胃がん 2 人発見しています。

**平成27年度住民胃がん検診統計**

| | | 受診者数 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年齢<br>単位:人 | 胃透視 | 精検指示数 | 精検受診数 | 胃がん | 非上皮性悪性腫瘍 | 胃腺腫（異型上皮） | 胃ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含） | その他良性疾患 | 異常なし | 不明※1 | その他※2 |
| 男 | ～29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 54 | 3 | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 45～49 | 42 | 3 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 50～54 | 26 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 |
| | 55～59 | 39 | 3 | 3 | | | | 1 | | 2 | | | |
| | 60～64 | 114 | 12 | 9 | | | | | 3 | 4 | 2 | | |
| | 65～69 | 218 | 22 | 16 | | | | 1 | 3 | 7 | 2 | | 3 |
| | 70～74 | 124 | 13 | 12 | 1 | | | 1 | 3 | 4 | 3 | | |
| | 75～79 | 41 | 6 | 3 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| | 80～ | 10 | 2 | 2 | | | | | | 1 | 1 | | |
| | 男計 | 669 | 66 | 52 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 20 | 11 | 1 | 4 |
| 女 | ～29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 69 | 3 | 3 | | | | | | 2 | 1 | | |
| | 45～49 | 61 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | |
| | 50～54 | 73 | 3 | 3 | | | | 1 | | 1 | 1 | | |
| | 55～59 | 79 | 5 | 4 | | | | 1 | | 1 | 2 | | |
| | 60～64 | 156 | 7 | 7 | | | | 1 | | 5 | 1 | | |
| | 65～69 | 214 | 18 | 16 | | | | 2 | 1 | 5 | 6 | | 2 |
| | 70～74 | 104 | 3 | 3 | | | | 1 | | 2 | | | |
| | 75～79 | 33 | 4 | 4 | | | | 1 | | 2 | 1 | | |
| | 80～ | 11 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 女計 | 801 | 44 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | 13 | 0 | 2 |
| 合計（%） | | 1470 | 110<br>(7.48) | 93<br>(6.33) | 2<br>(0.14) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 11<br>(0.75) | 11<br>(0.75) | 38<br>(2.59) | 24<br>(1.63) | 1<br>(0.07) | 6<br>(0.41) |

※1 不明(例 胃切除 等)

※2 その他(例 胃がん疑い、食道がん、食道ポリープ、食道炎、十二指腸潰瘍 等)

年度ごとの人数推移

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃部X線受診者 | 830 | 1,015 | 1,075 | 1,377 | 1,470 |
| 精検指示数 | 69 | 97 | 97 | 137 | 110 |
| 精検指示率 | 8.31 | 9.56 | 9.02 | 9.95 | 7.48 |
| 精検受診数 | 60 | 79 | 83 | 113 | 93 |
| 精検受診率 | 86.96 | 81.44 | 85.57 | 82.48 | 84.55 |






（4）大腸がん

平成 27 年度の住民健診の便潜血受診者は、2,074 人でした。精検指示者 119 人（5.74%）、精検受診者 99 人（精検受診率 83.19%）でした。大腸がん 7 人を発見しています。

**平成27年度住民大腸がん統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 便潜血 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精検指示数 | 精検受診数 | 大腸がん | 非上皮性悪性腫瘍 | カルチノイド | 線腫性ポリープ | 非線腫性ポリープ | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 | 大腸憩室 | その他大腸良性疾患 | 異常なし | 不明 | その他※1 |
| 男 | ～29 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 63 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 45～49 | 49 | 3 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 50～54 | 40 | 3 | 3 | | | | 2 | | | | | | 1 | | |
| | 55～59 | 56 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 60～64 | 174 | 13 | 9 | | | | 6 | | | | | 1 | 2 | | |
| | 65～69 | 243 | 20 | 17 | 3 | | | 6 | 2 | | | 2 | 3 | 1 | | |
| | 70～74 | 173 | 15 | 14 | 2 | | | 4 | | | | 1 | 2 | 5 | | |
| | 75～79 | 35 | 4 | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | |
| | 80～ | 10 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 男計 | 849 | 61 | 51 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 |
| 女 | ～29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 130 | 8 | 7 | | | | 4 | | | | | 1 | 2 | | |
| | 45～49 | 120 | 4 | 3 | | | | 2 | | | | | | 1 | | |
| | 50～54 | 118 | 3 | 3 | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| | 55～59 | 155 | 10 | 9 | | | | 4 | | | | | 1 | 4 | | |
| | 60～64 | 250 | 8 | 5 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | 2 | | |
| | 65～69 | 263 | 15 | 14 | 1 | | | 6 | | | | | 2 | 5 | | |
| | 70～74 | 140 | 6 | 3 | | | | 1 | | | | 2 | | | | |
| | 75～79 | 35 | 4 | 4 | | | | 2 | | | | 1 | | 1 | | |
| | 80～ | 12 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 女計 | 1225 | 58 | 48 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 合計<br>（%） | | 2074 | 119<br>(5.74) | 99<br>(4.77) | 7<br>(0.34) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 40<br>(1.93) | 3<br>(0.14) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 10<br>(0.48) | 11<br>(0.53) | 28<br>(1.35) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) |

※1 その他（例 大腸がん疑い、大腸検診で胃がんが見つかった場合 等）

年度ごとの人数推移

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 便潜血受診者 | 1,561 | 1,194 | 1340 | 2,024 | 2074 |
| 精検指示数 | 108 | 75 | 97 | 114 | 119 |
| 精検指示率 | 6.92 | 6.28 | 7.24 | 5.63 | 5.74 |
| 精検受診数 | 79 | 60 | 76 | 79 | 99 |
| 精検受診率 | 73.15 | 80.00 | 78.35 | 69.30 | 83.19 |






(5) 前立腺がん

平成 27 年度の住民健診の前立腺がん（PSA 検査）受診者は、620 人でした。精検指示者 23 人（3.71%）、精検受診者 14 人（精検受診率 60.87%）でした。前立腺がんの発見はありませんでした。

**平成27年度住民前立腺がん統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精検指示数 | 精検受診数 | 前立腺がん | 前立腺がん疑い | 前立腺肥大 | その他のがん | その他 | 異常なし | 結果不明 |
| | 40～44 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 45～49 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 50～54 | 31 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 55～59 | 47 | 2 | 2 | | | 1 | | 1 | | |
| | 60～64 | 126 | 3 | 1 | | | 1 | | | | |
| | 65～69 | 226 | 10 | 6 | | 1 | 1 | | | 4 | |
| | 70～ | 190 | 8 | 5 | | | 2 | | 1 | 2 | |
| 合計<br>(%) | | 620 | 23<br>(3.71) | 14<br>(2.26) | 0<br>(0.00) | 1<br>(0.16) | 5<br>(0.81) | 0<br>(0.00) | 2<br>(0.32) | 6<br>(0.97) | 0<br>(0.00) |

## ４．産業保健

（1）定期健診・生活習慣病健診

平成 27 年度の事業所健診は、巡回、福岡結核予防センター、県庁内診療所で、それぞれに実施し、総合判定ごとの人数統計をとった。合計での実施数は 70,003 人。判定ごとの割合は、

1 異常なし 23.73%、2 ほぼ正常 8.37%、3 要観察 6ヶ月 26.07%、4 要観察 3ヶ月 26.83%

5 要精密 11.26%、6 要受診 3.74%、7 治療中再掲 12.51%、8 管理中再掲 2.25%となっています。

**平成27年度巡回定期･生活習慣病健診統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者数 | 総合判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1<br>異常なし | 2<br>ほぼ正常 | 3<br>要観察<br>6ヶ月 | 4<br>要観察<br>3ヶ月 | 5<br>要精密 | 6<br>要受診 | 7<br>治療中<br>再掲 | 8<br>管理中<br>再掲 |
| 男 | ～19 | 514 | 289 | 56 | 110 | 28 | 29 | 2 | 3 | 2 |
| | 20～24 | 2,133 | 920 | 223 | 668 | 208 | 90 | 24 | 8 | 5 |
| | 25～29 | 4,013 | 1,376 | 380 | 1,367 | 666 | 119 | 105 | 26 | 11 |
| | 30～34 | 4,169 | 968 | 403 | 1,382 | 1,047 | 227 | 142 | 82 | 20 |
| | 35～39 | 3,987 | 645 | 292 | 1,249 | 1,303 | 319 | 179 | 216 | 38 |
| | 40～44 | 3,507 | 395 | 218 | 1,074 | 1,240 | 374 | 206 | 348 | 44 |
| | 45～49 | 2,772 | 204 | 132 | 872 | 986 | 364 | 214 | 524 | 67 |
| | 50～54 | 3,233 | 189 | 119 | 912 | 1,268 | 514 | 231 | 969 | 111 |
| | 55～59 | 3,565 | 200 | 153 | 907 | 1,452 | 582 | 271 | 1,416 | 193 |
| | 60～64 | 2,359 | 85 | 68 | 765 | 907 | 404 | 130 | 1,115 | 176 |
| | 65～69 | 642 | 36 | 22 | 176 | 257 | 120 | 31 | 320 | 49 |
| | 70～74 | 149 | 30 | 5 | 31 | 53 | 24 | 6 | 85 | 4 |
| | 75～ | 273 | 153 | 22 | 26 | 41 | 25 | 6 | 39 | 7 |
| | 男計 | 31,316 | 5,490 | 2,093 | 9,539 | 9,456 | 3,191 | 1,547 | 5,151 | 727 |
| 女 | ～19 | 1,060 | 626 | 117 | 120 | 123 | 70 | 4 | 4 | 4 |
| | 20～24 | 2,236 | 1,104 | 348 | 314 | 296 | 158 | 16 | 7 | 9 |
| | 25～29 | 2,356 | 1,130 | 367 | 391 | 285 | 166 | 17 | 14 | 15 |
| | 30～34 | 1,823 | 680 | 303 | 354 | 300 | 158 | 28 | 25 | 13 |
| | 35～39 | 1,702 | 538 | 223 | 355 | 373 | 173 | 40 | 41 | 19 |
| | 40～44 | 1,834 | 454 | 217 | 416 | 478 | 226 | 43 | 68 | 40 |
| | 45～49 | 1,900 | 347 | 184 | 474 | 584 | 250 | 61 | 165 | 66 |
| | 50～54 | 1,897 | 250 | 158 | 413 | 710 | 301 | 65 | 274 | 78 |
| | 55～59 | 1,811 | 202 | 112 | 431 | 708 | 304 | 54 | 394 | 88 |
| | 60～64 | 906 | 76 | 33 | 223 | 381 | 155 | 38 | 258 | 45 |
| | 65～69 | 249 | 30 | 14 | 52 | 116 | 30 | 7 | 90 | 14 |
| | 70～74 | 96 | 41 | 5 | 12 | 26 | 7 | 5 | 31 | 4 |
| | 75～ | 1,137 | 873 | 57 | 74 | 53 | 72 | 8 | 68 | 13 |
| | 女計 | 19,007 | 6,351 | 2,138 | 3,629 | 4,433 | 2,070 | 386 | 1,439 | 408 |
| 合計<br>（%） | | 50,323 | 11,841<br>(23.53) | 4,231<br>(8.41) | 13,168<br>(26.17) | 13,889<br>(27.60) | 5,261<br>(10.45) | 1,933<br>(3.84) | 6,590<br>(13.10) | 1,135<br>(2.26) |

※ コンピュータ集計分

**平成27年度福岡結核予防センター定期・生活習慣病健診統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者数 | 総合判定<br>1<br>異常なし | 2<br>ほぼ正常 | 3<br>要観察<br>6ヶ月 | 4<br>要観察<br>3ヶ月 | 5<br>要精密 | 6<br>要受診 | 7<br>治療中<br>再掲 | 8<br>管理中<br>再掲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | ～19 | 73 | 50 | 10 | 8 | 3 | 2 | | 1 | 1 |
| | 20～24 | 504 | 241 | 44 | 145 | 51 | 14 | 9 | 1 | 1 |
| | 25～29 | 1,094 | 461 | 62 | 361 | 149 | 50 | 11 | 5 | 6 |
| | 30～34 | 1,327 | 388 | 92 | 466 | 274 | 80 | 27 | 24 | 11 |
| | 35～39 | 1,424 | 237 | 61 | 493 | 388 | 185 | 60 | 45 | 7 |
| | 40～44 | 1,253 | 130 | 48 | 392 | 432 | 178 | 73 | 90 | 23 |
| | 45～49 | 982 | 56 | 48 | 281 | 396 | 150 | 51 | 146 | 20 |
| | 50～54 | 780 | 43 | 28 | 198 | 313 | 148 | 50 | 177 | 26 |
| | 55～59 | 755 | 30 | 29 | 175 | 307 | 168 | 46 | 269 | 42 |
| | 60～64 | 788 | 32 | 37 | 158 | 337 | 186 | 38 | 328 | 52 |
| | 65～69 | 470 | 20 | 22 | 100 | 199 | 110 | 19 | 239 | 38 |
| | 70～74 | 88 | 10 | | 14 | 41 | 21 | 2 | 49 | 4 |
| | 75～ | 21 | | 1 | 3 | 12 | 5 | | 10 | |
| | 男計 | 9,559 | 1,698 | 482 | 2,794 | 2,902 | 1,297 | 386 | 1,384 | 231 |
| 女 | ～19 | 113 | 72 | 12 | 20 | 6 | 3 | | | |
| | 20～24 | 698 | 397 | 91 | 102 | 61 | 39 | 8 | 6 | 2 |
| | 25～29 | 1,204 | 605 | 176 | 216 | 136 | 53 | 18 | 8 | 5 |
| | 30～34 | 1,214 | 535 | 174 | 235 | 151 | 102 | 17 | 16 | 5 |
| | 35～39 | 1,123 | 331 | 163 | 201 | 226 | 165 | 37 | 20 | 16 |
| | 40～44 | 1,056 | 270 | 146 | 211 | 225 | 156 | 48 | 36 | 20 |
| | 45～49 | 882 | 174 | 81 | 182 | 254 | 146 | 45 | 71 | 24 |
| | 50～54 | 727 | 110 | 61 | 143 | 256 | 123 | 34 | 71 | 29 |
| | 55～59 | 623 | 81 | 42 | 125 | 243 | 100 | 32 | 106 | 20 |
| | 60～64 | 450 | 55 | 25 | 89 | 172 | 81 | 28 | 134 | 30 |
| | 65～69 | 250 | 35 | 24 | 47 | 97 | 39 | 8 | 96 | 17 |
| | 70～74 | 52 | 4 | 3 | 13 | 25 | 5 | 2 | 28 | 2 |
| | 75～ | 24 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | | 11 | 1 |
| | 女計 | 8,416 | 2,670 | 999 | 1,588 | 1,867 | 1,015 | 277 | 603 | 171 |
| 合計<br>(%) | | 17,975 | 4,368<br>(24.30) | 1,481<br>(8.24) | 4,382<br>(24.38) | 4,769<br>(26.53) | 2,312<br>(12.86) | 663<br>(3.69) | 1,987<br>(11.05) | 402<br>(2.24) |

※ コンピュータ集計分

**平成27年度県庁内診療所定期・生活習慣病健診統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者数 | 総合判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1<br>異常なし | 2<br>ほぼ正常 | 3<br>要観察<br>6ヶ月 | 4<br>要観察<br>3ヶ月 | 5<br>要精密 | 6<br>要受診 | 7<br>治療中<br>再掲 | 8<br>管理中<br>再掲 |
| 男 | ～19 | 2 | 2 | | | | | | | |
| | 20～24 | 57 | 18 | 12 | 22 | | 5 | | 1 | |
| | 25～29 | 200 | 68 | 22 | 73 | 2 | 35 | | 3 | |
| | 30～34 | 144 | 53 | 11 | 58 | 2 | 18 | 2 | 6 | 2 |
| | 35～39 | 166 | 37 | 15 | 66 | 13 | 34 | 1 | 7 | 4 |
| | 40～44 | 167 | 21 | 11 | 85 | 13 | 35 | 2 | 14 | 3 |
| | 45～49 | 166 | 22 | 6 | 76 | 16 | 45 | 1 | 29 | 4 |
| | 50～54 | 141 | 11 | 7 | 63 | 16 | 38 | 6 | 31 | 8 |
| | 55～59 | 119 | 16 | 5 | 43 | 22 | 32 | 1 | 33 | 4 |
| | 60～64 | 57 | | | 27 | 11 | 18 | 1 | 22 | 4 |
| | 65～69 | 20 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 |
| | 70～74 | 6 | 1 | | 1 | | 4 | | 3 | |
| | 75～ | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 男計 | 1,246 | 252 | 90 | 523 | 100 | 265 | 16 | 162 | 30 |
| 女 | ～19 | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 56 | 22 | 10 | 17 | 2 | 5 | | | |
| | 25～29 | 123 | 48 | 14 | 55 | 2 | 3 | 1 | | 4 |
| | 30～34 | 45 | 15 | 9 | 13 | 3 | 5 | | | |
| | 35～39 | 82 | 19 | 16 | 33 | 5 | 9 | | 2 | 1 |
| | 40～44 | 55 | 21 | 6 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| | 45～49 | 45 | 17 | | 17 | 4 | 6 | 1 | 5 | |
| | 50～54 | 25 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | | 4 | 2 |
| | 55～59 | 14 | 2 | 1 | 3 | | 7 | 1 | 4 | |
| | 60～64 | 12 | | | 10 | | 2 | | 2 | 1 |
| | 65～69 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 70～74 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 75～ | | | | | | | | | |
| | 女計 | 459 | 149 | 58 | 176 | 25 | 47 | 4 | 20 | 9 |
| 合計<br>(%) | | 1,705 | 401<br>(23.52) | 148<br>(8.68) | 699<br>(41.00) | 125<br>(7.33) | 312<br>(18.30) | 20<br>(1.17) | 182<br>(10.67) | 39<br>(2.29) |

※ コンピュータ集計分

**平成27年度定期・生活習慣病健診統計（巡回・福岡結核予防センター・県庁内診療所の合計）**

| | 年齢<br>単位：人 | 受診者数 | 総合判定<br>1<br>異常なし | 2<br>ほぼ正常 | 3<br>要観察<br>6ヶ月 | 4<br>要観察<br>3ヶ月 | 5<br>要精密 | 6<br>要受診 | 7<br>治療中<br>再掲 | 8<br>管理中<br>再掲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | ～19 | 589 | 341 | 66 | 118 | 31 | 31 | 2 | 4 | 3 |
| | 20～24 | 2,694 | 1,179 | 279 | 835 | 259 | 109 | 33 | 10 | 6 |
| | 25～29 | 5,307 | 1,905 | 464 | 1,801 | 817 | 204 | 116 | 34 | 17 |
| | 30～34 | 5,640 | 1,409 | 506 | 1,906 | 1,323 | 325 | 171 | 112 | 33 |
| | 35～39 | 5,577 | 919 | 368 | 1,808 | 1,704 | 538 | 240 | 268 | 49 |
| | 40～44 | 4,927 | 546 | 277 | 1,551 | 1,685 | 587 | 281 | 452 | 70 |
| | 45～49 | 3,920 | 282 | 186 | 1,229 | 1,398 | 559 | 266 | 699 | 91 |
| | 50～54 | 4,154 | 243 | 154 | 1,173 | 1,597 | 700 | 287 | 1,177 | 145 |
| | 55～59 | 4,439 | 246 | 187 | 1,125 | 1,781 | 782 | 318 | 1,718 | 239 |
| | 60～64 | 3,204 | 117 | 105 | 950 | 1,255 | 608 | 169 | 1,465 | 232 |
| | 65～69 | 1,132 | 59 | 45 | 284 | 461 | 231 | 52 | 571 | 88 |
| | 70～74 | 243 | 41 | 5 | 46 | 94 | 49 | 8 | 137 | 8 |
| | 75～ | 295 | 153 | 23 | 30 | 53 | 30 | 6 | 50 | 7 |
| | 男計 | 42,121 | 7,440 | 2,665 | 12,856 | 12,458 | 4,753 | 1,949 | 6,697 | 988 |
| 女 | ～19 | 1,173 | 698 | 129 | 140 | 129 | 73 | 4 | 4 | 4 |
| | 20～24 | 2,990 | 1,523 | 449 | 433 | 359 | 202 | 24 | 13 | 11 |
| | 25～29 | 3,683 | 1,783 | 557 | 662 | 423 | 222 | 36 | 22 | 24 |
| | 30～34 | 3,082 | 1,230 | 486 | 602 | 454 | 265 | 45 | 41 | 18 |
| | 35～39 | 2,907 | 888 | 402 | 589 | 604 | 347 | 77 | 63 | 36 |
| | 40～44 | 2,945 | 745 | 369 | 646 | 707 | 386 | 92 | 107 | 61 |
| | 45～49 | 2,827 | 538 | 265 | 673 | 842 | 402 | 107 | 241 | 90 |
| | 50～54 | 2,649 | 365 | 221 | 563 | 971 | 430 | 99 | 349 | 109 |
| | 55～59 | 2,448 | 285 | 155 | 559 | 951 | 411 | 87 | 504 | 108 |
| | 60～64 | 1,368 | 131 | 58 | 322 | 553 | 238 | 66 | 394 | 76 |
| | 65～69 | 500 | 65 | 38 | 100 | 213 | 69 | 15 | 186 | 31 |
| | 70～74 | 149 | 45 | 8 | 26 | 51 | 12 | 7 | 59 | 6 |
| | 75～ | 1,161 | 874 | 58 | 78 | 68 | 75 | 8 | 79 | 14 |
| | 女計 | 27,882 | 9,170 | 3,195 | 5,393 | 6,325 | 3,132 | 667 | 2,062 | 588 |
| 合計<br>（%） | | 70,003 | 16,610<br>(23.73) | 5,860<br>(8.37) | 18,249<br>(26.07) | 18,783<br>(26.83) | 7,885<br>(11.26) | 2,616<br>(3.74) | 8,759<br>(12.51) | 1,576<br>(2.25) |

※ コンピュータ集計分

年度ごとの定期健診（巡回・福岡結核予防センター・県庁内診療所の合計）人数推移

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受診者数 | 65,715 | 65,941 | 66,201 | 67,041 | 70,003 |
| 1異常なし | 14,258 | 14,476 | 14,569 | 14,747 | 16,610 |
| 2ほぼ正常 | 4,966 | 5,083 | 5,579 | 5,434 | 5,860 |
| 3要観察6ヶ月 | 17,775 | 17,805 | 17,910 | 18,146 | 18,249 |
| 4要観察3ヶ月 | 18,074 | 18,403 | 17,841 | 18,068 | 18,783 |
| 5要精密 | 8,033 | 7,721 | 7,718 | 7,957 | 7,885 |
| 6要受診 | 2,609 | 2,453 | 2,584 | 2,689 | 2,616 |
| 7治療中再掲 | 8,321 | 8,487 | 8,489 | 8,620 | 8,759 |
| 8管理中再掲 | 1,643 | 1,556 | 1,562 | 1,536 | 1,576 |



(2) 人間ドック

人間ドック健診は、福岡結核予防センター及び県庁内診療所で実施し、日本病院会の自動化健診や官公庁共済、健保組合が多数を占めている。福岡結核予防センターでは、人間ドックフロアーが独立していて、検査当日に血液検査の大部分の結果がわかるので、受診者の満足度が高い。両施設での合計数は、4,017 人。判定の割合は、5 要精密 24.40%、6 要受診 6.30%でした。

**平成27年度福岡結核予防センター人間ドック統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者数 | 総合判定<br>1<br>異常なし | 2<br>ほぼ正常 | 3<br>要観察<br>6ヶ月 | 4<br>要観察<br>3ヶ月 | 5<br>要精密 | 6<br>要受診 | 7<br>治療中<br>再掲 | 8<br>管理中<br>再掲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | ～19 | 0 | | | | | | | | |
| | 20～24 | 0 | | | | | | | | |
| | 25～29 | 0 | | | | | | | | |
| | 30～34 | 131 | 10 | 18 | 41 | 35 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| | 35～39 | 297 | 18 | 27 | 97 | 94 | 50 | 11 | 18 | 9 |
| | 40～44 | 579 | 8 | 31 | 153 | 249 | 99 | 39 | 60 | 6 |
| | 45～49 | 547 | 3 | 31 | 132 | 227 | 121 | 33 | 83 | 17 |
| | 50～54 | 449 | 1 | 9 | 88 | 201 | 122 | 28 | 138 | 18 |
| | 55～59 | 391 | 1 | 13 | 68 | 168 | 120 | 21 | 174 | 37 |
| | 60～64 | 235 | | 3 | 47 | 105 | 65 | 15 | 117 | 12 |
| | 65～69 | 83 | | 3 | 15 | 32 | 23 | 10 | 47 | 9 |
| | 70～74 | 18 | | | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 |
| | 75～ | 5 | | | | 1 | 4 | | 3 | 2 |
| | 男計 | 2,735 | 41 | 135 | 643 | 1,119 | 631 | 166 | 654 | 114 |
| 女 | ～19 | 0 | | | | | | | | |
| | 20～24 | 0 | | | | | | | | |
| | 25～29 | 0 | | | | | | | | |
| | 30～34 | 55 | 3 | 10 | 9 | 16 | 17 | | | |
| | 35～39 | 140 | 7 | 29 | 28 | 38 | 36 | 2 | 4 | 1 |
| | 40～44 | 278 | 24 | 43 | 54 | 69 | 72 | 16 | 15 | 10 |
| | 45～49 | 231 | 6 | 23 | 33 | 96 | 65 | 8 | 15 | 8 |
| | 50～54 | 188 | 1 | 9 | 27 | 83 | 48 | 20 | 23 | 8 |
| | 55～59 | 135 | 1 | 5 | 13 | 57 | 41 | 18 | 24 | 8 |
| | 60～64 | 73 | | 1 | 12 | 32 | 15 | 13 | 24 | 6 |
| | 65～69 | 28 | | | 1 | 13 | 7 | 7 | 13 | 4 |
| | 70～74 | 7 | | | | 6 | | 1 | 6 | 1 |
| | 75～ | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| | 女計 | 1,136 | 42 | 120 | 177 | 410 | 302 | 85 | 125 | 46 |
| 合計<br>(%) | | 3,871 | 83<br>(2.14) | 255<br>(6.59) | 820<br>(21.18) | 1,529<br>(39.50) | 933<br>(24.10) | 251<br>(6.48) | 779<br>(20.12) | 160<br>(4.13) |

※ コンピュータ集計分

**平成27年度県庁内診療所人間ドック統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者数 | 総合判定<br>1<br>異常なし | 2<br>ほぼ正常 | 3<br>要観察<br>6ヶ月 | 4<br>要観察<br>3ヶ月 | 5<br>要精密 | 6<br>要受診 | 7<br>治療中<br>再掲 | 8<br>管理中<br>再掲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | ～19 | 0 | | | | | | | | |
| | 20～24 | 0 | | | | | | | | |
| | 25～29 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 30～34 | 0 | | | | | | | | |
| | 35～39 | 6 | | | | 5 | 1 | | 1 | 1 |
| | 40～44 | 15 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | | 1 | |
| | 45～49 | 50 | 2 | 3 | 13 | 12 | 20 | | 7 | |
| | 50～54 | 25 | | | 9 | 11 | 5 | | 5 | 3 |
| | 55～59 | 17 | | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| | 60～64 | 8 | | | 1 | 3 | 4 | | 5 | 1 |
| | 65～69 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 70～74 | 0 | | | | | | | | |
| | 75～ | 0 | | | | | | | | |
| | 男計 | 123 | 3 | 5 | 34 | 41 | 39 | 1 | 27 | 6 |
| 女 | ～19 | 0 | | | | | | | | |
| | 20～24 | 0 | | | | | | | | |
| | 25～29 | 0 | | | | | | | | |
| | 30～34 | 0 | | | | | | | | |
| | 35～39 | 3 | 1 | | 1 | | 1 | | | |
| | 40～44 | 8 | 2 | 3 | | | 3 | | | |
| | 45～49 | 6 | | 2 | | 2 | 2 | | 1 | 1 |
| | 50～54 | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | | |
| | 55～59 | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 60～64 | 0 | | | | | | | | |
| | 65～69 | 0 | | | | | | | | |
| | 70～74 | 0 | | | | | | | | |
| | 75～ | 0 | | | | | | | | |
| | 女計 | 23 | 4 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 合計<br>(%) | | 146 | 7<br>(4.79) | 10<br>(6.85) | 36<br>(24.66) | 44<br>(30.14) | 47<br>(32.19) | 2<br>(1.37) | 28<br>(19.18) | 7<br>(4.79) |

※ コンピュータ集計分

**平成27年度人間ドック統計（センター・県庁内の合計）**

| | 年齢<br>単位：人 | 受診者数 | 総合判定 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1<br>異常なし | 2<br>ほぼ正常 | 3<br>要観察<br>6ヶ月 | 4<br>要観察<br>3ヶ月 | 5<br>要精密 | 6<br>要受診 | 7<br>治療中<br>再掲 | 8<br>管理中<br>再掲 |
| 男 | ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25～29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30～34 | 131 | 10 | 18 | 41 | 35 | 21 | 6 | 3 | 1 |
| | 35～39 | 303 | 18 | 27 | 97 | 99 | 51 | 11 | 19 | 10 |
| | 40～44 | 594 | 9 | 32 | 157 | 253 | 104 | 39 | 61 | 6 |
| | 45～49 | 597 | 5 | 34 | 145 | 239 | 141 | 33 | 90 | 17 |
| | 50～54 | 474 | 1 | 9 | 97 | 212 | 127 | 28 | 143 | 21 |
| | 55～59 | 408 | 1 | 14 | 75 | 172 | 124 | 22 | 182 | 38 |
| | 60～64 | 243 | 0 | 3 | 48 | 108 | 69 | 15 | 122 | 13 |
| | 65～69 | 84 | 0 | 3 | 15 | 33 | 23 | 10 | 47 | 9 |
| | 70～74 | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 | 3 |
| | 75～ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| | 男計 | 2,858 | 44 | 140 | 677 | 1,160 | 670 | 167 | 681 | 120 |
| 女 | ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30～34 | 55 | 3 | 10 | 9 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | 35～39 | 143 | 8 | 29 | 29 | 38 | 37 | 2 | 4 | 1 |
| | 40～44 | 286 | 26 | 46 | 54 | 69 | 75 | 16 | 15 | 10 |
| | 45～49 | 237 | 6 | 25 | 33 | 98 | 67 | 8 | 16 | 9 |
| | 50～54 | 191 | 2 | 9 | 27 | 83 | 49 | 21 | 23 | 8 |
| | 55～59 | 138 | 1 | 5 | 14 | 58 | 42 | 18 | 24 | 8 |
| | 60～64 | 73 | 0 | 1 | 12 | 32 | 15 | 13 | 24 | 6 |
| | 65～69 | 28 | 0 | 0 | 1 | 13 | 7 | 7 | 13 | 4 |
| | 70～74 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| | 75～ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | 女計 | 1,159 | 46 | 125 | 179 | 413 | 310 | 86 | 126 | 47 |
| 合計<br>（%） | | 4,017 | 90<br>(2.24) | 265<br>(6.60) | 856<br>(21.31) | 1,573<br>(39.16) | 980<br>(24.40) | 253<br>(6.30) | 807<br>(20.09) | 167<br>(4.16) |

※ コンピュータ集計分

年度ごとの人間ドック人数推移

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 受診者数 | 3,691 | 3,656 | 3837 | 4,034 | 4017 |
| 1異常なし | 135 | 110 | 111 | 99 | 90 |
| 2ほぼ正常 | 241 | 266 | 281 | 253 | 265 |
| 3要観察6ヶ月 | 976 | 802 | 785 | 822 | 856 |
| 4要観察3ヶ月 | 1,383 | 1,502 | 1539 | 1,660 | 1573 |
| 5要精密 | 744 | 768 | 853 | 927 | 980 |
| 6要受診 | 212 | 208 | 268 | 273 | 253 |
| 7治療中再掲 | 645 | 681 | 751 | 794 | 807 |
| 8管理中再掲 | 118 | 117 | 128 | 162 | 167 |



（3）胸部Ｘ線

平成 27 年度の事業所健診・施設健診の胸部Ｘ線受診者は、間接撮影・直接撮影・デジタル撮影合わせて 77,207 人、精検指示者 288 人（0.37%）、精検受診者 195 人（精検受診率 67.71%）でした。肺がん 7 人、結核 1 人を発見しています。

**平成27年度事業所胸部X線間接撮影統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者数 | | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 間接撮影 | 喀痰細胞診 | 精検指示数 | 精検受診数 | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核要医療 | 肺結核要観察 | 肺結核治癒 | 他呼吸器 | 循環器 | 他異常 | 異常無 | 結果不明 |
| 男 | ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 25～29 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 19 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 39 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 20 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 17 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 60～64 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 男計 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 25～29 | 23 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 9 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 7 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 65～69 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 女計 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計（%） | | 226 | 0 | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) |

**平成27年度事業所胸部X線直接撮影統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者数 | | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直接撮影 | 喀痰細胞診 | 精検指示数 | 精検受診数 | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核要医療 | 肺結核要観察 | 肺結核治癒 | 他呼吸器 | 循環器 | 他異常 | 異常無 | 結果不明 |
| 男 | ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 65～69 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 75～79 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 男計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | ～19 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 25～29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 60～64 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 65～69 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 70～74 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 75～79 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 80～ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 女計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計<br>（%） | | 4 | 0 | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) |

**平成27年度事業所胸部X線デジタル撮影統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者数 | | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影 | 喀痰細胞診 | 精検指示数 | 精検受診数 | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核要医療 | 肺結核要観察 | 肺結核治癒 | 他呼吸器 | 循環器 | 他異常 | 異常無 | 結果不明 |
| 男 | ～19 | 209 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 20～24 | 2,641 | 0 | 4 | 4 | | | | | | | 2 | | 2 | | |
| | 25～29 | 5,523 | 1 | 11 | 7 | | | | | | | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| | 30～34 | 6,211 | 1 | 3 | 3 | | | | | | | | | 2 | 1 | |
| | 35～39 | 6,114 | 8 | 7 | 5 | | | | | | | | | 2 | 2 | 1 |
| | 40～44 | 5,773 | 20 | 9 | 4 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | |
| | 45～49 | 4,688 | 12 | 6 | 5 | | | | | | | | | 4 | 1 | |
| | 50～54 | 4,864 | 14 | 17 | 11 | 1 | | | | | | 3 | | 4 | 3 | |
| | 55～59 | 5,234 | 21 | 23 | 12 | | | | | | | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| | 60～64 | 3,829 | 19 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | | | | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| | 65～69 | 1,580 | 2 | 19 | 13 | 2 | | | | | | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 70～74 | 238 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| | 75～79 | 59 | 0 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | | | |
| | 80～ | 16 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 男計 | 46,979 | 100 | 125 | 86 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 25 | 22 | 4 |
| 女 | ～19 | 104 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 2,511 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 25～29 | 3,804 | 0 | 8 | 5 | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 1 | |
| | 30～34 | 3,157 | 0 | 2 | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| | 35～39 | 3,036 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | |
| | 40～44 | 3,372 | 2 | 6 | 5 | | | | | | | 1 | | 4 | | |
| | 45～49 | 3,166 | 2 | 6 | 4 | | | | | | | | | 3 | 1 | |
| | 50～54 | 3,017 | 0 | 7 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| | 55～59 | 2,718 | 0 | 13 | 11 | | | | | | | 5 | | 3 | 2 | 1 |
| | 60～64 | 1,622 | 2 | 17 | 11 | | | | | | | 3 | | 2 | 6 | |
| | 65～69 | 608 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 70～74 | 112 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 75～79 | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 80～ | 40 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 女計 | 27,293 | 8 | 62 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 11 | 2 |
| 合計<br>（%） | | 74,272 | 108 | 187<br>(0.25) | 127<br>(0.17) | 6<br>(0.01) | 1<br>(0.00) | 1<br>(0.00) | 1<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 32<br>(0.04) | 6<br>(0.01) | 41<br>(0.06) | 33<br>(0.04) | 6<br>(0.01) |

**平成27年度施設胸部X線デジタル撮影統計**

| | | 受診者数 | | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年齢<br>単位:人 | ﾃﾞｼﾞﾀﾙ撮影 | 喀痰細胞診 | 精検指示数 | 精検受診数 | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核要医療 | 肺結核要観察 | 肺結核治癒 | 他呼吸器 | 循環器 | 他異常 | 異常無 | 結果不明 |
| 男 | ～19 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 50 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 25～29 | 41 | 0 | 3 | 3 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | |
| | 30～34 | 48 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 51 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 40 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 17 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 19 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 60～64 | 32 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 65～69 | 50 | 0 | 4 | 2 | | | | | | | | | 2 | | |
| | 70～74 | 63 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | | | | |
| | 75～79 | 78 | 0 | 3 | 2 | | | | | | | 1 | | 1 | | |
| | 80～ | 300 | 0 | 16 | 9 | | | | | | | | 5 | 3 | | 1 |
| | 男計 | 818 | 0 | 28 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 |
| 女 | ～19 | 6 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 20～24 | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 25～29 | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 36 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 24 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 18 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 11 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 13 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 60～64 | 27 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 65～69 | 49 | 0 | 3 | 3 | | | 1 | | | | | | | 2 | |
| | 70～74 | 72 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | | 2 | | |
| | 75～79 | 144 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | |
| | 80～ | 1,406 | 0 | 66 | 44 | 1 | 9 | | | | | 6 | 11 | 7 | 9 | 1 |
| | 女計 | 1,887 | 0 | 73 | 51 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 10 | 11 | 1 |
| 合計<br>(%) | | 2,705 | 0 | 101<br>(3.73) | 68<br>(2.51) | 1<br>(0.04) | 9<br>(0.33) | 1<br>(0.04) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 9<br>(0.33) | 17<br>(0.63) | 17<br>(0.63) | 12<br>(0.44) | 2<br>(0.07) |

**平成27年度事業所・施設胸部X線（デジタル・間接・直接）撮影合計**

| | 年齢<br>単位：人 | 受診者数 | | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X線撮影 | 喀痰細胞診 | 精検指示数 | 精検受診数 | 肺がん | 肺がん疑い | 他悪性腫瘍 | 肺結核要医療 | 肺結核要観察 | 肺結核治癒 | 他呼吸器 | 循環器 | 他異常 | 異常無 | 結果不明 |
| 男 | ～19 | 214 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 20～24 | 2,693 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 25～29 | 5,569 | 1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| | 30～34 | 6,278 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | 35～39 | 6,205 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | 40～44 | 5,839 | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| | 45～49 | 4,732 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| | 50～54 | 4,894 | 14 | 17 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| | 55～59 | 5,271 | 21 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| | 60～64 | 3,865 | 19 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| | 65～69 | 1,630 | 2 | 23 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | 70～74 | 301 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75～79 | 138 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 80～ | 316 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| | 男計 | 47,945 | 100 | 153 | 103 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 32 | 23 | 5 |
| 女 | ～19 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20～24 | 2,549 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25～29 | 3,854 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| | 30～34 | 3,206 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 35～39 | 3,074 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 40～44 | 3,405 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | 45～49 | 3,191 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| | 50～54 | 3,034 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55～59 | 2,731 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| | 60～64 | 1,649 | 2 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| | 65～69 | 659 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| | 70～74 | 184 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 75～79 | 170 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 80～ | 1,446 | 0 | 66 | 44 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 9 | 1 |
| | 女計 | 29,262 | 8 | 135 | 92 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 26 | 22 | 3 |
| 合計<br>（%） | | 77,207 | 108 | 288<br>(0.37) | 195<br>(0.25) | 7<br>(0.01) | 10<br>(0.01) | 2<br>(0.00) | 1<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 41<br>(0.05) | 23<br>(0.03) | 58<br>(0.08) | 45<br>(0.06) | 8<br>(0.01) |

年度ごとの人数推移

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸部X線受診者 | 84,410 | 74,102 | 74,807 | 76,279 | 77,207 |
| 精検指示数 | 536 | 353 | 367 | 296 | 288 |
| 精検指示率 | 0.63 | 0.48 | 0.49 | 0.39 | 0.37 |
| 精検受診数 | 394 | 237 | 257 | 211 | 195 |
| 精検受診率 | 73.51 | 67.14 | 70.03 | 71.28 | 67.71 |






（4）胃がん

平成 27 年度の事業所健診・人間ドック・個別検診合わせての胃部Ｘ線受診者は、間接撮影、直接撮影、デジタル撮影合計で 18,442 人でした。精検指示者 871 人（4.72%）、精検受診者 613 人（精検受診率 70.28%）でした。胃がん 2 人を発見しています。

**平成27年度事業所胃がん間接撮影統計**

| | | 受診者数 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年齢<br>単位:人 | 間接撮影 | 精検指示数 | 精検受診数 | 胃がん | 非上皮性悪性腫瘍 | 胃腺腫（異型上皮） | 胃ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含） | その他良性疾患 | 異常なし | 不明※1 | その他※2 |
| 男 | ～29 | 89 | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | |
| | 30～34 | 279 | 6 | 3 | | | | | | 3 | | 3 | |
| | 35～39 | 1713 | 57 | 31 | | | | 3 | 1 | 17 | 7 | 26 | 3 |
| | 40～44 | 3121 | 99 | 73 | | | | 6 | 7 | 36 | 17 | 26 | 7 |
| | 45～49 | 2317 | 107 | 72 | | | | 5 | 9 | 38 | 13 | 35 | 7 |
| | 50～54 | 2221 | 126 | 86 | | | | 3 | 5 | 61 | 14 | 40 | 3 |
| | 55～59 | 2031 | 143 | 113 | | | | 4 | 15 | 70 | 10 | 30 | 14 |
| | 60～64 | 1125 | 101 | 64 | | | | 7 | 10 | 41 | 4 | 37 | 2 |
| | 65～69 | 425 | 53 | 40 | 1 | | | 3 | 10 | 20 | 5 | 13 | 1 |
| | 70～74 | 73 | 6 | 3 | | | | | | 3 | | 3 | |
| | 75～79 | 17 | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 80～ | 2 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 男計 | 13413 | 703 | 490 | 1 | 0 | 0 | 31 | 58 | 291 | 72 | 213 | 37 |
| 女 | ～29 | 44 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 138 | 2 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 35～39 | 874 | 21 | 14 | | | | 2 | | 5 | 6 | 7 | 1 |
| | 40～44 | 1061 | 22 | 20 | | | | 6 | | 11 | 3 | 2 | |
| | 45～49 | 916 | 31 | 20 | | | | 2 | 2 | 7 | 8 | 11 | 1 |
| | 50～54 | 800 | 29 | 17 | | | | | | 10 | 5 | 12 | 2 |
| | 55～59 | 629 | 24 | 18 | 1 | | | 2 | | 12 | 3 | 6 | |
| | 60～64 | 345 | 24 | 20 | | | | 4 | | 8 | 8 | 4 | |
| | 65～69 | 126 | 9 | 7 | | | | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
| | 70～74 | 20 | 3 | 3 | | | | 1 | 1 | | 1 | | |
| | 75～79 | 6 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 80～ | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 女計 | 4959 | 165 | 120 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 57 | 36 | 45 | 4 |
| 合計<br>（%） | | 18372 | 868<br>(4.72) | 610<br>(3.32) | 2<br>(0.01) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 49<br>(0.27) | 62<br>(0.34) | 348<br>(1.89) | 108<br>(0.59) | 258<br>(1.40) | 41<br>(0.22) |

※1 不明(例 胃切除 等)

※2 その他(例 胃がん疑い、食道がん、食道ポリープ、食道炎、十二指腸潰瘍 等)

## 平成27年度個別検診胃がんデジタル撮影統計

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者数 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 直接撮影 | 精検指示数 | 精検受診数 | 胃がん | 非上皮性悪性腫瘍 | 胃腺腫（異型上皮） | 胃ポリープ | 胃潰瘍（瘢痕含） | その他良性疾患 | 異常なし | 不明<br>※1 | その他<br>※2 |
| 男 | ～29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 60～64 | 7 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 65～69 | 13 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 70～74 | 5 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 75～79 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 80～ | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 男計 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 女 | ～29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 55～59 | 3 | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | 60～64 | 7 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 65～69 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 70～74 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 75～79 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 80～ | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| | 女計 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 合計<br>（%） | | 70 | 3<br>(4.29) | 3<br>(4.29) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 3<br>(4.29) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) |

※1 不明(例 胃切除 等)

※2 その他(例 胃がん疑い、食道がん、食道ポリープ、食道炎、十二指腸潰瘍 等)

年度ごとの人数推移

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胃部X線受診者 | 20,857 | 19,918 | 19,842 | 19,219 | 18,372 |
| 精検指示数 | 1,106 | 903 | 1,051 | 906 | 868 |
| 精検指示率 | 5.30 | 4.53 | 5.30 | 4.71 | 4.72 |
| 精検受診数 | 795 | 612 | 775 | 647 | 610 |
| 精検受診率 | 71.88 | 67.77 | 73.74 | 71.41 | 70.28 |






（5）大腸がん

平成 27 度の事業所健診の便潜血受診者は、事業所･個別検診合わせて 25,825 人でした。精検指示者 1,031 人（3.99%）、精検受診者 722 人（精検受診率 70.03%）でした。大腸がん 10 人を発見しています。

**平成27年度事業所大腸がん統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 便潜血 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精検指示数 | 精検受診数 | 大腸がん | 非上皮性悪性腫瘍 | カルチノイド | 線腫性ポリープ | 非線腫性ポリープ | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 | 大腸憩室 | その他大腸良性疾患 | 異常なし | 不明 | その他※1 |
| 男 | ～29 | 1963 | 45 | 34 | | | | 4 | 2 | 1 | | 1 | 5 | 21 | | |
| | 30～34 | 2087 | 53 | 45 | | | | 6 | 4 | 1 | | 2 | 8 | 24 | | |
| | 35～39 | 3516 | 96 | 60 | | | | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | | |
| | 40～44 | 3295 | 94 | 52 | | | | 19 | 7 | | | 4 | 7 | 15 | | |
| | 45～49 | 2431 | 94 | 49 | | | | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | | |
| | 50～54 | 2406 | 122 | 72 | 2 | | | 33 | 7 | 1 | | 4 | 4 | 21 | | |
| | 55～59 | 2351 | 122 | 65 | 1 | | | 36 | 10 | 1 | | 4 | 3 | 10 | | |
| | 60～64 | 1249 | 97 | 58 | 5 | | | 30 | 6 | | | 6 | 2 | 9 | | |
| | 65～69 | 515 | 36 | 21 | 1 | | | 13 | 1 | | | 1 | 4 | 1 | | |
| | 70～74 | 79 | 5 | 4 | | | | 3 | | | | | | 1 | | |
| | 75～79 | 3 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 80～ | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 男計 | 19895 | 765 | 461 | 9 | 0 | 0 | 188 | 49 | 10 | 2 | 24 | 50 | 129 | 0 | 0 |
| 女 | ～29 | 228 | 15 | 11 | | | | | 2 | | | | 4 | 5 | | |
| | 30～34 | 294 | 17 | 17 | | | | 2 | 2 | | | | 4 | 2 | | |
| | 35～39 | 1065 | 36 | 36 | | 1 | | | | 1 | | 1 | 4 | 9 | | |
| | 40～44 | 1158 | 43 | 43 | | | | 6 | 2 | | | 1 | 6 | 10 | | |
| | 45～49 | 995 | 45 | 45 | | | | 9 | | | | 3 | 5 | 14 | | |
| | 50～54 | 826 | 40 | 40 | | | | 7 | 2 | | | 1 | 5 | 10 | | |
| | 55～59 | 627 | 24 | 24 | | | | 5 | 2 | | | 3 | 3 | 1 | | |
| | 60～64 | 390 | 26 | 26 | 1 | | | 6 | | | | 1 | 1 | 6 | | |
| | 65～69 | 189 | 8 | 8 | | | | 3 | | | | 2 | 2 | 1 | | |
| | 70～74 | 24 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 75～79 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 80～ | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 女計 | 5797 | 256 | 252 | 1 | 1 | 0 | 39 | 10 | 1 | 0 | 12 | 34 | 58 | 0 | 0 |
| 合計<br>（%） | | 25692 | 1021<br>(3.97) | 713<br>(2.78) | 10<br>(0.04) | 1<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 227<br>(0.88) | 59<br>(0.23) | 11<br>(0.04) | 2<br>(0.01) | 36<br>(0.14) | 84<br>(0.33) | 187<br>(0.73) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) |

※1 その他（例 大腸がん疑い、大腸検診で胃がんが見つかった場合 等）

**平成27年度個別検診大腸がん統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 便潜血 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精検指示数 | 精検受診数 | 大腸がん | 非上皮性悪性腫瘍 | カルチノイド | 線腫性ポリープ | 非線腫性ポリープ | 潰瘍性大腸炎 | クローン病 | 大腸憩室 | その他大腸良性疾患 | 異常なし | 不明 | その他※1 |
| 男 | ～29 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 60～64 | 18 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 65～69 | 21 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| | 70～74 | 6 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | | | |
| | 75～79 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 80～ | 4 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 男計 | 72 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 女 | ～29 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 30～34 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 35～39 | 8 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 40～44 | 5 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 45～49 | 4 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 50～54 | 9 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 55～59 | 9 | 2 | 2 | | | | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 60～64 | 12 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 65～69 | 6 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 70～74 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | | | | |
| | 75～79 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 80～ | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| | 女計 | 61 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計<br>（%） | | 133 | 10<br>(7.52) | 9<br>(6.77) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 4<br>(3.01) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) | 2<br>(1.50) | 2<br>(1.50) | 1<br>(0.75) | 0<br>(0.00) | 0<br>(0.00) |

※1 その他(例 大腸がん疑い、大腸検診で胃がんが見つかった場合 等)

年度ごとの人数推移

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 便潜血受診者 | 23,739 | 24,154 | 25,287 | 25,423 | 25,825 |
| 精検指示数 | 966 | 956 | 1,098 | 1,064 | 1,031 |
| 精検指示率 | 4.07 | 3.96 | 4.34 | 4.19 | 3.99 |
| 精検受診数 | 478 | 498 | 613 | 584 | 722 |
| 精検受診率 | 49.48 | 52.09 | 55.83 | 54.89 | 70.03 |






(6) 子宮頸がん

福岡結核予防センターでは、施設内健診で子宮頸がんの検査を実施しています。

平成 27 度の子宮頸がん検査受診者は、事業所･人間ドック合わせて 3,794 人。精検指示者 124 人（3.27%）、精検受診者 101 人（精検受診率 81.45%）でした。子宮頸がん 1 人を発見しています。

**平成27年度事業所子宮頸がん統計**

| | | | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年齢<br>単位:人 | 受診者 | 精検指示数 | 精検受診数 | 子宮がん | 高度異形成 | 中等度異形成 | 軽度異形成 | 異常なし | その他悪性 | その他 | 未受診 | 結果不詳 |
| 女 | ～29 | 433 | 15 | 14 | | | 4 | 3 | 5 | | 2 | | 1 |
| | 30～34 | 409 | 21 | 14 | | 1 | 4 | 6 | 1 | | 2 | | 7 |
| | 35～39 | 584 | 22 | 17 | 1 | | 3 | 7 | 4 | | 2 | | 5 |
| | 40～44 | 755 | 23 | 21 | | 3 | 1 | 12 | 3 | | 2 | | 2 |
| | 45～49 | 521 | 17 | 14 | | 1 | 1 | 3 | 9 | | | 1 | 2 |
| | 50～54 | 466 | 11 | 8 | | | 1 | 1 | 3 | | 3 | | 3 |
| | 55～59 | 294 | 5 | 4 | | | | 1 | 1 | | 2 | | 1 |
| | 60～64 | 204 | 5 | 4 | | | 1 | | | | 3 | | 1 |
| | 65～69 | 99 | 4 | 4 | | | | 3 | 1 | | | | |
| | 70～ | 29 | 1 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 合計<br>(%) | | 3794 | 124<br>(3.27) | 101<br>(2.66) | 1<br>(0.03) | 5<br>(0.13) | 15<br>(0.40) | 36<br>(0.95) | 28<br>(0.74) | 0<br>(0.00) | 16<br>(0.42) | 1<br>(0.03) | 22<br>(0.58) |

年度ごとの人数推移

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 子宮がん検診受診者 | 3,089 | 2,716 | 3,142 | 3,121 | 3,794 |
| 精検指示数 | 86 | 74 | 94 | 100 | 124 |
| 精検指示率 | 2.78 | 2.72 | 2.99 | 3.20 | 3.27 |
| 精検受診数 | 60 | 58 | 60 | 70 | 101 |
| 精検受診率 | 69.77 | 78.38 | 63.83 | 70.00 | 81.45 |






(7) 乳がん

福岡結核予防センターでは、マンモグラフィ検査と乳腺エコー検査で乳がんの検査を実施しています。平成 27 度のマンモグラフィ検査受診者は、事業所･人間ドック合わせて 2,892 人。精検指示者 119 人（4.11%）、精検受診者 101 人（精検受診率 84.87%）でした。乳がん 5 人を発見しています。また、乳腺エコー検査受診者は、1,080 人。精検指示者 107 人（9.91%）、精検受診者 89 人（精検受診率 83.18%）でした。乳がん 2 人を発見しています。

**平成27年度事業所マンモグラフィ統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精検指示数 | 精検受診数 | 乳がん | 乳がん疑い | 乳腺症 | 線維腺症 | のう胞 | 良性腫瘍 | その他 | 異常なし | 結果不明 |
| 女 | ～29 | 105 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | | |
| | 30～34 | 181 | 3 | 3 | | | 1 | 1 | | | | 1 | |
| | 35～39 | 346 | 15 | 12 | | | 2 | 3 | | 1 | 1 | 5 | |
| | 40～44 | 711 | 42 | 34 | | 1 | 15 | 4 | 3 | | 1 | 10 | |
| | 45～49 | 487 | 13 | 11 | | | 5 | 3 | | 1 | | 2 | |
| | 50～54 | 436 | 23 | 19 | 1 | | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| | 55～59 | 293 | 10 | 10 | 1 | | 3 | 1 | 1 | | 1 | 3 | |
| | 60～64 | 202 | 5 | 5 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | 65～69 | 94 | 2 | 2 | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 70～ | 37 | 4 | 3 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| 合計<br>(%) | | 2892 | 119<br>(4.11) | 101<br>(3.49) | 5<br>(0.17) | 1<br>(0.03) | 39<br>(1.35) | 13<br>(0.45) | 6<br>(0.21) | 4<br>(0.14) | 7<br>(0.24) | 26<br>(0.90) | 0<br>(0.00) |

**平成27年度事業所乳腺エコー統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精検指示数 | 精検受診数 | 乳がん | 乳がん疑い | 乳腺症 | 線維腺症 | のう胞 | 良性腫瘍 | その他 | 異常なし | 結果不明 |
| 女 | ～29 | 326 | 21 | 17 | | | 5 | 4 | | | 2 | 6 | |
| | 30～34 | 174 | 18 | 15 | | | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | | |
| | 35～39 | 189 | 24 | 21 | | | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| | 40～44 | 156 | 16 | 12 | | | 2 | 3 | 4 | | 1 | 2 | |
| | 45～49 | 90 | 13 | 11 | | | 4 | 4 | 1 | 1 | | 1 | |
| | 50～54 | 58 | 6 | 5 | | | | 2 | 1 | | 2 | | |
| | 55～59 | 40 | 4 | 3 | 1 | | | | | 1 | | 1 | |
| | 60～64 | 30 | 4 | 4 | 1 | | | | | | 2 | 1 | |
| | 65～69 | 15 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 | |
| | 70～ | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 合計<br>(%) | | 1080 | 107<br>(9.91) | 89<br>(8.24) | 2<br>(0.19) | 0<br>(0.00) | 24<br>(2.22) | 21<br>(1.94) | 12<br>(1.11) | 5<br>(0.46) | 12<br>(1.11) | 13<br>(1.20) | 0<br>(0.00) |

(8) 前立腺がん

平成 27 年度の事業所健診の前立腺がん（PSA 検査）受診者は、6,840 人でした。精検指示者 132 人（1.93%）、精検受診者 89 人（精検受診率 67.42%）でした。前立腺がん 2 人を発見しています。

**平成27年度事業所前立腺がん統計**

| | 年齢<br>単位:人 | 受診者 | 要精検数 | | 精検結果判明数 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精検指示数 | 精検受診数 | 前立腺がん | 前立腺がん疑い | 前立腺肥大 | その他のがん | その他 | 異常なし | 結果不明 |
| 男 | ～29 | 10 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 30～34 | 85 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 35～39 | 160 | 1 | 1 | | | | | | 1 | |
| | 40～44 | 1514 | 9 | 8 | | 1 | 2 | | 4 | 1 | |
| | 45～49 | 998 | 8 | 5 | | 2 | 2 | | 1 | | |
| | 50～54 | 1548 | 19 | 15 | 1 | 1 | 5 | | 5 | 3 | |
| | 55～59 | 1721 | 52 | 36 | 1 | 7 | 17 | | 6 | 5 | |
| | 60～64 | 597 | 20 | 12 | | 4 | 2 | | 1 | 5 | |
| | 65～69 | 171 | 20 | 9 | | 1 | 4 | | 3 | 1 | |
| | 70～ | 36 | 3 | 3 | | 1 | | | 2 | | |
| 合計<br>(%) | | 6840 | 132<br>(1.93) | 89<br>(1.30) | 2<br>(0.03) | 17<br>(0.25) | 32<br>(0.47) | 0<br>(0.00) | 22<br>(0.32) | 16<br>(0.23) | 0<br>(0.00) |

(9) 腹部超音波検査

平成 27 年度の腹部超音波検査は、7,257 人の受診でした。精検指示者は 252 人（3.47%）、精検受診者は 136 人（精検受診率 53.97%）でした。腎臓がん 2 名を発見しています。

**平成27年度腹部超音波検査統計**

| | | 受診者数 | | 臓器別 | | | | | | 精密検査 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 年齢<br>単位:人 | 超音波 | 精検指示数 | 肝臓 | 胆のう胆道 | 膵臓 | 腎臓 | 脾臓 | その他 | 精検受診数 | 精検未検数 |
| 男 | ～29 | 12 | 0 | | | | | | | | |
| | 30～34 | 192 | 1 | | 1 | | | | | 1 | 0 |
| | 35～39 | 552 | 7 | 6 | | | 1 | | | 7 | 0 |
| | 40～44 | 1134 | 27 | 12 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 10 |
| | 45～49 | 1041 | 26 | 12 | 4 | 3 | 7 | | | 13 | 13 |
| | 50～54 | 901 | 31 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 1 | 21 | 10 |
| | 55～59 | 762 | 36 | 3 | 16 | 2 | 15 | | | 16 | 20 |
| | 60～64 | 448 | 28 | 3 | 9 | 4 | 10 | 1 | 1 | 11 | 17 |
| | 65～69 | 198 | 15 | | 3 | 7 | 3 | | 2 | 11 | 4 |
| | 70～74 | 49 | 3 | 1 | | 1 | | | 1 | 3 | 0 |
| | 75～79 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | 80～ | 4 | 0 | | | | | | | | |
| | 男計 | 5294 | 174 | 43 | 49 | 23 | 48 | 5 | 6 | 100 | 74 |
| 女 | ～29 | 6 | 0 | | | | | | | | |
| | 30～34 | 95 | 1 | 1 | | | | | | 0 | 1 |
| | 35～39 | 234 | 2 | 2 | | | | | | 0 | 2 |
| | 40～44 | 456 | 13 | 2 | 4 | 3 | 4 | | | 7 | 6 |
| | 45～49 | 425 | 19 | 2 | 9 | 3 | 4 | | 1 | 6 | 13 |
| | 50～54 | 350 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | | 2 | 9 | 7 |
| | 55～59 | 227 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | | | 9 | 8 |
| | 60～64 | 108 | 8 | 2 | 3 | | 3 | | | 4 | 4 |
| | 65～69 | 49 | 2 | 1 | | | 1 | | | 1 | 1 |
| | 70～74 | 12 | 0 | | | | | | | | |
| | 75～79 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| | 80～ | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 女計 | 1963 | 78 | 23 | 26 | 11 | 15 | 0 | 3 | 36 | 42 |
| 合計<br>(%) | | 7257 | 252<br>(3.47) | 66<br>(0.91) | 75<br>(1.03) | 34<br>(0.47) | 63<br>(0.87) | 5<br>(0.07) | 9<br>(0.12) | 136<br>(1.87) | 116<br>(1.60) |

年度ごとの人数推移

| | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超音波検査受診者 | 6,679 | 6,877 | 7,283 | 7,333 | 7,257 |
| 精検指示数 | 105 | 74 | 148 | 204 | 252 |
| 精検指示率 | 1.57 | 1.08 | 2.03 | 2.78 | 3.47 |
| 精検受診数 | 51 | 30 | 44 | 85 | 136 |
| 精検受診率 | 48.57 | 40.54 | 29.73 | 41.67 | 53.97 |






（10）特殊検診

法律で規定している各種の特殊検診を実施しています。

**平成27年度特殊検診統計**

| | 受診者 | 管理1 | 管理2 | 管理3イ | 管理3ロ | 管理4 | 精密 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| じん肺（人） | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （%） | | (100.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) |

管理区分　管理1：じん肺所見なし
管理2：X線第1型でじん肺による著しい障害がない者
管理3イ：X線第2型でじん肺による著しい障害がない者
管理3ロ：X線第3型又は第4型でじん肺による著しい障害がない者
管理4：X線第1～4型でじん肺による著しい障害がある者

| | 受診者 | 管理A | 管理B | 管理C | 管理R | 管理T | 再検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛（人） | 128 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| （%） | | (96.9) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (3.1) |
| 電離（人） | 315 | 256 | 53 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| （%） | | (81.3) | (16.8) | (0.0) | (0.0) | (0.3) | (1.6) |
| 高気圧（人） | 118 | 103 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| （%） | | (87.3) | (6.8) | (0.0) | (0.0) | (5.9) | (0.0) |
| 有機（人） | 1,400 | 1,375 | 3 | 0 | 0 | 22 | 100 |
| （%） | | (98.2) | (0.2) | (0.0) | (0.0) | (1.6) | (7.1) |
| 特化（人） | 798 | 708 | 0 | 0 | 0 | 26 | 64 |
| （%） | | (88.7) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (3.3) | (8.0) |

管理区分　管理A：当該物質による異常が認められない者
管理B：当該物質による異常かその疑いのある異常が認められる者
管理C：当該物質による疾病にかかっている者
管理R：当該物質による異常を認めないが、当該業務に就業することにより増悪する恐れのある疾病にかかっているか、異常が認められる者
管理T：当該業務以外の原因にかかっているか、異常が認められる者
再検：もう一度同じ検査が必要な者

**平成27年度生物学的モニタリングの結果による内訳**

| 物質名 | 受診者 | 分布1 | 分布2 | 分布3 |
|---|---|---|---|---|
| 血中鉛（人） | 128 | 124 | 4 | 0 |
| （%） | | (96.9) | (3.1) | (0.0) |
| 尿中ﾃﾞﾙﾀｱﾐﾉﾚﾌﾞﾘﾝ酸（人） | 128 | 128 | 0 | 0 |
| （%） | | (100.0) | (0.0) | (0.0) |
| 尿中馬尿酸（人） | 631 | 556 | 67 | 18 |
| （%） | | (88.1) | (10.6) | (2.9) |
| 尿中ﾒﾁﾙ馬尿酸（人） | 356 | 356 | 0 | 0 |
| （%） | | (100.0) | (0.0) | (0.0) |
| 尿中マンデル酸（人） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| （%） | | | | |
| 尿中N-ﾒﾁﾙﾎﾙﾑｱﾐﾄﾞ（人） | 54 | 54 | 0 | 0 |
| （%） | | (100.0) | (0.0) | (0.0) |
| 尿中2.5-ﾍｷｻﾝｼﾞｵﾝ（人） | 426 | 426 | 0 | 0 |
| （%） | | (100.0) | (0.0) | (0.0) |
| 尿中総三塩化物（人） | 1 | 1 | 0 | 0 |
| （%） | | (100.0) | (0.0) | (0.0) |
| 尿中ﾄﾘｸﾛﾙ酢酸（人） | 5 | 4 | 1 | 0 |
| （%） | | (80.0) | (20.0) | (0.0) |

（11）特定健診（再掲）

高齢者医療確保法に基づき、定期健康診断、生活習慣病健診、人間ドック受診者に特定健診問診を実施し、特定健診（メタボリック症候群、保健指導レベル）の判定を行った。

平成 27 年度の特定健診の受診者（再掲）は 39,167 人、メタボリック症候群該当者は 5,027 人（12.83%）、予備群は 5,341 人（13.64%）となりました。保健指導区分としては、積極的支援 4,163 人（10.99%）、動機付け支援 3,055 人（8.07%）となっています。

**平成27年度特定健診メタボリック統計（事業所）**

| | 年齢<br>単位:人 | | メタボリック | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 受診者数 | 該当者 | 予備群 | 非該当者 | 判定不能 |
| 男 | ～39 | 1,772 | 117 | 263 | 1,386 | 6 |
| | 40～44 | 5,355 | 561 | 919 | 3,857 | 18 |
| | 45～49 | 4,382 | 686 | 852 | 2,818 | 26 |
| | 50～54 | 4,514 | 932 | 851 | 2,709 | 22 |
| | 55～59 | 4,743 | 1,114 | 954 | 2,636 | 39 |
| | 60～64 | 3,206 | 859 | 609 | 1,719 | 19 |
| | 65～69 | 1,072 | 289 | 221 | 546 | 16 |
| | 70～74 | 174 | 46 | 36 | 88 | 4 |
| | 75～ | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | 男計 | 25,226 | 4,604 | 4,705 | 15,761 | 156 |
| 女 | ～39 | 967 | 4 | 20 | 927 | 16 |
| | 40～44 | 3,019 | 27 | 83 | 2,891 | 18 |
| | 45～49 | 2,933 | 59 | 117 | 2,730 | 27 |
| | 50～54 | 2,704 | 95 | 123 | 2,451 | 35 |
| | 55～59 | 2,460 | 110 | 156 | 2,142 | 52 |
| | 60～64 | 1,311 | 80 | 88 | 1,134 | 9 |
| | 65～69 | 449 | 37 | 41 | 369 | 2 |
| | 70～74 | 86 | 11 | 8 | 66 | 1 |
| | 75～ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 女計 | 13,941 | 423 | 636 | 12,710 | 172 |
| 合計<br>（%） | | 39,167 | 5,027<br>(12.83) | 5,341<br>(13.64) | 28,471<br>(72.69) | 328<br>(0.84) |

※ コンピュータ集計分

※ 39歳以下は、契約に基づいての実施分

**平成27年度特定健診保健指導レベル統計（事業所）**

| | 年齢<br>単位：人 | 受診者数 | 保健指導レベル | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 積極的支援 | 動機付け支援 | なし | 判定不能 |
| 男 | ～39 | 918 | 119 | 89 | 706 | 4 |
| | 40～44 | 5,355 | 900 | 538 | 3,900 | 17 |
| | 45～49 | 4,382 | 826 | 450 | 3,083 | 23 |
| | 50～54 | 4,514 | 791 | 393 | 3,308 | 22 |
| | 55～59 | 4,743 | 782 | 412 | 3,510 | 39 |
| | 60～64 | 3,206 | 437 | 281 | 2,472 | 16 |
| | 65～69 | 1,072 | 0 | 205 | 851 | 16 |
| | 70～74 | 174 | 0 | 25 | 147 | 2 |
| | 75～ | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| | 男計 | 24,372 | 3,855 | 2,393 | 17,979 | 145 |
| 女 | ～39 | 522 | 4 | 11 | 499 | 8 |
| | 40～44 | 3,019 | 44 | 121 | 2,839 | 15 |
| | 45～49 | 2,933 | 59 | 140 | 2,708 | 26 |
| | 50～54 | 2,704 | 88 | 138 | 2,443 | 35 |
| | 55～59 | 2,460 | 72 | 131 | 2,205 | 52 |
| | 60～64 | 1,311 | 41 | 79 | 1,181 | 10 |
| | 65～69 | 449 | 0 | 34 | 412 | 3 |
| | 70～74 | 86 | 0 | 8 | 77 | 1 |
| | 75～ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| | 女計 | 13,496 | 308 | 662 | 12,364 | 162 |
| 合計<br>（%） | | 37,868 | 4,163<br>(10.99) | 3,055<br>(8.07) | 30,343<br>(80.13) | 307<br>(0.81) |

※ コンピュータ集計分
※ 39歳以下は、契約に基づいての実施分

年度ごとの人数推移

| | | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メタボリックシンドローム | 判定者計 | 36,989 | 37,636 | 38,527 | 39,348 | 39,167 |
| | 該当者 | 4,743 | 4,851 | 5,417 | 5,212 | 5,027 |
| | 予備群 | 5,279 | 5,340 | 5,328 | 5,504 | 5,341 |
| | 非該当 | 26,656 | 27,155 | 27,433 | 28,264 | 28,741 |
| | 判定不能 | 311 | 290 | 349 | 368 | 318 |
| 保健指導区分 | 区分者計 | 36,989 | 37,157 | 37,461 | 38,268 | 37,868 |
| | 積極的支援 | 4,493 | 4,347 | 4,470 | 4,455 | 4,163 |
| | 動機付け支援 | 3,017 | 2,943 | 2,910 | 3,039 | 3,055 |
| | 情報提供 | 29,188 | 29,587 | 29,741 | 30,422 | 30,343 |
| | 判定不能 | 291 | 280 | 331 | 352 | 307 |




メタボリックシンドローム判定




保健指導区分

## ５．健康支援

（1）健康診断の事後措置（医師・保健師による訪問指導、結果説明、生活習慣改善アドバイス、その他の相談、追跡調査等）

・保健指導人数　住民　　巡回　76 人
　　事業所　巡回　613 人　　施設内　152 人
・特定保健指導　積極的指導　　372 人
　　動機付け指導　　250 人

（2）産業医適用事業所の産業医受託と事業所の巡視、労働衛生指導等

・安全衛生委員会出席
・平成 28 年 3 月現在　契約事業所数　　146 社

（3）健診実施市町村・学校・事業所保健衛生担当者研修会

・平成 28 年 2 月 22 日　ホテルレガロ福岡：参加者 91 名
・講演　「健診結果の見方・考え方」　福岡結核予防センター医師　原　泰三　先生
　　「認知症は怖い？怖くない？」
　　田北メモリーメンタルクリニック院長　田北　昌史　先生

（4）「結核対策とＩＧＲＡの有効性について」ＩＧＲＡセミナー

・平成 27 年 5 月 30 日　アクロス福岡国際会議場
　　共催　公財）福岡県結核予防会・㈱キアゲン
・「インターフェロンγ遊離試験使用指針に基づく結核対策と診療」
　　公益財団法人結核予防会結核研究所　副所長　加藤　誠也　先生
・「結核診療と結核感染対策におけるＩＧＲＡ検査―実地臨床の場での応用―」
　　国立病院機構熊本南病院　呼吸器内科部長　山中　徹　先生
・「結核の院内感染対策～ＧＦＴとＴ－ＳＰＯＴ～」
　　日本赤十字社長崎原爆諫早病院　副院長　福島　喜代康　先生
・「福岡県の結核の現状と診断について」
　　福岡結核予防センター　呼吸器内科部長　南　貴博　先生
・パネルディスカッション
　　座長：福岡大学筑紫病院　診療部長　永田　忍彦　先生
　　パネリスト：演者の先生

## ６．精度管理

（1）施設認定

・日本総合健診医学会優良総合健診施設
・健康評価施設査定機構認定
・日本臨床細胞学会施設認定
・労働衛生サービス機能評価認定

（2）外部精度管理参加状況（平成 27 年度）

・日本医師会臨床検査精度管理（良好）
・全国労働衛生団体連合会　臨床検査分野（優）
・全国労働衛生団体連合会　労働衛生検査分野（優）
・全国労働衛生団体連合会　胸部Ｘ線分野（優）
・全国労働衛生団体連合会　腹部超音波検査分野（優）
・日本総合健診医学会　生化学・血清（良好）
・日本臨床衛生検査技師会　細胞診（良好）
・福岡県医師会臨床検査精度管理調査　尿（良好）
・福岡県医師会臨床検査精度管理調査　血算（良好）
・福岡県医師会胃集団検診読影研究会　胃部Ｘ線
・公益財団法人結核予防会フィルム評価会　胸部Ｘ線

（3）精度管理向上のための研修（平成 27 年度）

・福岡県看護協会平成 27 年度社会経済福祉委員会〔第 1 回～12 回〕（4 月 8 日～3 月 9 日　福岡市）
・第 74 回日本医学放射線学会総会（4 月 16 日～19 日　横浜市）
・全衛連ストレスチェックと面接指導研修会及び処理システム説明会（5 月 7 日　東京都）
・結核予防会「トータル胸部健診のあり方」検討準備会議（5 月 11 日　東京都）
・第 88 回日本産業衛生学会（5 月 13 日～16 日　大阪市）
・第 116 回日本耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会（5 月 20 日～23 日　東京都）
・第 309 回日本内科学会九州地方会（5 月 30 日　久留米市）
・第 38 回日本呼吸器内視鏡学会学術総会（6 月 11 日～12 日　東京都）
・第 67 回九州消化器内視鏡技師研究会（6 月 20 日　長崎市）
・日本総合健診医学会「平成 27 年度精度管理研修会」（6 月 27 日　東京都）
・第 56 回日本人間ドック学会（7 月 30 日～31 日　横浜市）
・平成 27 年度福岡県保健医療介護部同和問題をはじめとする人権問題研修会（8 月 4 日春日市）
・ＪＫＡ平成 28 年度公益事業振興補助事業説明会（8 月 21 日　大阪市）
・平成 27 年度人権・同和問題企業事業主研修会、企業セミナー（9 月 2 日・1 月 21 日福岡市）
・平成 27 年度腹部超音波検査研修会〔中級コース〕（9 月 19 日　東京都）
・第 63 回全国地域婦人団体研究大会（10 月 1 日～2 日　福岡市）
・第 57 回日本消化器病学会大会及び第 23 回日本消化器関連学会（10 月 7 日～11 日　東京都）
・平成 27 年度生活習慣病健診等従事者講習会（10 月 14 日　福岡市）

・福岡県看護協会平成 27 年度研修会〔感染管理研修他〕（10 月 21 日　福岡市）
・福岡市防火管理協会平成 27 年度救急講習（10 月 16 日～11 月 18 日　福岡市）
・平成 27 年度特定保健指導従事者研修〔第 1～6 回〕（10 月 29 日～1 月 26 日）
・第 25 回日本乳癌検診学会学術総会（10 月 30 日～31 日　つくば市）
・平成 27 年度結核予防会九州地区会議（11 月 5 日　長崎県）
・第 23 回日本腰痛学会（11 月 14 日～15 日　千葉県）
・平成 27 年度複十字シール運動担当者会議（11 月 18 日　東京都）
・第 54 回日本臨床細胞学会秋期大会（11 月 21 日～22 日　名古屋市）
・第 53 回日本糖尿病学会九州地方会（11 月 27 日～28 日　福岡市）
・全衛連労働衛生機関職員研修会〔基礎コース・専門コース〕（12 月 3～4 日、2 月 3～4・12 日　大阪市）
・平成 27 年度胸部画像精度管理研究会（12 月 3 日～4 日　東京都）
・全衛連保健師・看護師等研修会〔保健指導コース〕（12 月 10 日～11 日　大阪市）
・結核予防会ストレスチェック実務説明会（12 月 18 日　東京都）
・第 67 回結核予防全国大会（2 月 4 日～5 日　神奈川県）
・福岡県マンモグラフィ技術講習会（2 月 6 日～7 日　北九州市）
・平成 27 年度全衛連九州地方協議会（2 月 18 日　鹿児島県）
・第 44 回九州臨床検査精度管理研究会（2 月 21 日　福岡市）
・第 65 回精検フィルム検討会（2 月 24 日　福岡県）
・平成 27 年度結核予防会事業協議会、大規模災害対策委員会、事務連絡会議（2 月 25 日～26 日　東京都）
・第 15 回肺がんＣＴ検診認定技師講習会（2 月 27 日～28 日　東京都）
・結核予防会・日本対がん協会平成 27 年度診療放射線技師研修会（3 月 9～11 日　東京都）
・結核予防会第 25 回健康支援セミナー（3 月 11 日　東京都）

## 7．普及啓発

当会は、結核をはじめとする感染症及び胸部疾患の予防、早期発見のための普及啓発、並びに生活習慣病等の健康診断とその早期治療による公衆衛生の向上及び県民の健康増進を図るため、行政機関、婦人会等との連携のもとに、結核予防週間及び複十字シール運動等の行事開催を通じて結核予防思想の普及向上に努めるとともに、結核予防に関する各種機関紙、ポスター、パンフレット他の配布等を積極的に行った。

1　行事による普及啓発

(1) 結核感染症相談室

一般県民や外国人を対象とした結核感染症の無料相談室を毎週月曜日に福岡結核予防センター内に開設し、専門医師による助言や相談を行い、結核等の早期発見、早期治療並びにまん延防止等に努めた。また、当会ホームページからの相談にも対応した。

(2) 結核予防週間

①結核予防週間（9 月 24 日～30 日）を中心に、福岡結核予防センターに懸垂幕を掲示するとともに周知用ポスター、パンフレット等を県内市町村、関係先へ配布し広報をお願いした。

②9 月 19 日（土）、全国一斉結核予防週間キャンペーンをエルガーラ・パサージュ広場において、福岡県結核予防婦人会及び福岡市関係婦人会と共に、結核ミニ講演や健康相談、パンフレット等（3,000 組）の配布、胸部レントゲン無料健診（デジタル撮影）や血管年齢等を実施し、結核予防並びに複十字シール運動の普及啓発を行った。（参加者 51 名）

③福岡ヤフオク！ドーム球場大型ビジョンで結核予防週間（9 月 24 日～30 日）を中心に「結核予防週間」の放映をしていただき、結核予防に対する知識の高揚を広く一般に訴えた。

(3) 大会、研修会、講習会等の開催

①第 67 回結核予防全国大会

（平成 28 年 2 月 4 日（木）～5 日（金）　神奈川県横浜市：　参加者 1,300 名）

②健診実施市町村・学校・事業所等保健衛生担当者研修会

（平成 28 年 2 月 22 日（月）ホテルレガロ福岡〔福岡市〕：参加者 91 名〕

(4) テレビ、雑誌、ホームページ等による広報

結核、禁煙等の広報を新聞や雑誌に掲載した他、報道機関への結核予防他の取材に協力した。また、関係資料を当会ホームページに掲載し、普及啓発並びに広報等に努めた。

2　普及啓発資料の作成、配布

(1) 当会作成のもの

①小・中学校の結核健康診断パンフレット「小学校・中学校での結核健康診断は問診で行います」432,400 部を県内小・中学校児童生徒に配布した。

②人間ドック・健康診断パンフレット等を事業所他関係先へ配布した。

③ポケットカレンダー12,000 部を関係先及び結核予防週間キャンペーン等で配布した。

④複十字シール募金啓発用ボールペン（マーカー付ボールペン 6,760 本、消える蛍光ペン 3,668 本）を事業所等へ配布した。

(2) 公益財団法人結核予防会作成のもの

①機関紙「複十字」2,064 冊（年 6 回)、教育広報用パンフレット等を関係官公庁、市町村、学校、報道機関、婦人会、事業所等へ配布した。

②全国結核予防婦人団体連絡協議会の機関紙「健康の輪」876 冊（年 3 回）を関係官公庁、市町村、学校、報道機関、事業所等に配布した。

③結核予防パンフレット「結核の常識」50,000 部を県・市保健所、市町村、婦人会、学校及び関係団体等に配布し、研修会、講習会他で活用いただいた。

④結核予防週間ポスター6,000 部を県内保健所、関係先へ配布し周知を行った。

⑤禁煙ポスター200 部（年 1 回）を事業所等へ配布した。

(3) 資料の貸出

結核予防教育用並びに複十字シール運動の展示用パネル等を保健所他へ無償で貸し出した。

3　関係機関、協力組織との連携

(1) 結核予防婦人会との連携協調

①結核を制圧するとともに、県民への結核をはじめとする感染症及び肺がんその他の胸部疾患予防に関する理解及び普及啓発等を図るため複十字シール運動等の協力をお願いした。

②県知事表敬訪問を婦人会と行い、「複十字シール運動」の理解、周知と「複十字シール募金」に協力をお願いした。（平成 27 年 8 月 5 日）

③第 47 回九州地区結核予防婦人団体幹部講習会を長崎県にて開催した。

（平成 27 年 10 月 22 日～23 日　長崎市：ホテルニュー長崎　参加者 150 名）

上記講習会等により、結核予防の知識向上と婦人団体の交流親睦を図るとともに、組織の確保とリーダーの育成に努めた。

④第 20 回結核予防関係婦人団体中央講習会に婦人会幹部が参加した。

（平成 28 年 2 月 9 日～10 日　東京都：KKR ホテル東京　参加者 101 名）

(2) 講師派遣

保健所、婦人会、教育委員会、事業所等が開催する結核予防、保健医療、福祉総合研修、職場における健康管理や労働安全衛生管理（生活習慣病）講習会等に、センター長以下医師他を講師として派遣した。

4　表彰

永年勤続職員として、本部表彰 3 名、当会表彰 2 名、当会年間功労表彰 1 所属の表彰を行った。

5　複十字シール募金運動

(1) 目標額を 500 万円とし、平成 27 年 8 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日までの期間、婦人会、保健所、事業所による一般組織募金（団体）及び郵送募金（個人他）の方法により実施した。

| | 平成 27 年度 | （ 平成 26 年度 ） |
|---|---|---|
| 募金総額 | ４，９２２，９３５円 | （ ４，８６５，０８２円） |
| （内訳）組織募金 | ３，６１７，７４８円 | （ ３，６７６，５６３円） |

郵送募金　　１，３０５，１８７円　　（　１，１８８，５１９円）

(2) 運動の趣旨徹底と意識向上を図るため、県、政令市、県・市保健所及び婦人会等の複十字シール募金運動関係者会議を開催した。
（平成 27 年 7 月 30 日　博多サンヒルズホテル：参加者 34 名）

(3) 福岡市保健福祉センターの「健康フェアー」に参加し、結核予防普及啓発活動を行った。
早良保健所〔10 月 1 日〕・博多保健所〔10 月 3 日〕・城南保健所〔10 月 6 日〕・
南保健所〔10 月 9 日〕・東保健所〔10 月 16 日〕・西保健所〔10 月 16 日〕

(4) 研修会等開催時に、結核他の知識や予防の周知を図るとともに、国内外の結核対策の貴重な資金となる複十字シール運動の推進を図った。

(5) ㈱福岡銀行（150 ヶ所）及び㈱西日本シティ銀行（154 ヶ所）の各本店、各部・支店に「複十字シール運動」及び「結核予防週間」ポスターの掲示並びにパンフレット他を置いていただいた。

6　出版物の頒布
公益財団法人結核予防会発行の出版物「結核の統計」「結核病学シリーズ」等の斡旋、頒布を関係官公庁、病院等に行った。

| 平成 27 年度 | （　平成 26 年度　） |
|---|---|
| ８９０冊 | （　　５２９冊） |

## ８．調査研究

（1）各種統計

・結核予防会　胸部統計

・日本総合健診医学会　総合健診統計

・事業年報統計

（2）福岡県保健環境研究所との共同研究

題目「福岡県地域がん登録情報とがん検診情報を用いた胃がん・肺がん検診精度の把握」