核遺伝子に基づく被子植物群の系統解析の有効性

小菅 桂子・傳田 哲郎
(神戸大学理学部)

分子系統学は生物共通に存在する遺伝子の塩基配列を直接比較することにより、これまで困難だった高次分類群の系統解析に新たな道を開いた。被子植物では葉緑体DNAの配列、とくにリブソームRNAカルボキシラーゼ Rubisco の大サブユニット遺伝子 (*rbcL*) を使って大多数の科の系統関係が解析され、その膨大な成果は *Annals of the the Missouri Botanical Garden* Vol. 80 No. 3 (1993) にまとめられている。しかし、この遺伝子は進化速度が遅く、被子植物の属レベル以下の系統解析には必ずしも有効ではない (Doebly *et al.*, 1990; Kim *et al.*, 1992)。低次分類群間の系統を解析するためには、より進化速度の速い遺伝子や遺伝子間の非コード領域を利用する必要がある。

葉緑体ゲノムはふつう母性遺伝をするため、遺伝子は単一で重複や組み替えを起こしておらず、系統解析に利用しやすい (Clegg, 1993; Clegg & Zurawski, 1991)。一方、核遺伝子は両性遺伝をするため遺伝様式も複雑で、系統解析に利用するにはさまざまな制約がある。とくに多くの核遺伝子は重複を起こしているため、系統解析に用いる場合には比較する配列が同一の遺伝子座に由来する (orthologous) ものか、種分化に先だって重複し、独立に進化した (paralogous) かを先に区別しなければならない。

被子植物の系統推定には、従来、葉緑体ゲノムの塩基配列がおもに利用され、核遺伝子はリボソームRNA遺伝子群などに限られている。核遺伝子の進化速度は葉緑体遺伝子の4倍以上と速く (Wolfe *et al.*, 1987, 1989)、近縁な群の系統解析には有効と予想される。そこで、本稿では核遺伝子のアルコール脱水素酵素遺伝子 (*adh*) を用いたキンポウゲ科とキク科 *Brachyscome* 属の系統解析の結果をもとに、核遺伝子による系統解析上の問題点とその有効性について述べる。

解析に用いた *adh* 遺伝子断片

アルコール脱水素酵素 (ADH) は根、種子や花粉などで発現する2量体の酵素で、多くの2倍体植物で2~3種類のアイソザイムが報告されている (Gottlieb, 1982)。遺伝子座の異なる分子種間でも2量体を形成す

ることから、これらの遺伝子は重複により生じたとみなされている。イネ科では数種で2種類以上の遺伝子が報告され、種分化に先だって重複した遺伝子であることが示されている (Dennis *et al.*, 1984, 1985)。

adh 遺伝子のコード領域は全長約1.2 kb で、ふつう9カ所に約100-200 bp のイントロンが含まれている。遺伝子が重複しているため、PCR法を用いた場合、遺伝子座の異なる複数のDNA断片が増幅されることになる。そこで、欠失や挿入による長さの変異が起こりやすいイントロンをはさむように、エクソン3から4の一部を増幅した。長さの異なる2種類以上の増幅断片が得られたので、電気泳動法により各断片を分離し、さらに精製して塩基配列を決定した。キンポウゲ科で見いだされた偽遺伝子と推定される断片を除けば、増幅断片のエクソン塩基配列には挿入や欠失は認められない。えられたエクソンの塩基配列をもとにMEGA Ver. 1.0 (Kumar *et al.*, 1993) と PAUP Ver. 3.0 (Swofford, 1993) を用いて系統樹を作成した。

キンポウゲ科における系統解析

キンポウゲ科は被子植物のなかで比較的起源の古い群と考えられている。17属23種で *adh* 遺伝子断片の増幅を行ったところ、多くの種で分子量の異なる2種類の断片が増幅された。また、4倍体のタガラシ *Ranunculus sceleratus* L. とユキワリイチゲ *Anemone keiskeana* Maxim., 6倍体のアキカラマツ *Thalictrum minus* L. var. *hypoleucum* (Siebold et Zucc.) Miq., センニンソウ *Clematis terniflora* DC. とトウゴクサバノオ *Dichocarpum trachyspermum* (Maxim.) W.T. Wang et Hsiao では3種類以上の断片が増幅された。その中にはエクソン配列に1~5個の挿入や欠失、あるいは終止コドンが含まれる断片があり、これらは機能を失った偽遺伝子と考えられる。

偽遺伝子を除く、26種類の増幅断片のエクソンでは273塩基部位中、97部位が系統解析に有効な変異であった。近隣結合法 (図1)、最短距離法や最大節約法により作成した系統樹は、いずれも基部で2つのクレードに

図1. キンポウゲ科における *adh* 遺伝子のエクソン系統樹 (Kosuge *et al.*, 1995).

数値は100回のブートストラップ値を示し、和名の後の略号は解析した増幅断片番号を示す。系統樹は異なる遺伝子座に由来する *adh* 1 と 2 のクレードに基部で大きく分かれ、それぞれのクレードはさらに4つの群 (A, B, C, D) と2群 (E, F) に分かれる。

大きく分かれた (Kosuge *et al.*, 1995)。2種類の配列を解析したリュウキンカ *Caltha palustris* L. var. *nipponica* Hara, サラシナショウマ *Cimicifuga*

simplex Wormsk. とニリンソウ *Anemone flaccida* Fr. Schm. ではそれぞれの断片が両方のクレードに分かれて位置する。ユキワリイチゲで得られた2つの断片のうち、Ake-1 と名付けた一方は、エクソン3の配列を決定していないので系統樹には含まれていないが、ニリンソウの Afl-1 に最も相関性が高い。Afl-1 と Ake-1 のイントロン3の塩基配列 (図2) を比較すると、配列は14 bp の挿入 (欠失) を除けばきわめて相関性が高く、同様に Afl-2 と Ake-2 のイントロン配列にも相関性が認められる。一方、Afl-1 と Afl-2 あるいは Ake-1 と Ake-2 を比べると、イントロン両端部の配列を除いて相関性は認められない。また、同一個体から得られたほかの2種類の増幅断片間でも同様にイントロン3の相関性は見いだされない。このようにエクソンの塩基配列に基づく系統樹の基部で大きく分岐する遺伝子間では、イントロンの相関性も認められないことから、これら2種類の増幅断片は種が分化する以前に重複によって生じた異なる遺伝子座に由来するものと考えられるので、*adh* 1 と *adh* 2 として区別した。

2つのクレードは、さらにいくつかの群に分かれるが、染色体の特徴や果実の形態に基づいて推定されたこれまでの系統関係 (Gregory, 1941; Langlet, 1932; Tamura, 1966) にほぼ対応し、葉緑体遺伝子に基づく系統解析の結果 (Hoot, 1995; Johansson, 1995; Johansson & Jansen, 1993) とも矛盾しない。すなわち、*adh* 1 で分岐した4つの群は、A: キンポウゲ亜科 Ranunculoideae, B: クリスマスローズ亜科 Helleboroideae, C: カラマツソウ亜科 Thalictroideae, D: オウレン亜科 Coptidoideae に相当し、

Abu-1 GTATGTACATTT-CAAGTACATTCGTTTTTATTGTCTTTGCTCACAGCTA TTT-AATATTA-----TGTAAC--GACAATAATATAGATTTC- TTTATC
 Sad-1 GTATGTACAT-----CGTTTTACTGTCTTTGCTCACAGCTA TTT-AATATTAGGGGATGTAAC--GACAATAATATAGATTTC- TTTATC
 Era-1 GTATGTACATTTCCATGTACATTCATTTTACTTTTCATTTGCCCCGCAACTG TTC-GATGTTT-----TGTAAT--GACC-TAAA-TAGATTTCACTT----
 Ith-1 GTATGTACATT-CCAAACACATTCATTCTTACTTTTCAT-GCCTGCAACTA TTC-GATGTTT-----TGTAATCAGACC-TAAAATAGATTTCACTT----
 Dtr-1 GTATGTACATTTCCAACATTCATTCTTACTTTTCATTTGCGGATGTTT-----GTAAT--GACC-TAAAAGAGATTTCACTT----
 Tmi-1 GTATGTACATTTCCAAGTACATGCATTTTACTTTTCATTTGGGCGCAACTG TTGGGATGTTT-----ATAA--GACC-TAAAATAGATTTCACTTTATC
 Tac-1 GTATGTACATTTCCAAGTACATGCATTTTACTTTTATTACACGCAACTG TTGGGATGTGT-----TATAAC--GA-----
 Tfi-1 GTATGTACATTTCCAAGTACATTCATTTTAC-----CCGCAACTG TTGGGATGTTT-----TGTAAT--GACC-TAAAATAGATTTCACTT-ATC
 1 50

Abu-1 TTTCTCTGTTTCATTTTCATTTATCTCT-TTCTGTTACTCA---AACCA TTTCAATCTGTTTGGTGGTGTGTTA-TTTGTAG (167 bp)
 Sad-1 TTTCTCTGTTTCATTTTCATTTATCTCT-CTTCTGTTACTCA---AACCA TTTCAATCTGTTTGGTGGTGTGTTA-TTTGTAG (160 bp)
 Era-1 -----ATCTCT-CTTCTGTT-----AACTAA-CA GTTCAATTTGTTTGGTGGTGGTGGTCTGTAG (140 bp)
 Ith-1 -----ATCTCT-CTTCTGTT-----AACTAA-CA GTTCAATGTGTTTGGTGGTGGTGGTGGTCTGTAG (140 bp)
 Dtr-1 -----ATCT-T-CTTCTGTT-----TAACTAA-CA GTTCAATGTGTTTGGTGGTGGTGGTGGTCTGTAG (142 bp)
 Tmi-1 AATCATTGT-CATT-CATATATT-C-GCTTATGTTTACATACTAACTA ACCA GTTTCGATTTGTTGGATGTTGTTGG-TCTTTAG (167 bp)
 Tac-1 -----TAACTAA-CA GTTTCGAT-----TTGTTGG-TCTTTAG (96 bp)
 Tfi-1 TTTCTCTGTTTCATTTTCATTTATCTCT-TTCTGTTACTCA---AACCA TTTCAATCTGTTTGGTGGTGTGTTA-TTTGTAG (163 bp)
 101 150

図2. ニリンソウ属における *adh* 遺伝子イントロン3の塩基配列。

括弧内の数値は各イントロンの長さを示す。略号: 図1参照


```

Chr -1  GTATATA---TGTTCATCAATTCTTGCT-TTCAAGT-GTTTT-----TTAATGATAATATA--TTCACATACA-----
Chr -2  GTATATA---TGTTCATCAATTCTTGCT-TTCAAGT-GTTTT-----TTAATGATAATATA--TTCACATACACTGTCTCGATT**CTGTCTCGATT
Chr -3  GTATATA---TGTTCATCAATTCTTGCT-TTGAAGT-GTTTT-----TTAATGATAATATA--TTCACATACACTGTCTCGATT**CTGTCTCTATC
Pap -2  GTATATA---TGTTCATCAATTCTTGCTCTTTAATTAGTTATTTTTTAAATTAATGATTATATA--TTCACATACACTGTCTCGATT**CTGTCTCGATT
Tet -1  GTATATA---TGTTCATCAATTCTTGCTCTTTAATTAGTTATTTTTAT---AATTAATGATAATATA--TTCACATACACTGTCTCGATT**CTGTCTCTCTT
Den -1  GTA-----TGTTC---CAATCCTTGCT-TTCAAGT-GTTTCT-----TTAATGATAATATA--TTTACACACACTGTCTCGATT-----
Pap -1  GTA-----TGTTC---CAATCCTTGCT-TTCAAGT-GTTTCT-----TTAATGATAATATA--TTTACACACACTGTCTCGATT-----
Acu -1  GTATATATATGTTTCATCAATTCTTGCTCTTTAATTAGTTT-----TTAATGATAATATA--TTCACATACACTGTCTCGATT-----
Acu -2  GTATATA---TGTTCATCAATTCTTGCTCTTTAATTAGTTT-----TTAATGATAATATA--TTCACATACA-----
Den -2  GTATATA---TGTTCCTTCAATTCTTGCTCTTTAATTAGTTT-----TTAATGATAATATATTTCACATACACTGTCTCGATT-----
Pap -3  GTATATA---TGTTCATCAATTCTTGCTCTTTAATTAGTTT-----AATTAATGATAATATA--TTCACATACACTGTCTCGATT-----
Cur -1  GTATATA---TGTTC---ATCAATTCTTGCT-TTTTT-AGT-GTT-----ATAAAA-----ACA-----
1                               50                               100

Chr -1  -----AACT-----TTTTGGTTGGTGGGCCAACTAGATACTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTTTGGTGTATGTAAACTACTTATAA**TAC
Chr -2  GGTACT---TAACTGTAACGTTTTGGTTGATGGGCCAACTCAATACTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTT-----AATG-----ATAA-----
Chr -3  GGTATA---TAACTGTAACGTTTTGGTTGATGGGCCAACTCAATACTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTT-----AATG-----ATAA-----
Pap -2  GATACT---TAACTGTAACGTTTTGGTTGATGGGCCAACTTAACTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTT-----AATG-----ATAA-----
Tet -1  AGTACT---TAACTGTAACGTTTTGGTTGATGGGCCAACTCAATACTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTT-----AATG-----ATAA-----
Den -1  GGTACT---TAACTGTAACGTTTTGGTTGATGGGCCAACTTAACTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTTTGGTGTATGTACAATACTTATAC-----
Pap -1  GGTACT---TAACTGTAACGTTTTGGTTGATGGGCCAACTTAACTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTTTGGTGTATGTACAATACTTATAC-----
Acu -1  GGTACT---TAACTGTAACGTTTTGGTTGATGGGCCAACTTAACTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTTTGGTGTATGTACAATACTTATAC-----
Acu -2  -----AACT-----TTTTGGTTGGTGGGCCAACTCGACAGTGA--GGCCAAGCCTGCCAGAATCCATTTTGGTGTATGTACAATACTTGTAA-----
Den -2  GGTACTTAACTTAACTGTTGGCTTTTTGGTTGATGGGCCAACTCGATTCTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTTTGGTGTATGTACA-----
Pap -3  GGTACTTAACTTAACTGTTGGCTTTTTGGTTGATGGGCCAACTCGATTCTGATAGGCC-AGCCTGCCAGAATCCATTTTGGTGTATGTACAATACTTATA-----
Cur -1  -----AAATTAATCCG-----TTTT-----TACTATTT-----
150                               200

Chr -1  TATAATAAACTT-----AATGAATATGTT--ATTTGTTTTTTTA-----GTAGCATAATTTGATGGATTTAATTAATGATGTG--AATAG
Chr -2  -----TAAACTT-----AATGAATTTGTT--ATCTGTTTTTTTATATAGTACGAGTAGCATAATTTGATAGATTTT--ACTGATGTG--AATAG
Chr -3  -----TAAACTT-----AATGAATTTGTT--ATTTGTTTTTTTATATA---GTAGCATAATTTGATGGATTTAATTAATGATGTG--AATAG
Pap -2  -----TAAACTT-----AATGAATTTGTT--ATCTGTTTTTTTATAT---GTAGCATAATTTGATGGATTTAATTAATGATGTG--AATAG
Tet -1  -----TAAACTT-----AAAGAATTTGTT--ATCGTTTTTTTTTATAT-----TAGCATAATTTGATAGATTTT--TAATGATGTG--AACAG
Den -1  -AGAAATAAACTT**AACTTAAATGAATCTGTTTTTAAATTTTT-----ATAT-----GTAGCATAATTTGATGAATTTT--ACTGATGTGATCAATAG
Pap -1  -AGAAATAAACTT**AACTTAAATGAATCTGTTTTTATATTTATT---ATTTTG-----AGCACAATTTGATGGATTTT--ACTGATGTGATCAATAG
Acu -1  --TAATAAACAT-----AATAATCTGTTTTTATA--TGT-----TAGCATAATTTGATAGATTTT--AATGATGTG--AATAG
Acu -2  -----TAAACTT-----AATTAATCTGTTTTTATA--TG-----TAGCATAATTTGATAGATTTT--AATGATGTG--AATAG
Den -2  -----TAAACTT-----AATGAATCTGTT--AATATTT-----ATTTG-----GTAGCACAATTTGATGGATTTT--ACTGATGTGATCAATAG
Pap -3  -----TAAACTT-----AATTAATCTGTT--AATATTTGTT---ATTTTG-----GTAGCACAATTTGATGGATTTT--ACTGATGTG--AATAG
Cur -1  --ATATTTAGCAT-----AATT-----TTGGATGGATTTT--AATGATGTG--AATAG
250                               300

```

図4. *Brachyscome* 属における *adh* 遺伝子イントロン3の塩基配列 (Denda *et al.* 1995).

**は挿入配列の位置を示す。増幅断片記号：表1参照

特徴より単系統性が認められた *aculeata* 群の6種 (表1) において *adh* 遺伝子の解析を行った。

増幅によりそれぞれの種から1~3種類の *adh* 遺伝子断片が得られ、表1に分子量の大きいものから順に示した。イントロン3の大きさは113~548 bp でありキンポウゲ科と比べると長いものが多く、とくに *B. dentata*, *B. papillosa*, *B. chrysoglossa* では500 bp 以上であった。エクソン塩基配列は相同性が高く、系統解析に有効な変異は22部位であった。系統樹では遺伝子間や種間の関係は明確にはできないが、同じ長さのイントロンを持つ断片がそれぞれひとつのクレードにまとまる傾向が見られた。

イントロンの長さの突然変異は、微少な塩基の欠失、挿入や直列重複のコピー数の変化、あるいはレトロポゾンやトランスポゾンなどの転移因子の挿入などに起因す

る (齊藤 1994)。転移因子が関与する場合、挿入配列は比較的長く、挿入認識部位の配列は重複する (大坪 1991; 岡田 1994 a)。 *Brachyscome* 属のイントロン配列内には AT や T の数塩基対の短い挿入や欠失が多く含まれるが、数種の増幅断片では図4の**印で示した位置に、71-281 bp の比較的長い挿入が認められた。これらの長い挿入配列の前後や内部には重複を示唆するような類似した配列の繰り返しはない。しかし、挿入配列の両側には数塩基対の直接反復配列が存在するため (図4, 表1), これらは挿入因子に由来すると推定される (Denda *et al.*, 1995)。

図5に示したように挿入因子は、配列の相同性、挿入の位置と認識部位の配列より3種類に区別できる。*B. chrysoglossa* の Chr -1 の挿入因子では配列の前半部が植物の5 s RNA 遺伝子と高い相同性を示す。*B.*

化の歴史が比較的新しいと考えられるキク科 *Brachyscome* 属内では、増幅断片の配列からは明確に遺伝子座間や種間の関係を示すことはできない。

イントロンなどの非コード領域ではエクソンと比べて配列の進化速度が速く (Li & Grau, 1991), 塩基置換だけでなく、欠失や挿入といったギャップが生じるなど複雑な機構で配列の変化が起こっている。キンポウゲ科のようにイントロンの相同性が高く、ギャップが短い場合は、配列を用いて系統樹を作成することや、短鎖のギャップを含む配列の解析法 (Golengerg *et al.*, 1993; 齊藤 1994) を応用することも可能である。しかし、*Brachyscome* 属のように、挿入配列の特徴を除いて、遺伝子間の相同性が高く、遺伝子座を特定し難い場合は、配列から直接、種の系統樹を作成できない。このような場合は同じ挿入因子を共有する種群が共通の祖先種より分化したと考え、サケ科の系統解析 (岡田 1994 b) と同様に挿入因子の分布をもとに、遺伝子座の相同性や種間の関係を分岐学的に推定するのが適切であろう。

より正確な系統推定を行うためには、異なる遺伝様式を持つ葉緑体遺伝子と核遺伝子の両方を解析し、系統樹を総合的に判断することが必要である。核遺伝子にはエクソンとイントロンという進化速度と進化機構が異なる部位が含まれ、属間や属内といった近縁な群の系統解析には有効と考えられる。また、遺伝子を直接解析することにより、器官、発生段階や環境条件など特異的に発現する酵素遺伝子や機能を失った偽遺伝子も調べることができ、アイソザイム解析では困難であった倍数体形成や適応的な種分化を解明することにも活用されるであろう。

引用文献

- Clegg, M.T. 1993. Chloroplast gene sequences and the study of plant evolution. *Proc. Nat. Acad. Sci. USA* 90 : 363-367.
- Clegg, M.T. & G. Zurawski 1991. Chloroplast DNA and the study of plant phylogeny: Present status and future prospects. *In*: P.S. Soltis, D.E. Soltis & J. J. Doyle (eds), *Molecular Systematics of Plants*. p. 1-13. Chapman & Hall, New York.
- Davis, G.L. 1948. Revision of the genus *Brachyscome* Cass. Part I. Australian species. *Proc.Linn.Soc.New South Wales*. 73 : 142-241.
- Davis, G.L. 1949. Revision of the genus *Brachyscome* Cass. III. Description of three new Australian species, and some new locality records. *Proc. Linn. Soc. New South Wales*. 74 : 145-152.
- Denda, T., K. Kosuge, K. Watanabe, M. Ito, Y. Suzuki, P.S. Short & T. Yahara 1995. Intron length variation of the *adh* gene in *Brachyscome* (Asteraceae). *Pl.Mol.Biol.* (in press).
- Dennis, E.S., W.L. Gerlach, A.J. Pryor, J.L. Bennetzen, A. Inglis, D. Llewelyn, M.M. Sachs, R.J. Ferl & W.J. Peacock 1984. Molecular basis of the alcohol dehydrogenase (*Adh 1*) gene of maize. *Nucleic Acids Res.* 12 : 3983-4000.
- Dennis, E.S., M.M. Sachs, W.L. Gerlach, E.J. Finnergan & W.J. Peacock 1985. Molecular analysis of the alcohol dehydrogenase 2 (*Adh 2*) gene of maize. *Nucleic Acids Res.* 13 : 727-743.
- Doebley, J., M.L. Durbin, E. Golenberg, M.T. Clegg & D.P. Ma 1990. Evolutionary analysis of the large subunit of carboxylase (*rbcl*) nucleotide sequence among the grass (Gramineae). *Evolution* 44 : 1097-1108.
- Golenberg, E.M., M.T. Clegg, M.L. Durbin, J. Doebley & D.P. Ma 1993. Evolution of a noncoding region of the chloroplast genome. *Mol. Phylogen. Evol.* 2 : 52-64.
- Gottlieb, L.R. 1982. Conservation and duplication of isozymes in plants. *Science* 216 : 373-380.
- Gregory, W.C. 1941. Phylogenetic and cytological studies in the Ranunculaceae Juss. *Trans. Amer. Phil. Soc., n.s.*, 31 : 443-521.
- Hoot, S.B. 1995. Phylogeny of the Ranunculaceae based on *atpB*, *rbcl* and 18S nuclear ribosomal DNA sequence data. *Pl.Syst. Evol.* (in press).
- Jagadeeswaran, P., B.G. Forget & S.M. Weissman 1981. Short interspersed repetitive DNA elements in eucaryotes: transposable elements generated by reverse transcription of RNA pol III transcripts? *Cell* 26 : 141-142.
- Jensen, U., S.B. Hoot, J.T. Johansson & K. Kosuge 1995. Systematics and phylogeny of the Ranunculaceae - a revised family concept on the basis of molecular data. *Pl. Syst. Evol.* (in press).

- Johansson, J.T., Jansen R.K. 1993. Chloroplast DNA variation and phylogeny of the Ranunculaceae. *Pl. Syst. Evol.* 187 : 29-49.
- Johansson, J. T. 1995. A revised chloroplast DNA phylogeny of the Ranunculaceae. *Pl. Syst. Evol.* (in press).
- Kim, K.J. , R.K. Jansen, R.S. Wallace, H.J. Michaels & J.D. Palmer 1992. Phylogenetic implications of *rbcL* sequence variation in the Asteraceae. *Ann. Missouri Bot. Gard.* 79 : 428-445.
- Kosuge, K., K. Sawada, T. Denda, J. Adachi & K. Watanabe 1995. Phylogenetic relationships of some genera in the Ranunculaceae based on alcohol dehydrogenase genes. *Pl. Syst. Evol.* (in press).
- Kumer, S., K. Tamura & M. Nei 1993. MEGA: molecular evolutionary genetic analysis, version 1.0. The Pennsylvania State University, University Park.
- Langlet, O. 1932. Über Chromosomenverhältnisse und Systematik der Ranunculaceae. *Svensk Bot. Tidskr.* 26 : 381-400.
- Li, W.-H. & D. Graur 1991. *Fundamentals of Molecular Evolution*. Sinauer Associates, Sunderland, Massachusetts.
- McClintok, B. 1984. The significance of responses of the genome to challenge. *Science* 226 : 792-801.
- 大坪久子 1991. トランスポゾンによるゲノムの再構成. *細胞工学* 10 : 51-80.
- 岡田典弘 1994 a. レトロポゾンとゲノムの進化. *遺伝* 48 : 62-68.
- 岡田典弘 1994 b. 進化の時標としてのレトロポゾン. *蛋白質核酸酵素* 139 : 2724-2735.
- Ricard, B., B. Mocquot, A. Fournier, M. Delseny & A. Pradet 1986. Expression of alcohol dehydrogenase in rice embryos under anoxia. *Plant Pol. Biol.* 7 : 321-329.
- Sachs, M.M. & M. Freeling 1978. Selective synthesis of alcohol dehydrogenase during anaerobic treatment of maize. *Mol. Gen. Genet.* 161 : 111-115.
- 齊藤成也 1994. 塩基配列の挿入・欠失による進化と突然変異のメカニズム. *蛋白質 核酸 酵素* 139 : 2706-2714.
- Smith-White, C.R. Carter, H.M. Stace 1970. The cytology of *Brachycome*. I. The subgenus *Eubrachycome*. A general survey. *Aust. J. Bot.* 18 : 99-125.
- Swofford, D.L. 1993. PAUP: Phylogenetic analysis using parsimony ver. 3.1. Illinois Natural History Survey, Champaign, Illinois.
- Tamura, M., 1966. Morphology, ecology and phylogeny of the Ranunculaceae VI. *Sci. Rep. Osaka Univ.* 15 : 13-35.
- Wolfe, K.H., W.-H. Li & P.M. Sharp 1987. Rates of nucleotide substitution vary greatly among plant mitochondrial, chloroplast, and nuclear DNAs. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 84 : 9054-9058.
- Wolfe, K.H., P.M. Sharp & W.-H. Li 1989. Rates of synonymous substitution in plant nuclear genes. *J. Mol. Evol.* 29 : 208-211.
- 渡邊邦秋 1975. オーストラリア大陸にブラキスコーム ($2n=4$) をもつて. *遺伝* 29 : 51-57.
- Watanabe, K. & P.S. Short 1992. Chromosome number determinations in *Brachyscome* Cass. (Asteraceae: Asterae) with comments on species delimitation, relationships and cytogeography. *Muelleria* 7 : 457-471.