新規PNAを用いたガン遺伝子ターゲティング

白石 竹彦

Peptide nucleic acid (PNA)¹⁾は核酸への強い結合力と高い塩基配列特異性を有する。この高い塩基配列認識能を利用して、PNAは現在までにFISH法やポイントミューテーションの検出などに応用されている。一方、PNAには細胞膜透過性が低いと言う欠点があり、これが細胞への応用研究の障害となってきた。本稿では、PNAの修飾による細胞取り込みの向上、ならびに修飾PNAのアンチセンス法への応用についての試みを紹介したい。

PNAは天然核酸の糖-リン酸骨格をN-(2-aminoethyl)-glycineに置き換えた構造をしている。天然核酸のリン酸結合部位はpH7付近において電荷を持つものに対して、PNAのアミド結合部位は電荷を持たない。この中性の骨格のために、PNAは核酸に対して、より強く結合することが可能であり、²⁾同時に高い塩基配列特異性を示す。また、PNAはヌクレアーゼやプロテアーゼに対して耐性を示す。³⁾これらのPNAの性質は、アンチセンス医薬品として理想的であるが、⁴⁾細胞への取り込みが貧しいという点が⁵⁾応用研究の問題となってきた。⁶⁾

PNAの細胞膜透過性の改善方法は、PNAの修飾による方法と、PNAを修飾しない方法に大別される。PNAを修飾する方法として、1) ポリリジンなどの多荷電化合物をPNA分子に導入する、⁷⁾ 2) NLSなどのターゲティングペプチドをPNAに結合させる、^{8,9)} 3) リガンドや疎水性化合物を結合させる、¹⁰⁾ 4) PNAとDNAのキメラ分子を作製し、DNAトランスフェクション試薬を使用する、¹¹⁾などがある。一方、PNAを修飾しない方法としては、1) PNAを相補的配列なオリゴDNAとハイブリさせ、DNAトランスフェクション試薬を使用する、¹²⁾ 2) streptolysin-Oにより細胞膜の透過性を向上させる、¹³⁾ 3) エレクトロポレーション、4) マイクロインジェクションなどが報告されている。これらの方法はある程度の成功を取めているが、いずれの方法も汎用性のなさ、取り込み効率の低さ、合成の煩雑さなどの問題があり、決定的な方法がないのが現状である。

PNAを用いた細胞内の遺伝子発現制御を目指すためには、細胞内導入効率の高い修飾PNA分子の開発ならびに導入方法の確立がきわめて重要である。

9-Aminoacridine (Acr) 修飾 PNA の細胞取り込み

マイクロインジェクションやエレクトロポレーションなどの物理的方法を別にすると、PNAを細胞に導入する方法で決定的なものは現在のところ存在しない。一方、天然核酸(DNA, RNA)の細胞への導入方法は種々のものが報告されている。その中でも、簡便さ、導入効率、安全性などの面から、最も広く使用されている方法としてカチオン性試薬を用いるものがある。これは、核酸分子および細胞膜表面が共に負の電荷を有することを利用して、正の電荷を帯びた媒介物を使用する方法である。代表的な試薬には、カチオン性脂質やPEI (polyethylenimine)があり、プラスミドDNAなどの細胞内導入に広く利用されている。特にカチオン性脂質は多種類のものが市販され、有効な薬物キャリアーとして期待されている。しかし、PNAは中性物質であるため、カチオン性脂質をPNAに直接使用することはできない。カチオン性脂質をPNAに使用する方法として、前述のようにDNAとPNAのキメラ分子を合成する方法、あるいは相補的DNAとハイブリさせることを利用する方法が試みられている。しかしながら、前者は合成が困難であり、後者は最適化が容易ではないという問題点があり、PNAをDNAに結合させる新規な方法が必要とされている。

そこで今回、PNAをDNAに結合させる新たな方法として、DNAインターカレーターである9-aminoacridine¹⁴⁾ (Acr)を、eg1-リンカーを介してPNAのアミノ末端に

図1に今回用いたAcr-PNAの構造を示す。Acr-PNAは、DNAインターカレーターである9-aminoacridine¹⁴⁾ (Acr)を、eg1-リンカーを介してPNAのアミノ末端に

図1. 9-aminoacridine(Acr)を結合させたPNA(Acr-PNA)の構造。

著者紹介 Center for Biomolecular Recognition, IMBG, The Panum Institute (Visiting research assistant)
Blegdamsvej 3c, DK 2200N, Copenhagen, Denmark
TEL. +45-35327485 FAX. +45-35396042 E-mail: shiraishi@imbg.ku.dk

結合させたものである。この Acr-PNA の細胞取り込みを評価するために、fluorescein でラベルした PNA (Acr-FI-PNA) を使用した。また、カチオン性脂質として LipofectAMINE^R (LFA, Invitrogen) を、二本鎖 DNA として calf thymus DNA (CT-DNA) をそれぞれ用いて実験を行った。

Acr-PNA, CT-DNA および LFA の複合体を形成させた後、この複合体を HeLa 細胞培養液に添加することでトランスフェクションを行った。複合体を添加してから 18 時間後に細胞を固定し、蛍光顕微鏡にて観察を行った。

その結果 (図2), Acr-PNA/DNA/LFA 複合体をトランスフェクトした細胞において顕著な蛍光が観察され、この方法によって Acr-FI-PNA が細胞へ取り込まれることが明らかとなった。Acr-FI-PNA のみ、あるいは Acr-FI-PNA/DNA 複合体 (LFA なし) を用いた場合には顕著な細胞取り込みは観察されなかった。

一方、Acr-FI-PNA/LFA 複合体 (DNA なし) の細胞への取り込みを検討したところ、予想に反し、DNA を添

加した場合よりも効率よく細胞に取り込まれることが明らかとなった。また、Acr を持たない PNA (FI-PNA) の場合には顕著な蛍光は観察されなかったことから、Acr-FI-PNA の細胞への取り込みは Acr 分子および LFA 依存적であると考えられた。対照実験として PNA を相補的 DNA 分子と結合させて LFA を使用する方法¹²⁾も試みたが、観察される蛍光は低いものとどまった。以上の結果から、LFA のみによる導入方法を用いて Acr-PNA のアンチセンス効果を評価することとした。これは当初の狙いとは異なるが、DNA 無添加の本法のほうが簡便かつ導入効率が高かったことによる。

この Acr-FI-PNA の LFA による取り込み機構は現在のところ不明である。Acr-FI-PNA トランスフェクション開始数時間後には、細胞内にエンドソーム様の蛍光が観察される。その後、蛍光は細胞質へと分布するとともに、核に蓄積することが観察されている。このことから、Acr-PNA/LFA の細胞への取り込みはエンドサイトーシスによるものであると推察される。誌面の都合上今回は紹介しないが、本法によって細胞内に導入した Acr-PNA によってスプライシングの障害が観察されることから、Acr-PNA の核への分布は確かであると思われる。しかしながら、取り込まれた PNA の何%が実際にアンチセンス効果を発揮しているか? ということに対する明確な答えはまだない。

Acr-PNA を用いた MDM2 のターゲッティング

MDM2 タンパクは、p53 タンパク (ガン抑制遺伝子) の機能を障害あるいは、分解を促進¹⁵⁾することで、p53 の活性および量を調節している。MDM2 タンパクは特定のガン細胞において過剰発現しており、¹⁶⁾ 過剰発現した MDM2 による過剰な p53 の障害がガン化の要因であるとするモデルが提唱されている。¹⁷⁾ MDM2 の過剰発現が見られるガン細胞のうち、osteosarcoma および soft tissue ガンは野生型の p53 を保持している頻度が高いことが明らかとされている。¹⁶⁾ これら二種類のガン細胞においては過剰発現した MDM2 をダウンレギュレーションすることによって、野生型 p53 の活性化ならびにこれに由来する細胞死の誘導が可能であると考えられてきた。¹⁸⁾ 実際に培養細胞を用いたモデルにおいて MDM2 アンチセンス (S-オリゴ) がガン細胞増殖阻害作用ならびに p53 の活性化を示すことからこのモデルは支持されており、¹⁹⁾ アンチセンス法による MDM2 のダウンレギュレーションはガン治療のターゲットとして期待されている。

図2. Acr-PNA の HeLa 細胞への取り込み。HeLa 培養細胞に対する Acr-PNA の取り込みを、蛍光ラベルした PNA (2 μ M) を用いて検討した。[上側二段, 4枚] 蛍光ラベルした Acr-PNA (Acr-FI-PNA) を calf thymus 由来 DNA (CT-DNA) および LipofectAMINE^R (LFA) との複合体、あるいは LFA との複合体として投与した場合には、18 時間後には顕著な蛍光が観察された。しかしながら、この Acr-FI-PNA を CT-DNA との複合体、あるいは Acr-FI-PNA/DNA 単独で投与した場合にはほとんど蛍光は観察されなかった。[最下段, 二枚] 対照実験として Acr を持たない蛍光ラベル PNA (FI-PNA) を用いた。FI-PNA を LFA との複合体、あるいは、相補的 DNA (oligoDNA, 12bp) と LFA との複合体として使用したが、いずれの場合においても顕著な蛍光は観察されなかった。

今回、我々はアンチセンス Acr-PNA による MDM2 のダウンレギュレーション効果を検討した。MDM2 の mRNA に相補的な配列を持ったアンチセンス PNA を細胞内に導入することにより翻訳過程を阻害し、過剰発現した MDM2 タンパクの細胞内レベルを下げるのが狙いである。

MDM2 の mRNA 配列から、スタートコドン近傍をはじめとした 8ヶ所を標的部位として選び、相補的配列をもつ Acr-PNA (12bp) を合成した。これらの Acr-PNA を JAR 細胞 (ヒト由来培養細胞, MDM2 過剰発現細胞株) に対して LFA を用いて細胞内に導入し、MDM2 のダウンレギュレーション効果を比較した。その結果、8ヶ所のうち 2ヶ所の標的部位に対する PNA が有効であることが明らかとなった。

図3に最も効果的だった Acr-PNA の結果を示す。この Acr-PNA は濃度依存的に MDM2 タンパクレベルを下げると同時に、p53 レベルの上昇を誘導することが明らかとなった。一方、ミスマッチ配列を持つ PNA は両タンパクレベルに顕著な影響を示さなかったことから、Acr-PNA によるアンチセンス効果が配列特異の効果であることが示唆された。また、Acr 分子を持たない PNA も同様に両タンパク質に顕著な影響を持たなかった。

今回は結果を紹介するにとどめるが、最もアンチセンス効果の高かった Acr-PNA は、細胞増殖阻害ならびに p53 の活性化に対して、化学療法剤 (camptothecin) との相乗効果を示すことが明らかとなっている。このよう

図3. Acr-PNA による MDM2 タンパクの発現抑制。JAR 培養細胞を PNA で (LFA との複合体として) 24時間処理した後、MDM2 および p53 タンパク質レベルをウエスタンブロットにて解析した。MDM2 の mRNA に相補的な配列を持つ Acr-PNA を使用した場合には、MDM2 タンパクレベルの低下と同時に p53 タンパクレベルの上昇が観察された。一方、ミスマッチ配列をもつ Acr-PNA (Mismatch) や Acr を持たない PNA (PNA w/o Acr, MDM2 の mRNA に相補的な配列を持つが Acr を持たない PNA) は両タンパクレベルに顕著な影響を示さなかった。

なアンチセンス試薬と化学療法剤の相乗効果は、現在臨床試験中 (phase III) である Gensome^R (Bcl2 をターゲットにしたアンチセンス試薬) においても観察されている。このようなアンチセンス試薬と抗ガン剤との相乗効果は臨床応用上重要であると考えられており、興味深い結果と思われる。

PNA には細胞膜透過性が低いという欠点があり、アンチセンス PNA の応用研究の妨げとなってきた。我々は細胞取り込み能の高い PNA 分子の開発を通じて少しずつそのハードルを超えてきている。実験例で示したように、PNA を Acr 分子と結合させることによって、細胞膜透過性の向上を図り、実際に Acr-PNA が培養細胞実験系でアンチセンス効果を示すことを見いだした。しかしながら、その有効濃度は 1-2 μM と、他のタイプのアンチセンス分子よりも高濃度を必要とし、依然として十分効率的とは言えない。

PNA のアンチセンス法への応用のためには、さらに細胞導入効率が高くかつ細胞毒性の低い新規 PNA 分子の開発、あるいは新規導入方法の開発が大いに期待される。

文 献

- 1) Nielsen, P. E. *et al.*: *Science*, **254**, 1497 (1991).
- 2) Chakrabarti, M. C. and Schwarz, F. P.: *Nucleic Acids Res.*, **27**, 4801 (1999).
- 3) Demidov, V. V. *et al.*: *Biochem. Pharmacol.*, **48**, 1310 (1994).
- 4) Dias, N. *et al.*: *J. Mol. Biol.*, **294**, 403 (1999).
- 5) Ardhammar, M. *et al.*: *J. Biomol. Struct. Dyn.*, **17**, 33 (1999).
- 6) Bonham, M. A. *et al.*: *Nucleic Acids Res.*, **23**, 1197 (1995).
- 7) Liang, K. W. *et al.*: *Mol. Ther.*, **1**, 236 (2000).
- 8) Branden, L. J. *et al.*: *Nat. Biotechnol.*, **17**, 784 (1999).
- 9) Pooga, M. *et al.*: *Nat. Biotechnol.*, **16**, 857 (1998).
- 10) Pardridge, W. M. *et al.*: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **92**, 5592 (1995).
- 11) Uhlmann, E.: *Biol. Chem.*, **379**, 1045 (1998).
- 12) Doyle, D. F. *et al.*: *Biochemistry*, **40**, 53 (2001).
- 13) Faruqi, A. F. *et al.*: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **95**, 1398 (1998).
- 14) Armitage, B. *et al.*: *Biochemistry*, **37**, 9417 (1998).
- 15) Wang, H. *et al.*: *Int. J. Oncol.*, **15**, 653 (1999).
- 16) Momand, J. *et al.*: *Nucleic Acids Res.*, **26**, 3453 (1998).
- 17) Freedman, D. A. and Levine, A. J.: *Cancer Res.*, **59**, 1 (1999).
- 18) Barak, Y. *et al.*: *EMBO J.*, **12**, 461 (1993).
- 19) Chen, L. *et al.*: *Proc. Natl. Acad. Sci. USA*, **95**, 195 (1998).