Table 2. Effect of B-vitamins on the pyruvic acid production

Vitamin added	Incubation time							
	4days				7days			
	at 28°C				at 28°C			
	Py.a. mg%	Sugar consumed mg/cc	Mycelium mg	Alcohol produced mg%	Py.a. mg%	Sugar consumed mg/cc	Mycelium mg	Alcohol produced mg%
Vitamin free	8.5	8.2	28.4	29	21.0	10.0	35.0	112
B ₁	0.4	9.3	40.4	95	1.0	12.0	30.0	212
Bi	10.3	8.7	16.9	31	20.8	9.8	30.3	101
PA	—	—	—	—	25.8	12.6	97.9	86
In	7.9	9.4	44.9	52	16.8	12.0	75.2	110
B ₁ , Bi	0.6	9.5	17.2	82	1.4	11.7	29.1	182
B ₁ , PA	—	—	—	—	1.9	11.6	40.0	167
B ₁ , In	0.8	10.1	9.5	141	1.1	12.4	78.5	195
Bi, PA	6.5	7.7	28.8	23	19.3	12.9	107.4	59
Bi, In	13.0	8.4	25.6	58	19.0	12.7	64.6	125
PA, In	7.8	8.6	41.4	46	11.5	11.9	45.0	134
B ₁ , Bi, PA	1.0	8.5	28.6	98	1.8	12.5	23.8	259
B ₁ , Bi, In	—	—	—	—	1.4	13.3	41.3	228
B ₁ , PA, In	0.7	9.3	41.2	107	1.5	13.3	46.7	191
Bi, PA, In	—	—	—	—	14.0	10.9	65.8	135
B ₁ , Bi, PA, In	0.4	8.5	37.1	82	1.4	10.9	48.4	165

Amount of B-vitamins added to basal CZAPEK's medium

B₁: VitaminB₁: 25r%

Bi: Biotin: 0.6r%

PA: Ca-pantothenate: 50r%

In: Inositol: 2.5mg%

Organism: *Asp. oryzae* st. No.7

(ii) PA添加では菌体量が多い。

(iii) InにはB₁と近似の効果が認められたが、Biの効果は特に認められなかった。

終りにのぞみ発表を許可された北川本家社長北川貞次郎氏ならびに加賀山孝氏に御礼申し上げます。

(本稿の一部は昭和31年10月の大阪醸造学会において発表した)。

文 献

- 1) 市川, 安藤: 本誌, **36**, 215 (1958). 2) 北原: 本誌, **29**, 326 (1951). 3) 北原: 醸造工業の展望, 1952, P68. 4) JACKSON, W. FOSTER: Chemical activities of Fungi, 1949, p.316. 5) 福井, 谷: 本誌, **29**, 326 (1951). (昭和33.12.6受理)

清酒醸造工程における Pyruvic acid の消長

(第3報) 醗および醪中の Pyruvic acid

市 川 邦 介 (京都市工芸指導所醸造研究室)
安 藤 孝 雄 (株式会社 北川本家)

清酒醸造工程における Pyruvic acid (Py. a.) の消長を Vitamin B₁ (B₁) との関係において観察せんとし、まづ Salicylaldehyde 法とイオン交換樹脂とを組合せた Py. a. 定量法を設定した¹⁾。次いで麹菌の各種菌株の生産する Py. a. およびこれに影響をおよぼすとみられるビタミン類について検討し、麹菌の Py. a. 生産がこれと深い関係を有することを報告した²⁾。本報では清酒醸造工程中の Py. a. の消長を醗および醪について調べた

が, これについてはすでに大高³⁾, 猿野⁴⁾, 川野氏⁵⁾等の報告がある. 清酒醸造は Co-carboxylase の点からみて高度精白の水洗米を使用した B₁不足の条件におけるアルコール醸酵と考えられるので, B₁と Py. a. の関係を見ることを目的とした.

I. 実験方法

実験試料は伏見地区の3酒造工場から採取した. 醗としては速醸醗, 山廃配の二種(原料仕込配合比率は標準の麴2:蒸米5:汲水6で原料米精白度は麴米30%, 蒸米28%である)を, また醪としては速醸醗, 山廃醗使用の普通醪および速醸醗, 山廃醗使用の三増醪の四種(原料仕込配合石数は留即時において普通醪の場合, 酒母2.6, 麴4.0, 蒸米11.0, 汲水16.0, 三増醪では酒母3.6, 麴5.5, 蒸米15.5, 汲水21.2であり, 原料米精白度は麴米23~25%, 蒸米20%である)とした. 試料は醗あるいは醪をよく攪拌したのち, 数ヶ所より採取しこれを混合してその一部を使用した.

Py. a. 定量は採取試料を濾紙にて濾過し, その適量をイオン交換樹脂 Amberlite IRA-400 R-HCO₃型で処理したのち Salicylaldehyde 法によつて⁶⁾, BECKMAN spectrophotometer D.U. を用いて測定した.

B₁ 定量には試料を1分間 Homogenizer にかへ(20000r.p.m.) その一定量をとつて濾過したのちチオクロム法にしたがつて螢光度より求めた.

I. 実験結果

Fig. 1. Behavior of pyruvic acid and vit. B₁ in Sake-moto making.

がおくれて13日目からフクレの頃にかけてやはり急速に増加し, 速醸醗と同じく湧付きの頃に最高量に達して, 以後急速に減少し最高温度, 醗分けから枯し期間中もゆるやかに減少を続ける. 醗分けの時期が Py. a. の変動の小さくなつた頃に行われることは興味がある.

Py. a. の消長に關し速醸醗と山廃醗との相違は増加, 減少の速度が前者ではかなり速く, 特に湧付き休みから最高温度の時期にかけての減少が大きい.

Fig. 2. Behavior of pyruvic acid and vit. B₁ in Sake-moromi making.

(1) ピルビン酸

(a) 醗中のピルビン酸

第1図に示すように醗における Py. a. は, 速醸醗では醗立後5日間はほとんどみられないがフクレの頃に急激に増加し, 湧付き頃最高になる. それ以後急速に減少するが, 最高温度, 醗分けおよび枯し期間中は徐々に減少してゆく, この間に新たな変化はみられない. 山廃醗では増加の時期

(b) 醪中のピルビン酸

第2図に示すごとく醪における Py. a. は共通して7~9日目頃, いわゆる高泡の時期が最も多くそれ以後は日数の経過とともに減少する. このことは醪の溶解糖化が高泡の頃に最も盛んであり少しおくれて落泡の時にアルコール発酵が活発になることと一致している. 初期の Py. a. は初添から留

までの僅かの日数の間に生成されたものもあるが多くは 醗から移行したものであるとみなすのが 適當である。Py.a. に関して速醗醗使用醗とれ醗醗使用醗の間には大きい相違がみられなかつた。醗中の Py.a. の量からは速醗醗と山醗醗の優劣を論ずることはできないようである。

(2) ビタミン B₁

B₁の醗および醗中の経過を第1, 2図に示した。B₁は Py.a. と全く逆の経過を辿つた。初期のB₁は原料米に由来するものと思われる。醗の醗酵がはじまるとともにB₁は減少するが、アルコール醗酵の最も盛んな落泡のころはその量は最低となつている。酵母はB₁を合成し、B₁は酵母によつて菌体内に集積されるから酵母の活動の活潑な時は醗の濾液中ではB₁が減少したかのようにみえる。これ以後、12~13日目頃から増加してゆくがこれは後期に至り酵母の一部が自己消化の現象によつて菌体中のB₁が醗中に溶出してきたためと思われる。

Fig. 3. Correlation diagram between pyruvic acid and vit. B₁ in Saké-moromi making.

(3) ピルビン酸とビタミン B₁ との関係

Py.a. と B₁ との相関関係を求めた。両者の散布図をかくと第3図のようになり、明らかに負の相関がみられる。これを計算によつて求めると相関係数 $r = -0.676$ となり、 r の限界値は $r(n=17, 1\%) = 0.575$ であるから 1% の危険率で有意差が認められた。すなわち、Py.a. の多い時は B₁ は少く、逆に Py.a. の少い時は B₁ が多いという負の相関関係を示している。

(4) アルコール添加、三倍増醸、火入および貯蔵によるピルビン酸の変化

これら醗中の Py. a. の量がアルコール添加、三増、火入および貯蔵にしたがひどのように変化してゆくかを検討した。醗に調味液を加えた場合 keto acids が増加するという報告³⁾があるが、本実験では第4図に示すようにアルコール添加または三増により減少した。すなわち、アルコール添加の場合添加前の1/2~2/3量に減少し(1/5という例外もあつた)、三増によつては増醸前の1/4~1/3に減少した。アルコール添加または三増から上槽までの短期間にも減少した。

Fig. 4. Behavior of pyruvic acid in the pasteurized and the non pasteurized Sake during storage.

火入後の状態は、20日、40日、約200日後においても Py.a. の量に大きい変化はなく生酒も同じ傾向を示した。しかし約1ヶ年半後には、生酒においてもとの値(上槽直後の値)の1/4~2/3になつていることから、僅かながら分解作用が行われているとみられる。

(5) 清酒中のピルビン酸

川野⁵⁾、栗山氏⁶⁾等の実験では優良酒が並酒よりも一般に Py.a. の量が多いとさ

Ⅱ. 要 約

清酒醗および醗製造中の Py.a. および B₁ の消長を観察した。Py.a. は速醗醗、山醗醗ともにフクレの頃から急

(74)

高橋, 能勢) 清酒濁濁物質の検討 (I)

激に増加し、湧付きの頃において最高となり、その濃度は0.15%にも達した。両者の間には基本的な相違はないが山廃醗は速醗に比しその経過の度合が緩やかであつた。醗においては高泡の頃に最高に達し、その濃度は約0.08%になつた。以後漸減して、アルコール添加、三増等により更に減少した。

B₁は醗および醗ともに Py.a. とは全く逆の経過をたどつた。この両者の間には1%有意水準で負の相関が認められた。

火入酒、生酒ともに火入後あるいはその時期から約200日間はほとんど Py.a. の変化は認められなかつたが、約1ヶ年半経過した生酒では若干の減少を示した。

終りにのぞみ発表を許可された北川本家社長北川貞次郎氏ならびに加賀山孝氏に御礼申し上げます。また、試料の提供にあつた株式会社山本本家下出光男氏、山本辰右衛門商店藤之木昭二郎氏に深謝いたします。

(本稿の一部は昭和32年11月の大阪醸造学会において発表した)。

文 献

- 1) 市川, 安藤: 本誌, **36**, 215 (1958). 2) 市川, 安藤: 本誌投稿中. 3) 大高: 合成酒協会技術部会報, No. 10, 19 (1951).
4) 猿野: 本誌, **32**, 371 (1954). 5) 川野等: 本誌, **32**, 410, 413 (1954). 6) 栗山等: 本誌, **33**, 21 (1955). (昭和 33.12.6 受理)

清酒濁濁物質の検討 (I) アルコール添加と白ぼけ発現性の相関性に就て

高橋 暁・能勢 惟一 (東亜酒造株式会社研究室)

緒 言

アルコール添加醸造法と白ぼけ発現の相関性即ち両者の間に何等かの関連が存在するのではなからうかと云う疑いは早くから持たれていたが、只漠然とアルコール添加を行う様になつてから白ぼけ現象が多く見受けられると云う程度であり、其の間に関連性を持たす可き明確な根拠を見出すことが出来ないままにある。例えば林辺氏¹⁾はアル添の時期と醗後熟期間の関係を調べこれとの関連性を見出ささんと試みており、又昨年来の蛋白濁濁研究会²⁾でもアル添を実施する様になつた戦後と然らざる戦前の濁濁の比較差の問題等が討議されたが、何れも両者の相関性については結論が得られていない状態である。先般杉田氏³⁾は濁濁生成と火入条件の関係について報告し其の透明度指数の変化がアルコール濃度と略々平行的な関係にある点を認め、生因とアルコール濃度の関係の重要性を再認識す可き点を指摘しているが根拠となる可き理由が明確でなく想像の域を出ない。著者⁴⁾は先年白ぼけの生因について言及した際、其の原因としてアルコール添加に依り醗中のアルコール濃度が増加した場合、このことが醗中の醸造微生物からの含N-化合物の溶出を促し後に火入操作に依つて濁濁物質となる可き母体を生じたものであらうとしたが、其の後生酒の放置状態に於る其の組成変化と白ぼけ発現性の消長を調べた結果、或はアルコール濃度の異なる溶液中に於る米麴 Protease activity の変化等のことから前記のことは別個な理由に基くアルコール濃度と白ぼけ発現の相互関連性が存在する可能性を認めたので之等に就て報告する。

実験並びに考察

1) 生酒中の酵素作用とアルコール濃度について

压榨、おり引、濾過を終了した生酒中にはまだ失活しない諸酵素が存在するから当然それ等の作用が僅かながらでも行われていると考えなければならない。生清酒5例を採り常温に90日間放置した場合何れも僅かながら還元糖とフォルモール値の増加が認められた(第1表)。又同一生酒を同量用いて之にアルコール及び水を加えアルコール濃度を18, 20, 22, 24, 26各%の如く変化調製し、之等を室温に放置した場合には何れもアルコール濃度が増加してくるに伴つて還元糖とフォルモール値の増加度合が少なくなつていくことが認められた(第2表, 第3表)。

この様なことから生酒中での酵素作用はアルコール濃度に支配されていると考えて然る可きである。一方含N-化合物の分解程度について Dowex-50分子ふるい⁵⁾を用い生酒放置後の状態を調べた結果想像通りアルコール18%のものの方が26%のものより分解が進行していること、又其の他のものも、順次段階的な結果を示しておりア