

BEITRAG ZUR CHRYSOMELIDEN-FAUNA DER INSEL SIKOKU (JAPAN) I.

Von

MICHIO CHŪJŌ

*Entomologisches Laboratorium, Kaiserliche Taihoku-
Universität, Taiwan.*

Unsere heutigen Kenntnisse über die *Chrysomeliden*-Fauna der Insel Sikoku sind so arm, dass davon nur etwa 50 Arten bisher bekannt sind.

In der vorliegenden Arbeit habe ich 94 Arten, 6 Unterarten, 4 Varietäten und 4 Aberrationen aus der Insel enumeriert, wovon 1 Art, 1 Unterart und 1 Varietät in der wissenschaftlichen Welt neu, 1 Art aus der japanischen Fauna neu (mit den doppelten Sternchen), und 54 Arten, 2 Unterarten, 3 Varietäten und 4 Aberrationen aus der Fauna von Sikoku neu (mit das einzig Sternchen) sind. Aber kurz gefasst müssen sie zufolge ihrer insularen Lage eine *Chrysomeliden*-Fauna der deutlich japanischen Art sein.

Das Material, welches ich zu dieser Arbeit benutzte, hat mir Herr ICHJI OHKUBO am Kōti-ken Lehrerseminar in Sikoku mit Gültigkeit gesandt. Dem genannten Herrn möchte ich hier dafür meinen wärmsten Dank abstatten.

Besonders sage ich jetzt hier Herrn Prof. Dr. T. SHIRAKI und Herrn M. MATSUMOTO für ihre freundlichste Unterstützung besten Dank.

Familie **CHRYSOMELIDAE**

Unterfamilie **ORSODACNINAE**

*1. *Pedrillia annulata* BALY

Pedrillia annulata BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 74 (1873) (Japan).

Fundort—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kōti-ken (1 Ex., 23. VII. 1937, M. OKAMOTO leg.).

Geographische Verbreitung—Japan (Hokkaidō, Honshū u. Sikoku).

*2. *Syneta adamsi* BALY

Syneta adamsi BALY, Ann. Mag. Nat. Hist., (4) XX, p. 328 (1877) (Mandschurei: Vladimir Bai; u. Japan: Tusima).

Fundort—Turugi-yama, Tokushima-ken (1 Ex., 26. VII. 1935, I. OIKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidō, Honsyū, Sikoku, Kyūsyū u. Tusima), Mandschurei u. Amur.

Unterfamilie **CRIOCERINAE**

*3 *Crioceris rugata* BALY

Crioceris rugata BALY, Ann. Mag. Nat. Hist., (3) XVI, p. 154 (1865) (Japan).

Crioceris theana REITTER, Wiener Ent. Zeit., XVII, p. 22 (1898) (Ost-Sibirien: Chabarowka).

Fundort—Mituse-mura, Agawa-gun, Kōti-ken (2 Ex., 19. V. 1935, I. OIKUBO leg.).

Frasspflanze—*Dioscorea Tokoro* MAKINO (Japanischer Name: *Onidokoro*) [Fam. DIOSCOREACEAE—Jap. Name: *Yumonoimo-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū, Sado-ga-sima, Sikoku u. Kyūsyū) u. Ost-Sibirien.

4. *Crioceris subpolita* MOTSCHULSKY

Crioceris subpolita MOTSCHULSKY, Etud. Ent., IX, p. 22 (1860) (Japan).—

YOKOYAMA, Zoku-Nippon-no-Kōtyō, p. 12, t. ii, f. 6 (1931) (Japan: Sikoku u. Kyūsyū).—YUASA, in Nippon-Kontyū-Zukan, p. 608, f. 1190

(1932) (Japan: Hokkaidō, Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū).—KAMAYA et

ADACHI, Genshoku-Kōtyū-Zuhu, t. xxxii, f. 66 (1933) (Japan: Hokkaidō,

Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū).—HIRAYAMA, Gensyoku-Sensyu-Kontyū-

Zuhu, t. lxxviii, f. 5 (1933) (Japan: Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū).—KUSA-

NAGI, Ent. World, IV, p. 308 (1936) (Japan: Hokkaidō, Honsyū, Sikoku

u. Kyūsyū).

Fundorte—Ōnogahara, Ehime-ken (4 Ex., 19. VIII. 1936, I. OIKUBO leg.) u. Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kōti-ken (4 Ex., 19. VI. 1937, I. OIKUBO leg.).

Isizuti-yama, Ehime-ken, (nach T. KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanze—*Smilax nipponica* MIQ. (Jap. Name: *Siode*) [Fam. SMILACACEAE—Jap. Name: *Sorutoribara-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidō, Honsyū, Sikoku, Kyūsyū u. Oki-no-sima), Loo-Choo (Amami-Ōsima) u. Nordchina.

*5. *Lema adamsi* BALY

Lema adamsi BALY, Ann. Mag. Nat. Hist., (3) XVI, p. 156 (1865) (China: Chusan).

Lema quadripunctata SWARTZ, in SCHÖNHERR, Syn. Ins., I, 2, p. 281 (1808) (China).

Lema swartzi, CLARK, Cat. Phyt., p. 25 (1866) (China).

Fundorte—Kodakusa, Kôti-si, Kôti-ken (1 Ex., 15. V. 1934, I. OHKUBO leg.) u. Hituzan, Kôti-ken (1 Ex., 30. VIII. 1935, K. OIKE leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû), Korea u. Nordchina.

6. *Lema concinnipennis* BALY

Lema concinnipennis BALY, Ann. Mag. Nat. Hist., (3) XVI, p. 157 (1865) (Nordchina).—KUWAYAMA, Journ. Fac. Agr., Hokkaidô Imp. Univ., XXXIII, 1, p. 69 (1932) (Japan: Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû; Korea, Nordchina u. Turkestan).—KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 310 (1936) (Japan: Honsyû, Shikoku u. Kyûsyû; u. Nordchina).

Lema kiotoensis PIC, Mélanges Exot., Ent., XLI, p. 12 (1924) (Japan).

Fundorte—Kodakusa, Kôti-si, Kôti-ken (1 Ex., 8. VII. 1935, I. OHKUBO leg.) u. Mikazuki, Kôti-si, Kôti-ken (3 Ex., 11. VIII. 1936, I. OHKUBO leg.).

Kôyadaira, Tokushima-ken (nach S. KUWAYAMA, l. c.) u. Kazigamori, Kôti-ken (nach T. KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanze—*Commelina communis* L. (Jap. Name: *Tuyukusa*) [Fam. COMMELINACEAE—Jap. Name: *Tuyukusa-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû), Korea, Nordchina u. Turkestan.

*7. *Lema decempunctata* GEBLER subsp. *japonica* WEISE

Lema decempunctata GEBLER var. *japonica* WEISE, Horae. Soc. Ent. Rossicae, XXIII, p. 562 (1889) (Japan).

Lema decempunctata (nec GEBLER) BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 76 (1873) (Japan).

Fundort—Nagahama-mati, Agawa-gun, Kôti-ken (4 Ex., 28. IV. 1934, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Lycium chinense* MILL. (Jap. Name: *Kuko*) [Fam. SOLANACEAE—Jap. Name: *Nasubi-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû) u. Korea.

*7₁. *Lema decempunctata* GEBLER subsp. *japonica* WEISE var. *brunneipennis* KUWAYAMA

Lema decempunctata japonica var. *brunneipennis* MATSUMURA (MS) KUWAYAMA, Journ. Fac. Agr., Hokkaidō Imp. Univ., XXXIII, 1, p. 80, T.—f. IV (1932) (Japan: Honsyū).

Fundort—Nagahama-mati, Agawa-gun, Kōti-ken (3 Ex., 28. IV. 1934, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Lycium chinense* MILL. (Jap. Name: *Kulco*).
Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū u. Sikoku) u. Nordchina (Tsingtau).

8. *Lema delicatula* BALY

Lema delicatula BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 75 (1873) (Japan: Kyūsyū).—MATSUMURA, Nippon-Kontyū-Daizukan, p. 238, f. 696 (1931) (Japan: Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū).—KUWAYAMA, Journ. Fac. Agr., Hokkaidō Imp. Univ., XXXIII, 1, p. 76 (1932) (Japan: Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū).

Fundorte—Oti-mati, Takaoka-gun, Kōti-ken (1. Ex., 11. V. 1935, M. KAWASIMA leg.).

Kōyadaira, Tokushima-ken (nach S. KUWAYAMA, l. c.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū).

9. *Lema honorata* BALY

Lema honorata BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 73 (1873) (Japan: Kyūsyū).—KUWAYAMA, Journ. Fac. Agr., Hokkaidō Imp. Univ., XXXIII, 1, p. 73 (1932) (Japan: Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū).—KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 310 (1936) (Japan: Sikoku).

Fundorte—Kodakusa, Kōti-si, Kōti-ken (2 Ex., 20. V. 1933, I. OHKUBO leg.).

Kōyadaira, Tokushima-ken (nach S. KUWAYAMA l. c.); Gunge, Nakatado-gun, Kagawa-ken u. Kurozōn, Kōti-ken (nach T. KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanze—*Dioscorea japonica* THUNB. (Jap. Name: *Yamumoino*).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū, Awasima, Sado-ga-sima, Sikoku u. Kyūsyū).

10. *Lema lewisi* BALY

Lema lewisi BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 72 (1873) (Japan: Kyūsyū).—KUWAYAMA, Journ. Fac. Agr., Hokkaidō Imp. Univ., XXXIII, 1, p. 75 (1932) (Japan: Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū).—KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 310 (1936) (Japan: Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū).

Fundorte—Kodakusa, Kōti-si, Kōti-ken (6 Ex., 8. VII. 1935, I. OHKUBO leg.).

Kôyadaira, Tokushima-ken (nach S. KUWAYAMA, l. c.) u. Gunge,
Nakatado-gun, Kagawa-ken (nach T. KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanze—*Commelina communis* L. (Jap. Name: *Tuyukusa*).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sado-ga-sima, Sikoku u. Kyûsyû).

11. *Lema puncticollis* (CURTIS)

Crioceris puncticollis CURTIS, British Ent., VII, t. 323 (1830) (Europa:
England).

Lema puncticollis KUWAYAMA, Journ. Fac. Agr., Hokkaidô Imp. Univ.,
XXXIII, 1, p. 68 (1932) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû).

Lema rugicollis SUFFRIAN, Stettiner Ent. Zeit., II, 7, p. 97 (1841) (Europa).

Lema cyanella (nec LINNÉ) WEISE, Naturg. Ins. Deutschlands, 1, Abt. VI,
p. 61 (1881) (Europa).

Fundorte—Ônogahara, Ehime-ken (2 Ex., 19. VIII. 1936, I. OH-
KUBO leg.).

Kôyadaira, Tokushima-ken (nach S. KUWAYAMA, l. c.).

Frasspflanze—*Cirsium Yoshinoi* NAK. var. *shikokianum* KITAM.

(Jap. Name: *Sikoku-uzumi*) (Fam. ASTERACEAE—Jap. Name:
Kiku-ka).

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Sado-ga-sima, Sikoku
u. Kyûsyû), Mongolei, Sibirien u. Europa.

*12. *Lema scutellaris* (KRAATZ)

Crioceris scutellaris KRAATZ, Deutsche Ent. Zeitschr., XXIII, 1, p. 130, t.
ii, f. 4 (1879) (Amur).

Fundort—Nisibun-mura, Agawa-gun, Kôti-ken (1 Ex., 19. VIII.
1934, I. OHKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû),
Korea u. Amur.

Unterfamilie CLYTRINAE

*13. *Clytra laeviuscula* RATZEBURG

Clythra laeviuscula RATZEBURG, Forstins., I, p. 201 (1837) (Europa).

Clythra quadripuncta LAICHARTING, Verz. Tyrol. Ins., I, p. 167 (1781)
(Europa).

Clythra quadripuncta OLIVIER, Encycl. méth. Ins., VI, p. 32 (1791) (Europa).

Fundort—Nisitoyanagi-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (2 Ex., 25.
VI. 1933, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Salix Suidaensis* SEEM. (Jap. Name: *Yama-yamugi*)

[Fam. SALICACEAE—Jap. Name: *Yamugi-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū), Korea, Nordchina, Sibirien u. Europa.

14. *Cyaniris aurita* (LINNÉ)

Chrysomela aurita LINNÉ, Syst. Nat., ed. XXII, p. 596 (1766) (Europa).

Cyaniris aurita YOKOYAMA, Zoku-Nippon-no-Kōtyū, p. 14, t. ii, f. 10 (1931) (Japan: Hokkaidō, Honsyū u. Sikoku).

Clythra bicolor GRIMMER, STEIERMARK'S Col., p. 46 (1841) (Europa).

Fundort—Mituse-mura, Agawa-gun, Kōti-ken (3 Ex., 19. V. 1935, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Styrax japonica* SIEB. et ZUCC. (Jap. Name: *Egonoki*)

[Fam. STYRACACEAE—Jap. Name: *Egonoki-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidō, Honsyū, Sado-ga-sima, Sikoku u. Oki-no-sima), Sibirien u. Europa.

15. *Cyaniris cyanea* (FABRICIUS) subsp. *garretai* (ACHARD)

Gynandrophthalma garretai ACHARD, Bull. Soc. Ent. France, p. 61 (1921) (nom. nov.).

Gynandrophthalma (*Cyaniris*) *japonica* FLEISCHER, Wiener Ent. Zeit., XXXV, 5-7, p. 223 (1916) (Japan: Honsyū).

Cyaniropsis cyanea KONDŌ, Ent. World, II, p. 624 (1934) (Japan: Sikoku).

Fundorte—Hewa-mura, Takaoka-gun, Kōti-ken (1 Ex., 7. VIII. 1936, I. OHKUBO leg.).

Maya-yama, Tokushima-ken (nach M. KONDŌ, l.c.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū u. Sikoku), Sibirien u. Europa.

Unterfamilie **CRYPTOCEPHALINAE**

16. *Cryptocephalus approximatus* BALY

Cryptocephalus approximatus BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 93 (1873).

(Japan: Kyūsyū).—YŪASA, in Nippon-Kontyū-Zukan, p. 604, f. 1182 (1932).

(Japan: Hokkaidō, Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū; Korea, Mandchurei u. Ost-Sibirien).—KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 309 (1936) (Japan: Sikoku).

Fundorte—Mituse-mura, Agawa-gun, Kōti-ken (5 Ex., 19. V. 1935, I. OHKUBO leg.) u. Zaisyo-mura, Kagami-gun, Kōti-ken (1 Ex., 2 VI. 1935, I. OHKUBO leg.).

Kazigamōri, Kōti-ken u. Isizuti-yama, Ehime-ken (nach T. KUSANAGI, l.c.).

Frasspflanze—*Reynoutria japonica* HOUTTUYN (Jap. Name: *Itadori*)
[Fam. POLYGONACEAE—Jap. Name: *Tade-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû),
Korea, Mandschurei u. Ost-Sibirien.

*17. *Cryptocephalus discretus* BALY

Cryptocephalus discretus BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 97 (1873) (Japan:
Tusima; u. China: Chusan).

Fundort—Mituse-mura, Agawa-gun, Kôti-ken (1 Ex., 19. V. 1935,
I. OIKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku u. Tusima) u. Nordchina.

*18. *Cryptocephalus fortunatus* BALY

Cryptocephalus fortunatus BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 94 (1873)
(Japan: Honsyû; u. China: Chusan).

Fundort—Zaisyô-mura, Kagami-gun, Kôti-ken (2 Ex., 2. VI. 1935,
I. OIKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû u. Sikoku) Korea, Nordchina u.
Ost-Sibirien.

*19. *Cryptocephalus luridipennis* SUFFRIAN var. *signaticeps* BALY

Cryptocephalus signaticeps BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 91 (1873)
(Japan: Kyûsyû; u. Turkestan).

Fundort—Kodakusa, Kôti-si, Kôti-ken (2 Ex., 23. IV. 1933, I.
OIKUBO leg.).

Frasspflanze—*Quercus serrata* THUNB. (Jap. Name: *Ko-nara*) [Fam.
FAGACEAE—Jap. Name: *Buna-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku u. Kyûsyû) u. Turkestan.

*20. *Cryptocephalus nigrofasciatus* JACOBY

Cryptocephalus nigrofasciatus JACOBY, Proc. Zool. Soc. London, p. 200 (1885)
(Japan: Honsyû).

Fundort—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (1 Ex., 16.
VI. 1935, I. OIKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû u. Sikoku).

*21. *Cryptocephalus nobilis* KRAATZ

Cryptocephalus nobilis KRAATZ, Deutsche Ent. Zeitschr., XXIII, 1, p. 132
(1879) (Amur).

Fundort—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (1 Ex., 20.
VI. 1937, I. OIKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū, Sikoku u. Kyūsyū) u. Amur.

*22. *Cryptocephalus scitulus* BALY

Cryptocephalus scitulus BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 89 (1873) (Japan: Honsyū).

Fundorte—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kōti-ken (1 Ex., 22. VII. 1936, I. OHKUBO leg.) u. Higasitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kōti-ken (1 Ex., 28. VII. 1937, M. KAWASIMA leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū, Sado-ga-sima, Sikoku u. Kyūsyū).

*23. *Pachybrachys eruditus* BALY var. *doenitzi* HAROLD

Pachybrachys Doenitzi HAROLD, Deutsche Ent. Zeitschr., XXI, 2, p. 361 (1877) (Japan: Honsyū).

Fundort—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kōti-ken (3 Ex., 23. VII. 1937, M. OKAMOTO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū u. Sikoku).

Unterfamilie FULCIDACINAE

*24. *Arthrochlamys lewisi* (BALY)

Chlamys lewisi BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 83 (1873) (Japan).

Fundort—Kodakusa, Kōti-si, Kōti-ken (1 Ex., 23. VI. 1933, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Viburnum coccinum* THUNB. var. *punctatum* FRANCH. et SAV. (Jap. Name: *Kobe-no-Gumozumi*) [Fam. CAPRIFOLIAE—Jap. Name: *Suikizura-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku u. Kyūsyū).

*25. *Arthrochlamys spilota* (BALY)

Chlamys spilota BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 85 (1873) (Japan).

Fundort—Kagami-mura, Tōsa-gun, Kōti-ken (2 Ex., 9. VI. 1935, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Castanea crenata* SIEB. et ZUCC. (Jap. Name: *Kuri*) [Fam. FAGACEAE—Jap. Name: *Binu-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyū, Sado-ga-sima u. Sikoku).

Unterfamilie LAMPROSOMINAE

26. *Lamprosoma cupreatum* BALY

Lamprosoma cupreatum BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 82 (1873) (Japan: Kyūsyū).—KONNŌ, Ent. World, II, p. 624 (1934) (Japan: Sikoku).

Fundort—Zaisyo-mura, Kagami-gun, Kôti-ken (7 Ex., 2. VI. 1935, I. OHKUBO, leg.).

Mayu-yama, Tokusima-ken (nach M. KONDŌ, l. c.)

Frasspflanze—*Ardisia elata* SEEM. (Jap. Name: *Tanagaki*) [Fam. ARALIACEAE—Jap. Name: *Ukogi-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû) u. Loo-Choo (Amami-Ôsima).

Unterfamilie EUMOLPINAE

27. *Acrothinium gaschkevitchi* (MOTSCHULSKY)

Chrysocelus gaschkevitchi MOTSCHULSKY, Etud. Ent., IX, p. 23 (1860) (Japan).

Acrothinium gaschkevitchi KONDŌ, Ent. World, II, p. 624 (1934) (Japan: Sikoku).—ESAKI, HORI et YASUMATSU, Gensyoku-Nippon-Kontyû-Zusetsu, p. 296, t. cxxxiv, f. 521-1 (1939) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku, Kyûsyû, Amakusa, Yakusima u. Tusima; Formosa, China, Sibirien u. Ost-Indian).—OHKUBO, Mushi (Fukuoka), XII, p. 89 (1939) (Japan: Sikoku).

Fundorte—Mikazuki, Kôti-si, Kôti-ken (2 Ex., 22. IV. 1934, I. OHKUBO leg.) u. Kodakusa, Kôti-si, Kôti-ken (2 Ex., 4. V. 1935, I. OHKUBO leg.).

Mayu-yama, Tokusima-ken (nach M. KONDŌ, l. c.).

Frasspflanzen—*Commelina communis* L. (Jap. Name: *Tuyukusu*) u.

Corylopsis spicata SEEB. et ZUCC. (Jap. Name: *Tosamizuki*) [Fam. HAMAMELIDACEAE—Jap. Name: *Munsaku-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Awasima, Sado-ga-sima, Sikoku, Kyûsyû, Amakusa, Tusima u. Yakusima), Formosa, China, Sibirien u. Ost-Indien.

**28. *Aoria (Osnaparisis) nucea* (FAIRMAIRE)

Osnaparisis nucea FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. France, LVIII, p. 72 (1889) (China: Moupin).

Fundort—Ônogahara, Ehime-ken. (1 Ex., 19. VIII. 1936, I. OHKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku) u. China.

*29. *Basilepta balyi* (HAROLD)

Neolostoma balyi HAROLD, Deutsche Ent. Zeitschr., XXI, 2, p. 361 (1877) (Japan: Honsyû).

Fundort—Zaisyo-mura, Kagami-gun, Kôti-ken (1 Ex., 2. VI. 1935,
I. OHKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sado-ga-sima, Sikoku u. Kyûsyû).

30. *Basilepta fulvipes* (MOTSCHULSKY)

Nodostoma fulvipes MOTSCHULSKY, in SCHRECK's Reise Amurländer, II, p.
176, t. xi, f. 1 (1860) (Daurien).

Basilepta fulvipes KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 309 (1936) (Japan: Sikoku).

Nodostoma chinense LÉFÈVRE, Ann. Soc. Ent. France, (5) VII, p. 158 (1877)
(China: Kiang-Si).

Fundorte—Asahi, Kôti-si, Kôti-ken (3 Ex., 15. VI. 1934, I. OH-
KUBO leg.).

Kazigamori, Kôti-ken (nach T. KUSANAGI l. c.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sado-ga-sima, Awasima, Sikoku u.
Kyûsyû), China u. Daurien.

*30₁. *Basilepta fulvipes* (MOTSCHULSKY) ab. *aeneipenne* MOTSCHULSKY

Nodostoma aeneipenne MOTSCHULSKY, in SCHRECK's Reise Amurländer,
II, p. 177 (1860) (Daurien).

Fundort—Ikkû-mura, Tosa-gun, Kôti-ken (6 Ex., 4. VI. 1933, I.
OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Lespedeza cuneata* G. DON (Jap. Name: *Medo-hugi*)
[Fam. PAPILIONACEAE—Jap. Name: *Mume-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku u. Kyûsyû), Nordchina u. Daurien.

*30₂. *Basilepta fulvipes* (MOTSCHULSKY) ab. *atripes* (MOTSCHULSKY)

Nodostoma atripes MOTSCHULSKY, Etud. Ent., IX, p. 23 (1860) (Japan).

Fundort—Asahi, Kôti-si, Kôti-ken (7 Ex., 15. VI. 1934, M. HIRA-
ISI leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû u. Sikoku).

*30₃. *Basilepta fulvipes* (MOTSCHULSKY) ab. *picicollis* (WEISE)

Nodostoma fulvipes var. *picicollis* WEISE, Horae Soc. Ent. Rossicae, XXIII,
p. 597 (1889) (Japan u. Ordos).

Fundort—Asahi, Kôti-si, Kôti-ken (1 Ex., 15. VI. 1934, M. HIRA-
ISI leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku) u. Nordchina.

*30₄. *Basilepta fulvipes* (MOTSCHULSKY) ab. *rufotestaceum* (MOTSCHULSKY)

Nodostoma rufotestaceum MOTSCHULSKY, in SCHRECK's Reise Amurländer
II, p. 177 (1860) (Amur).

Fundort—Asahi, Kôti-si, Kôti-ken (2 Ex., 15. VI. 1934, M. HIRAI leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku), Mandschurei, Nordchina u. Amur.

*31. *Basilepta hirticollis* (BALY)

Nodostoma hirticollis BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 167 (1874) (Japan: Kyûsyû).

Fundort—Zaisyo-mura, Kagami-gun, Kôti-ken (2 Ex., 2. VI. 1935, I. OHKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku u. Kyûsyû).

*32. *Cleoporus variabilis* (BALY)

Paria variabilis BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 166 (1874) (Japan: Kyûsyû: u. Ost-Sibirien).

Fundort—Kodakusa, Kôti-si, Kôti-ken (7 Ex., 9. VI. 1935, I. OHKUBO leg. u. 3 Ex., 15. VI. 1935, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanzen—*Prunus subhirtella* MIQ. (Jap. Name: *Higan-zakura*) [Fam. AMYGDALACEAE—Jap. Name: *Sakura-ka*]. u. *Malus Halliana* KOEHN (Jap. Name: *Kaidô*) [Fam. MALACEAE—Jap. Name: *Nasi-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku u. Kyûsyû), Mandschurei, Nordchina u. Ost-Sibirien.

*33. *Colasposoma dauricum* MANNERHEIM

Colasposoma dauricum MANNERHEIM, Bull. Soc. Hist. Nat. Mus. Moscou, I, p. 247 (1849) (Daurien).

Acis cyaneum MORSCHULSKY, in SCHRENCK'S Reise Amurländer, II, p. 177, t. xi, f. 2 (1860) (Amur).

Fundort—Iku-mura, Tosa-gun, Kôti-ken (3 Ex., 11. VI. 1937, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Calyptegia japonica* CHOISY (Jap. Name: *Hirugao*) [Fam. CONVULVULACEAE—Jap. Name: *Hirugao-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Awasima, Sado-ga-sima, Sikoku u. Kyûsyû), Korea, China u. Ost-Sibirien.

34. *Demotina fasciculata* BALY

Demotina fasciculata BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 162 (1874) (Japan: Kyûsyû).

Fundort—Nagahama-mura, Agawa-gun, Kôti-ken (1 Ex., 28. IV. 1934, I. OHKUBO leg.).

(Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku u. Kyûsyû).

35. *Lypesthes ater* (MOTSCHULSKY)

Fidia ater MOTSCHULSKY, Etud. Ent., IX, p. 22 (1860) (Japan).

Lypesthes ater OHKUBO, Mushi (Fukuoka), XII, p. 89 (1939) (Japan: Sikoku)

Leptotes pulverulentus JACOBY, Proc. Zool. Soc. London, p. 203, t. xi, f. 9 (1885) (Japan: Honsyû).

Talmonus farinosus FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. France, LVIII, p. 71 (1889) (China: Moupin).

Fundorte—Mikazuki, Kôti-si, Kôti-ken (10 Ex., 6. V. 1934, I. OHKUBO leg.) u. Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (3 Ex., 20. VI. 1937, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanzen—*Corylopsis spicata* SIEB. et Zucc. (Jap. Name: *Tosumizuki*) u. *Juglans Alcockiana* DODE var. *acuta* KOHZ. (Jap. Name: *Ooi-gurumi*) [Fam. JUGLANDACEAE—Jap. Name: *Kurumi-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Sado-ga-sima, Sikoku u. Kyûsyû) u. China.

*36. *Nodina chalcosoma* BALY

Nodina chalcosoma BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 170 (1874) (Japan: Kyûsyû; u. China: Hong-Kong).

Fundort—Kodakusa, Kôti-si, Kôti-ken (3 Ex., 3. VII. 1933, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Rosa Wichuraiana* CHEN. (Jap. Name: *Teriha-noibara*) [Fam. ROSACEAE—Jap. Name: *Bura-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku u. Kyûsyû), Loo-Choo (Iriomotezima), Formosa, u. China.

*37. *Pagria flavopustulata* (BALY)

Nodostoma flavopustulatum BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 169 (1885) (Japan: Kyûsyû u. Tusima).

Fundort—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (1 Ex., 16. VI. 1935, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Glycine Max* MERR (Jap. Name: *Daizu*) [Fam. PAPILIONACEAE].

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku, Kyûsyû u. Tusima), Formosa, Philippinen, Sumatra u. Ost-Indien.

*38. *Pagria signata* (MOTSCHULSKY)

Metachroma signata MOTSCHULSKY, Etud. Ent., VII, p. 110 (1858) (Birma).

Nodostoma consimilis BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 168 (1876) (Japan: Kyûsyû u. Tusima; u. China: Chusan).

Fundorte—Tano-mati, Aki-gun, Kôti-ken (4 Ex., 9. VIII. 1934, I. OHKUBO leg.) u. Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (3 Ex., 16. VI. 1935, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanzen—*Glycine Max* MERR. (Jap. Name: *Daizu*) u. *Phaseolus chrysanthos* SAVI (Jap. Name: *Azuki*) [Fam. PAPILIONACEAE].

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku, Sado-ga-sima, Kyûsyû u. Tusima), China, Sibirien, Indo-China, Indien u. Ceylon.

*39. *Scelodonta lewisi* BALY

Scelodonta lewisi BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 165 (1874) (Japan: Kyûsyû; u. China: Chusan u. Shang-Hai).

Scelodonta orientalis LEPÈVRE, Ann. Soc. Ent. France, Bull., p. LVI (1887) (China: Tche-Kiang).

Fundort—Kodakusa, Kôti-si, Kôti-ken (1 Ex., 15. VI. 1934, I. OHKUBO leg.).

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku u. Kyûsyû) u. China.

*40. *Xanthonia placida* BALY

Xanthonia placida BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 161 (1874) (Japan: Kyûsyû).

Fundorte—Akutuki-mura, Kagami-gun, Kôti-ken (6 Ex., 1. VI. 1935, I. OHKUBO leg.) u. Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (3 Ex., 22. VII. 1936, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Morus bombycis* KOIDZ. (Jap. Name: *Kuwa*) [Fam. MORACEAE—Jap. Name: *Kuwa-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sado-ga-sima, Sikoku u. Kyûsyû).

Unterfamilie CHRYSOMELINAE

41. *Chrysolina aurichalcea* (MANNERHEIM)

Chrysolina aurichalcea MANNERHEIM, in HUMMEL, Essais, IV, p. 39 (1852) (Altai).—MATSUMURA, Nippon-Tôzoku-Kontyû-Zukan, III, pp. 75 & 110, t. xvii, f. 11 (1931) (Japan: Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû).—YUASA, in Nippon-Kontyû-Zukan, p. 600, f. 1173 (1932) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû; Sachalin, Korea, China, Mongolei u. Sibirien).—KONÔ, Ent. World, II, p. 624 (1934) (Japan: Sikoku).—KUSANAGI, Ent.

World, IV, p. 309 (1936) (Japan: Sikoku).—ESAKI, HORI et YASUMATSU, Gensyoku-Nippon-Kontyû-Zusetsu, p. 297, t. cxxxiv, f. 522-2 (1939) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Hatizyô-zima, Sikoku, Kyûsyû, Amakusa, Tusima u. Gotô (Hukue-zima); Sachalin, Korea, Kôkwa-tô, Mandschurei, China, Mongolei u. Sibirien).

Chrysomela wallacei BALY, ANN. Mag. Nat. Hist., (3) X, p. 21 (1862) (Mandschurei).

Chrysomela amethystina KOLBE, Arch. f. Naturg., LII, 1, p. 228 (1886) (Korea).

Chrysomela cupraria KOLBE, Arch. f. Naturg., LII, 1, p. 229 (1886) (Korea).

Chrysomela pekinensis FAIRMARE, Rev. d'Ent., VI, p. 331 (1887) (China: Peking).

Fundorte—Usioe, Kôti-si, Kôti-ken (3 Ex., 26. IV. 1933, I. OHKUBO leg.); Kodakusa, Kôti-si, Kôti-ken (2 Ex., 3. XII. 1933, I. OHKUBO leg.); Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (1 Ex., 25. VII. 1934, I. OHKUBO leg.) u. Kagami-mura, Tosa-gun, Kôti-ken (1 Ex., 9. VI. 1935, I. OHKUBO leg.).

Mayu-yama, Tokushima-ken (nach M. KONDÔ, l. c.) u. Turugiyama, Ehime-ken (nach T. KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanzen—*Artemisia asiatica* NAKAI (Jap. Name: Yomogi) [Fam. ASTERACEAE]. u. *Aster ageratoides* TURCZ. subsp. *amplexifolius* KIT. (Jap. Name: Yama-sirogiku) [Fam. ASTERACEAE].

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Hatizyô-zima, Awasima, Sado-ga-sima, Sikoku, Kyûsyû, Tusima, Gotô (Hukue-zima), Oki-no-sima u. Amakusa,) Sachalien, Korea, Kôkwa-tô, Loo-Choo (Amami-Ôsima), Formosa, Mandschurei, China, Mongolei u. Sibirien.

42. *Chrysomela adamsi* (BALY) subsp. *insularis* nov.

Dies ist, wenn auch der *Chrysomela adamsi* sehr ähnlich gefärbt und gebaut, durch die folgenden Merkmale, d. h. die an den Hinterteilen zusammengezogenen Seitenränder des Halsschildes und die schlanken Beine und die schwächer gefurchten Tibien leicht zu unterscheiden.

Fundort—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (11 Ex., *Cotypus*, 16. VI. 1935, I. OHKUBO leg. u. 3 Ex., *Cotypus*, 20. VI. 1937, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Alnus tinctoria* SARG. var. *obtusiloba* CALL. (Jap. Name: *Yama-hannoki*) (Fam. BETULACEAE—Jap. Name: *Sira-kunba-ka*).

Geogr. Verbr.—Japan (Sikoku).

43. *Chrysomela populi* LINNÉ

Chrysomela populi LINNÉ, Syst. Nat., ed. X, p. 340 (1758) (Europa).

Melasoma populi KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 308 (1936) (Japan: Sikoku).

Fundorte—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (4 Ex., 25.

VI. 1933, I. OHKUBO leg. u. 2 Ex., 24. VII. 1936, I. OHKUBO leg.).

Isizuti-yama, Ehime-ken u. Kazigamori, Kôti-ken (nach T.

KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanze—*Salix Sudicarpa* SEEM. (Jap. Name: *Yama-yunagi*).

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Saado-ga-sima, Sikoku u. Kyûsyû), Korea, Mandschurei, China, Sibirien, Europa, N.-W. Asien, Indien u. Nord-Afrika.

44. *Chrysomela vigintipunctata* (SCOPOLI)

Coccinella vigintipunctata SCOPOLI, Ent. Carn., p. 78 (1763) (Europa).

Melasoma vigintipunctata YOKOYAMA, Nippon-no-Kôtyû, p. 18, t. ii, f. 2 (1930) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû; Korea, Sibirien u. Europa).—YUASA, in Nippon-Kontyû-Zukan, p. 598, f. 1169 (1932) Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû; Korea, Sibirien u. C.-Europa).—KAMTYA et ADACHI, Gensyoku-Kontyû-Zuhû, pl. xxxii, f. 1 (1933) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû; Korea, Sibirien u. Europa).—KATO, Bunrui-Gensyoku-Nippon-Kontyû-Zukan, IX, pl. xiii, f. 2 (1933) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû; u. C.-Europa).—HIRAYAMA, Gensyoku-Sensyu-Kontyû-Zuhû, pl. lxxviii, f. 20 (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû; u. Korea).—KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 307 (1936) (Japan: Sikoku).—ESAKI, HORI et YASUMATSU, Gensyoku-Nippon-Kontyû-Zusetu, p. 296, t. cxxxiv, f. 522-1 (1939) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku, Kyûsyû, Oki u. Tusima; Korea, Mandschurei, Sibirien u. C.-Europa).

Chrysomela vigintimaculata BERGSTÄSSER, Nomencl., 1, p. 87, t. xiii, f. 10 (1778) (Europa).

Fundorte—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (6 Ex., 20. VI. 1937, I. OHKUBO leg.).

Miya-san, Kagawa-ken (nach T. KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanze—*Salix Sibirica* SEEM. (Jap. Name: *Yama-yanaagi*).

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû, Oki u. Tusima, Korea, Mandschrei, China, Sibirien u. Europa.

*45. *Gastroidea atrocyanea* (MOTSCHULSKY)

Gastrophysa atrocyanea MOTSCHULSKY, in SCHÖNCK's Reisen Amurländer, II, p. 222, t. xi, f. 3 (1860) (Amur).

Gastroidea tonkina ACHARD, Fragm. Ent., p. 134 (1925) (Indo-China).

Fundort—Mituse-mura, Agawa-gun, Kôti-ken (2 Ex., 19. V. 1935, I. OIKUBO leg.).

Frasspflanze—*Rumex japonicus* HORTTUYN (Jap. Name: *Gisigisi*) [Fam. POLYGONACEAE].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû), China, Indo-China u. Ost-Sibirien.

*46. *Gastrolina thoracica* BALY

Gastrolina thoracica BALY, Trans. Ent. Soc. London, (3) II, p. 228 (1864) (Japan).

Fundort—Amatubo-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (3 Ex., 23. VI. 1934, I. OIKUBO leg.).

Frasspflanze—*Juglans Allardiana* DODE var. *acuta* KOMB. (Jap. Name: *Oni-gurumi*).

Geogr. Verbr.—Japan (Sado-ga-sima u. Sikoku), China u. Ost-Sibirien.

47. *Phaedon brassicae* BALY

Phaedon brassicae BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 174 (1874) (Japan: Kyûsyû).—KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 309 (1936) (Japan: Sikoku).

Phaedon incertum BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 175 (1874) (Japan: Kyûsyû).—KONDÔ, Ent. World, II, p. 624 (1934) (Japan: Sikoku).—KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 309 (1936) (Japan: Sikoku).

Phaedon baolacensis ACHARD, Fragm. Ent., p. 139 (1926) (Tonkin).

Fundorte—Yuzuhara-mura, Takaoka-gun, Kôti-ken (3 Ex., 26. VIII. 1933, I. OIKUBO leg.).

Mayu-yama, Tokushima-ken (nach M. KUSANAGI, l. c.); Kazigamori, Kôti-ken; Turugi-yama, Ehime-ken; u. Yokita-mura, Nakatado-gun, Kagawa-ken (nach T. KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanze—*Raphanus acanthiformis* M. MOREL (Jap. Name: *Dai-kon*) [Fam. BRASSICACEAE—Jap. Name: *Aburumi-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sado-ga-sima, Sikoku u. Kyûsyû),
Loo-Choo (Amami-Osima u. Okinawa-zima), Formosa, Korea,
China u. Indo-China.

48. *Phytodecta (Asiphytodecta) rubripennis* (BALY)

Gonioclepa rubripennis BALY, Ann. Mag. Nat. Hist., (3) X, p. 28 (1862)
(Japan).

Phytodecta rubripennis MATSUMURA, Nippon-Tôzoku-Kontyû-Zusetsu, pp. 76
u. 111, t. xvii, f. 13 (1931) (Japan: Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû).—OIKE,
Ent. World, II, p. 600 (1934) (Japan: Sikoku).—KONDÔ, Ent. World, II,
p. 625 (1934) (Japan: Sikoku).—KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 307 (1936)
(Japan: Sikoku).—ESAKI, HORI et YASUMATSU, Gensyoku-Nippon-Kontyû-
Zusetsu, p. 297, t. cxxxiv, f. 523-2, (1939) (Japan: Honsyû, Sikoku, Kyû-
syû u. Tusima; u. Nordchina).

Fundorte—Nisitoyonaga-mura, Nagaoka-gun, Kôti-ken (5 Ex., 16.
VI. 1935, I. OHKUBO leg.).

Sinnyozi-yama, Kôti-ken (nach K. OIKE, l. c.); Mayu-yama,
Tokusima-ken (nach M. KONDÔ, l. c.); Hinokami-yama, Kagawa-
ken, u. Isizuti-yama, Ehime-ken (nach T. KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanze—*Wisteria floribunda* DC. (Jap. Name: *Husi*) [Fam.
PAPILIONACEAE].

Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Sado-ga-sima, Sikoku,
Kyûsyû u. Tusima).

*49. *Phytodecta* (s. str.) *rufipes* (DEGEER)

Chrysomela rufipes DEGEER, Mem., V, p. 295, t. viii, f. 25 (1775) (Europa).

Chrysomela decemnotata MARSHALL, Ent. Brit., p. 175 (1802) (Europa).

Chrysomela fulvipes DEITSCHMIDT, Fauna Austriaca, III, p. 199 (1825)
(Europa).

Fundort—Higasiyayama-mura, Tokusima-ken (2 Ex., 27. VII.
1935, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Abies tinctoria* SARG. var. *obtusiloba* CALL. (Jap.
Name: *Yama-hannoki*).

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû, Sado-ga-sima u. Sikoku), Mandschu-
rei, Sibirien, Europa u. Nord-Amerika.

50. *Plagioderia versicolora* (LAICHARTING) subsp. *distincta* BALY

Plagioderia distincta BALY, Trans. Ent. Soc. London, p. 174 (1874) (Japan:
Kyûsyû).

Plagioderia versicolora LAURENCE f. *distincta* MATSUMURA, Nippon-Kontyŭ-Daizukan, p. 247, f. 745 (1931) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû).—KAMRYA et ADACHI, Gensyoku-Kôtyû-Zuhu, t. xxxiv, f. 13 (1933) (Japan: Hokkaidô, Honsyû, Sikoku u. Kyûsyû).—KUSANAGI, Ent. World, IV, p. 311 (1936) (Japan: Sikoku).

Fundorte—Tosayama-mura, Tosa-gun, Kôti-ken (3 Ex., 9. VII. 1933, I. OHKUBO leg.).

Gunge-mura, u. Yokita-mura, Nakatado-gun, Kagawa-ken, (nach T. KUSANAGI, l. c.).

Frasspflanze—*Salix Soiducana* SEMM. (Jap. Name: *Yama-yunagi*).
Geogr. Verbr.—Japan (Hokkaidô, Honsyû, Sado-ga-sima, Awa-sima, Sikoku u. Kyûsyû), Korea, Utsuryô-tô u. Nordchina.

*51. *Potaninia cyrtonoides* (JACOBY)

Chrysonela cyrtonoides JACOBY, Proc. Zool. Soc. London, p. 206 (1885) (Japan: Honsyû).

Fundort—Umazi-mura, Aki-gun, Kôti-ken (3 Ex., 10. VIII. 1934, I. OHKUBO leg.).

Frasspflanze—*Boehmeria spicata* THUNB. (Jap. Name: *Ko-ukuso*)
[Fam. URTICACEAE—Jap. Name: *Irukusu-ka*].

Geogr. Verbr.—Japan (Honsyû u. Sikoku).