カレントレビュー

2. 生殖

b. 性分化の最近の知見

飯田 卓¹⁾²⁾ 中堀 豊¹⁾

はじめに

男と女の違いは、人間が知恵をもちはじめたときから、老若も賢愚も誰もが不思議に思い考えた問題であろう。聖書は、神はアダムの体の一部からイブを創られたと教える。果たして、「男が先にありき」で正しいのであろうか。染色体の分析が可能になった1950年代後半からの研究で、性染色体のうち Y 染色体が男性を決定する役割を担っていると考えられたが、その実体は全く不明のままであった。最近、分子生物学の発展により性染色体の構造が DNA レベルで研究されるようになった。性分化異常症例などの臨床像と DNA 解析結果の詳細な検討を通じて、性分化に関与する遺伝子の染色体上の位置が明らかになり、その一つの大きな成果として睾丸決定因子がクローン化された。ここでは性染色体の構造とともに性に関係する遺伝子研究の最近の動向について述べる。

性分化のしくみ

ヒトの染色体の数は細胞当たり46本であるが、うち44本は常染色体であり、残り2本が性

染色体である。女性では X 染色体が2本、男性では X 染色体と Y 染色体と1本ずつを持つ。

ところで男女の違いが性染色体の違いであるとするならば、その中に性別を決定している因子があることは容易に察しがつくが、一体、性を決定付けている染色体は X なのであろうか、それとも Y なのであろうか？すなわち X 染色体が2本あるから女性なのか、Y 染色体がないから女性なのか、いい換えれば X 染色体が1本しかないから男性なのか、Y 染色体があるから男性なのか、という問題である。

答はターナー症候群とクラインフェルター症候群について考えてみればすぐわかる。ターナー症候群は45, X で X 染色体を1本しか持たないが女性である。クラインフェルター症候群は47, XXY で X 染色体を2本持つが男性である。よって、ヒトでは、Y 染色体の有無が性別を決定していると考えられる。実際、三つ以上の X 染色体を持つ患者でも、Y 染色体を持つ者は男性であり、Y 染色体を持たない者は女性である。

Y 染色体の存在下で、未分化生殖腺は髄質が発達し睾丸となる。その後の性管以下の分化は発生学の教科書などに詳しいが¹⁾²⁾、睾丸の Leydig 細胞より分泌される testosterone が存在することで Wolff 管が分化し、後の精管や副睾丸になり、また Sertoli 細胞からは抗 Müller

¹⁾ 東京大学大学院医学系研究科国際保健学専攻人類遺伝

²⁾ 東京大学医学部産婦人科

〒113 東京都文京区本郷7-3-1

管ホルモン (AMH) が分泌され, Müller 管が退縮する³⁾. これが男性型の内性器の分化である. 他方, 睪丸から分泌されるこれらのホルモンが存在しないと Wolff 管は分化せず, Müller 管のみが分化して, 卵管や子宮および膣上部が完成して内性器は女性型となる.

また外性器は生殖結節の分化によるが, 男性ではその隆起と左右の融合がみられ, 陰茎と尿道ができる. 女性では泌尿生殖洞から膣の下部ができ, 生殖結節での融合が起きずに陰唇となる. 詳細は明らかでないが, testosterone は外性器付近では 5α DHT (5α デハイドロステロン) に変換されたうえで作用するとされている. 副腎からのアンドロゲンの過剰分泌により引き起こされる副腎性器症候群では, 外性器は男性化するし, 妊娠中の妊婦への過剰な男性ホルモンの投与により, 胎児性器の男性化をみるのが知られている.

睪丸決定因子 SRY をめぐって

さて前章で述べたように, Y 染色体が未分化性腺の睪丸側への分化のスイッチの役割を果たし, 睪丸がその後の内性器の分化を誘導するものであるとすれば, 当然, Y 染色体上のどこかに, 睪丸を決定する因子があるはずである. それは理論上, 睪丸決定因子 (testis determining factor; TDF) と呼ばれた. しかし, TDF が Y 染色体上のどの位置に, どれ位の大きさで存在しているかは, 長らくわかっていなかった.

分子生物学の発展に伴ない, 性染色体の遺伝子レベルの研究も始まった. 1983年に初めて Y 染色体上の DNA が数個クローン化された. その後, 徐々に Y 染色体上の遺伝子がクローン化されるようになり, これらの DNA プローブを利用して, Y 染色体の構造がわかってきた.

1986年には, Y 染色体の短腕の最も遠位端に X 染色体と組み換えを起こす部分, すなわち, 偽常染色体領域 (pseudoautosomal region;

PAR) が存在していることがわかった. また, そのすぐ内側 (動原体寄り) に TDF が存在していることもわかってきた. これは, 後述する XX 男性患者の染色体の解析からわかってきたものである⁴⁾.

1987年, Page et al. は, PAR より約250kb (kb; キロベース, 1 ベースは遺伝子を構成する一つの核酸にあたる) 動原体側に, 哺乳類において進化上保存されている部分を見出し, ここに遺伝子を発見したことを報告した⁵⁾. その構造から ZFY (Zinc Finger Protein) と名付けられたこの遺伝子は TDF の候補と考えられたが, その後の研究で, この遺伝子は X 染色体上に相同な DNA を持っていること⁶⁾, また有袋類では常染色体上に存在すること⁷⁾などから, TDF ではない可能性が示唆された.

1990年, Goodfellow et al. のグループは PAR 近傍の Y 特異的な35kb の領域に哺乳類で進化上, 広く保存されている遺伝子を見つけ, SRY (sex determining region Y) と命名した⁸⁾⁹⁾. この遺伝子が TDF である可能性については, 種々の状況証拠が得られていたが¹⁰⁾¹¹⁾, 1991年, Koopman et al. は, マウス Y 染色体上のヒト SRY と相同な14kb の領域 (Sry と表記) をマウス胎仔に注入する実験を行い, 染色体が XX であるにもかかわらず, オスのマウスを発生させることに成功し, SRY 遺伝子が長い間探し求められてきた TDF であることを直接証明した¹²⁾.

HY 抗原は1950年代にみつかったオス特異的抗原であり, 当初は TDF の本体と考えられていた¹³⁾が, 現在では睪丸の分化とは無関係であると考えられている. 精子形成に関与するといった意見もあり, Y 染色体長腕の動原体寄りにあることがわかっている¹⁴⁾が遺伝子としてクローン化はされておらず, 機能もわかっていない.

図1は, Y 染色体から SRY が同定されるま

図1 Testis-determining factor (TDF) 発見の歴史. SRY がみつかるまで, Y 染色体上の睾丸決定因子が SRY 領域に特定されるまでの変遷. 黒く塗られた部分に決定因子 (TDF) が想定された (McLaren 1990, より改変).

での過程を McLaren がまとめたものである¹⁵⁾. 1959年, Jacobs and Strong が Y 染色体が男性側への性分化を決定する¹⁶⁾と記して以来, Y 短腕¹⁷⁾¹⁸⁾, HY 抗原, ZFY, SRY と移り変わり, SRY が TDF の本体であると確認されるまで, 実に30年以上の年月を要していることがわかる.

現在では, SRY 遺伝子はイントロン(真核生物の遺伝子の中で, 直接蛋白合成に与からない余計な塩基配列部分)を含まない, 約600塩基のごく短い遺伝子であり, 推定される構造はある種の DNA 結合蛋白質にみられる HMG box という構造に類似したモチーフを持つと考えられている¹⁹⁾. したがって SRY 遺伝子の活性化により, そのより下流にあたる遺伝子が特異的に順々に活性化されていく可能性もあり, ショウジョウバエなどにおけるカスケード型の性分化の支配系がヒトにおいても存在する可能性は否定できない.

また最近, SRY 蛋白が Müller 管抑制因子の遺伝子(第19番染色体に位置する³⁾)に直接結合して, その発現を起こすとの報告もでて²⁰⁾. SRY が睾丸の分化のスイッチとしての機能に

止まらず, Sertori 細胞の分化や機能の調節に関与している可能性があることになる.

性分化とその異常

ヒトの生殖細胞がつくられる際の減数分裂では, 常染色体および女性の2本の X 染色体においては, 相同染色体間で交叉 (DNA 鎖の交換) が行われる. 性染色体の短腕の最遠位部には X 染色体と Y 染色体とで相同な部分があり, 男性の減数分裂では相互の間で交叉を生じ, 常染色体上の遺伝子と区別できない行動(子孫への伝わり方)を示すので(図2), 偽常染色体領域 (PAR, 前述)と呼ばれる. この PAR のほんの少し近位側(動原体側)に SRY が存在している. この区間はあまりに PAR に近いので, 数万に一度程度の頻度で減数分裂の際に交叉に巻き込まれ, X 染色体と Y 染色体との間で SRY のやりとりが行われてしまうことになる. この結果, 以下のような性分化異常が生ずると考えられる.

① XX 男性

睾丸を持つなど, 表現型が男性型であるが染色体が46, XX である例であり, XX 男性と呼ん

図2 キアズマ. 男性の減数分裂の際, XとY染色体の短腕側が互いに接して並び, 偽常染色体領域(PAR)の内部で組み換えを起こす(キアズマ). SRYは, PAR近位側境界のすぐ動原体側に位置する.

でいる.

臨床症状としては, 男性不妊(造精機能がない azoospermia), 低身長があげられる²¹⁾²²⁾. また非定型的な例としては尿道下裂などの外性器異常を示す例もある. XX男性は既出のように主としてSRYがX染色体に移ってしまうことによりSRYを持つXが生じ, XXでも睾丸が発生したものと考えられる²³⁾²⁴⁾(図3).

当教室で行ったXX男性のY染色体のDNA解析では, 外性器異常のなかった症例では1例を除く全例でSRYを検出し, 尿道下裂などの外性器異常の認められた患者では, SRYを認めた例はなかった. この結果より, XX男性でも外性器異常のあるものとないものでは, 発

図3 性分化異常の起こるしくみ. 交叉の際, SRYがX染色体上に移りそのXを受け取るとXX男性となる. SRY(-)となったYを受け取るか, SRYはY染色体上に残っていても突然変異などにより機能を失うと, XY女性となる(参考文献12. より引用).

生の機序が違っていることが示された²¹⁾. 尿道下裂を伴うXX男性の多睾丸の一例で, 睾丸と会陰部に限局したY染色体を含む細胞の混在(モザイク)を検出したが²⁵⁾この型の症例の発症機構について示唆するところのある症例である(表1-1).

② XY女性

表現型が女性であるが, 核型が46, XYである症例はさまざまな原因で生ずるが, 睾丸女性化症候群などはY染色体の存在と正常な睾丸の存在という組み合わせに異常はないので除外し, ここでは性腺の発生, 分化に異常を示すものにしぼって論ずる. まず, SRYが交叉の相手方であるX染色体に移ってしまい, Y染色体上に存在しない例²⁶⁾²⁷⁾が理解しやすい. PARの内部で交叉が生じ, SRYはY染色体上に残るのが正

表1-1 XX 男性患者の DNA の解析. 外陰部に異常がみられない患者では SRY は存在し, 尿道下裂などの異常のみられる患者では, 通常の XX 男性にみられる XY 型転座の型での SRY 遺伝子は検出されなかった. Y 染色体の各プローブは図 6 に示したものをを用いた (Numabe et al. 1992年, より改変).

部位 患者	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	~	25	Hypo	Age(yrs)
	PABY	SRY	ZFY	DXYS5	DXYS73Y	DYF27B	DYF27C	DYS131B	DYS7A/B	DYS130	AMGL	DYS7D	~	DYZ1		
A	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	~	-	-	30
B	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	~	-	-	12
C	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	~	-	-	12
D	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	68
E	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	42
F	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	39
G	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	4m
H	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	23
I	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	18
J	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	41
K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	+	17
L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	+	13
M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	+	15
N	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	+	11
O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	+	3

Hypo: 尿道下裂

常であるが, SRY より近位側(動原体側)で交叉が生じたため, SRY が Y 染色体から X 染色体上に転座したものである. XX 男性と同一の発症機構であるが, この型の XY 女性は実際には稀である. 他方, SRY が存在しても, 遺伝子として発現しない異常な SRY であるために, 睪丸が発生しなかったと考えられる例がある. こちらの例はかなり多いと考えられている²⁸⁾²⁹⁾. そのような SRY には, 遺伝子の点突然変異²⁸⁾や, 3 の倍数と異なる数の塩基の欠失(遺伝子では三つの塩基で一つのアミノ酸をコードしている)ので, 欠失より下流で読み枠のズレが生ずるため, frame shift mutation と呼ぶ)による例やもっと大きな欠失例が報告されている³⁰⁾³¹⁾ (図 3). ちなみに当教室で行っている PCR 法による数例の日本人症例での SRY の

表1-2 XY 女性における SRY 領域の解析.

各症例とも SRY を含んでいた(著者ら, 未発表. 表1-1, 表1-2はいずれも東大人類遺伝学教室における解析例).

患者	PAB	SRY	Age	U	V	G
P		+	10	+	-	
Q		+	28	+	+	
R	+	+	12	+		
S		+	10	+		
T	+	+	17	+	+	小
U	+	+	30	+	+	索状
V	+	+	2	-		
W	+	+	12			
X	+	+	30	+	+	索状

U: 子宮, V: 膣, G: 性腺

検出では、完全な SRY の欠失のあったものはみられず、さらに塩基レベルでの解析をすすめているところである (表 1-2)。

臨床症状としては原発性無月経、高身長、性成熟の未熟性、両側索状性腺 (streak gonad)、未分化性腺腫瘍 (gonadoblastoma)、性ステロイドの欠損や低値、ゴナドトロピンの高値、などが報告されている³²⁾³³⁾。gonadoblastoma に関しては、Troche and Hernandez が性分化異常における危険率を約25%と報告している³⁴⁾が、140の症例のうち、53.1%が gonadoblastoma, 19.6%が dysgerminoma, 17.5%が両者の混合型, 9.8%がその他の組織型であったという。これらの症状発現には Y 染色体上の種々の遺伝子が関与している可能性があり、特に性腺腫瘍の好発は Y 染色体によるものと考えられる。遺伝子転座については長腕遠位側の、約半数の座位を除外したところである³⁵⁾。

性分化に関係する SRY 以外の遺伝子

Koopman et al.のマウス Sry の導入実験は、Y 染色体上の Sry 単独で睾丸の発生をみたわけであるが、ごく最近、性分化に関係する遺伝子は Y 染色体上にある SRY のみではないとの報告がいくつかみられるので、簡単に記載しておく。SRY は未分化性腺を睾丸に分化させるスイッチの役割を果たすが、男性型の表現型の完成や精子の形成までには複数の遺伝子が関与していると思われる。SRY 蛋白質によりその発現がコントロールされる遺伝子の異常による疾患、という概念も存在する。性管の抑制ホルモンなどの機能発現の調節などはその一つである。また、XY 女性では SRY に異常の認められない例が多いと報告されている²⁸⁾ことも、他の遺伝子の関与を示唆するものといえよう。一方、XY 女性患者のなかに X 染色体短腕の中部の重複³⁶⁾³⁷⁾や、常染色体である 9 番染色体の短腕遠位部のモノソミーの例³⁸⁾があり、性分化にな

んらかの影響を及ぼす遺伝子の一つがここに存在している可能性がある。

以上、SRY 遺伝子の存在が男性器の分化の出発点であり、その後の分化において種々の遺伝子が関与するが、それらは必ずしも Y 染色体上にあるわけではなく、SRY を含めた遺伝子レベルで全く正常な Y があっても、性分化異常がみられる可能性があると考えられる。不妊症、月経異常などがみられた患者のうち、婦人科的に原因不明のものは核型の検索を行ってみる価値があると考えられる。Y 染色体が検出された場合、SRY の存在を調べ、さらに塩基レベルでその変異の有無の確認をし、それでも異常が認められない場合は、SRY 以下のカスケードの異常を疑ってみることになる。

Y 染色体上の遺伝子

性分化異常の臨床症状を考えるうえで、Y 染色体の構造を知っておくと理解しやすい。数年前までは、Y 染色体上には TDF 以外の遺伝子はほとんど存在しないと考えられていたが、現在では偽常染色体領域 (PAR) 中には細胞表面抗原や granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF) のアルファサブユニットリセプター (CSF2RA)、身長を決定する遺伝子などが、短腕の動原体寄りには歯のエナメル質形成に関するアメロゲニン遺伝子 (AMGL)、リボゾーム蛋白 S4 (RPS4Y)、zinc finger protein Y (ZFY)、長腕には、Kallman 症候群 (Kall)、性腺腫瘍 (gonadoblastoma) に関係する遺伝子があると考えられる。また場所は不明であるが動作性 IQ の遺伝子、その他機能を失った pseudogene の存在も知られている³⁹⁾⁴⁰⁾ (表 2)。また ZFY, RPS4Y, AMGL, pseudogene のいくつかで X 染色体と相同性のあるものがあり、X 染色体と Y 染色体とは一对の相同染色体から進化し、Y が特殊化したという考えを裏付けている。

表2 Cloned genes on the Y chromosome

Pseudoautosomal region	
CSF 2 RA (Alpha subunit of colony stimulating factor)	
MIC 2 (glycoprotein involved in T cell adhesion)	
X-Y homologous region	
ZFY (Zinc finger protein)	
RPS 4Y (Ribosomal protein Y)	
AMGL (Amelogenin)	
KAL-Y (Kallmann syndrome)	
STSP (Steroid sulfatase pseudogene)	
Y-specific	
SRY (Testis determining)

図4 Y染色体の構造解析。東大人類遺伝学教室における解析の態勢を示す。サザン法以外に、PCR法で解析可能な部分に*を付した(Nagafuchi et al., 1992年)。cen: 動原体, p: 短腕, q: 長腕を示す。

当教室では現在、図4に示すようなプローブを用い、Y染色体全域にわたる構造解析を行っている。また、最近、より詳しく解析を行いまた遺伝子を見つけだすために、酵母を利用したクローン化の系であるYAC (yeast artificial chromosome)を導入し、Y染色体上遺伝子のクローン化を目指している。

以上、現在までに明らかとなっている、性分化に関する知見とY染色体上の遺伝子につき概観した。

まとめ

性分化異常の原因

内外性器異常, その他性分化異常を疑わせる臨床症状

→核型の検索

① XX 男性

a. 減数分裂時の交叉の異常によるSRYの転座が成因。

b. SRYを含むY染色体の断片の存在が診断根拠になる。

② XY 女性における所見 SRYの有無

a. 減数分裂時の組み換え異常	-
b. SRY内の突然変異	△(不完全)
c. SRY以下の決定因子の異常	+
d. モザイク	+
e. その他未知の異常	+

謝辞

本稿を終えるにあたり、ご校閲を頂いた、東京大学人類遺伝学教室、中込弥男教授に感謝いたします。

文献

1. Jost A. The background of intersexuality. In: Howard WJ, William WC, eds. Hermaphroditism, Genital Anomalies and Related Endocrine Disorders, Baltimore: Williams and Wilkins, 1958
2. Langman J. Medical Embryology, 4th edition. Baltimore: Williams and Wilkins, 1981
3. Cohen-Hauser O, Picard JY, Mattei MG,

- Serero S, Nguyen VC, de Tand MF, Guerrier D, Hors-Cayla MC, Josso N, Fresal J.* Mapping of the gene for anti-Müllerian hormone to the short arm of human chromosome 19. *Cytogenet Cell Genet* 1987; 44: 2—6
4. *Ferguson-Smith MA, Cooke A, Affara NA, Boyd E, Tolmie JL.* Genotype-phenotype correlation in XX males and their bearing on current theories of sex determination. *Hum Genet* 1990; 84: 198—202
 5. *Page DC, Mosher R, Simpson EM, Fisher EMC, Mardon G, Pollack J, McGillivray B, de la Chapelle A, Brown LG.* The sex-determining region of the human Y chromosome encodes a finger protein. *Cell* 1987; 51: 1091—1104
 6. *Verga V, Erickson RP.* An extended long-range restriction map of the human sex-determining region on Yp, including ZFY, finds marked homology on Xp and no detectable Y sequences in an XX male. *Am J Hum Genet* 1989; 44: 756—765
 7. *Sinclair AH, Foster JW, Spencer JA, Page DC, Palmer M, Goodfellow PN.* Sequences homologous to ZFY, a candidate human sex-determining gene, are autosomal in marsupials. *Nature* 1988; 336: 780—783
 8. *Sinclair AH, Berta P, Palmer MS, Hawkins JR, Griffiths BL, Smith MJ, Foster JW, Frischauf AM, Lovell-Badge R, Goodfellow PN.* A gene from the human sex-determining region encodes a protein with homology to a conserved DNA-binding motif. *Nature* 1990; 346: 240—244
 9. *Gubbay J, Collignon J, Koopman P, Capel B, Economou A, Münsterberg A, Vivian N, Goodfellow P, Lovell-Badge N.* A gene mapping to the sex-determining region of the mouse Y chromosome is a member of a novel family of embryonically expressed genes. *Nature* 1990; 346: 245—250
 10. *Berta P, Hawkins JR, Sinclair AH, Taylor A, Griffiths BL, Goodfellow PN, Fellous M.* Genetic evidence equating SRY and the testis-determining factor. *Nature* 1990; 348: 448—450
 11. *Koopman P, Münsterberg A, Capel B, Vivian N, Lovell-Badge N.* Expression of a candidate sex-determining gene during mouse testis differentiation. *Nature* 1990; 348: 450—452
 12. *Koopman P, Gubbay J, Vivian N, Goodfellow PN, Lovell-Badge N.* Male development of chromosomally female mice transgenic for Sry. *Nature* 1991; 351: 117—121
 13. *Wachtel SS, Ohono S, Koo GC, Boyse EA.* Possible role for H-Y antigen in primary determination of sex. *Nature* 1975; 275: 235—236
 14. *Simpson E, Chandler P, Goulmy E, Distèche CM, Ferguson-Smith MA, Page DC.* Separation of the genetic loci for the H-Y antigen and for testis determination on human Y chromosome. *Nature* 1987; 326: 876—878
 15. *McLaren A.* What makes a man a man? *Nature* 1990; 346: 216—217
 16. *Jacobs PS, Strong JA.* A case of human intersexuality having a possible XXY sex-determining mechanism. *Nature* 1959; 183: 302—303
 17. *Nakagome Y, Sasaki M, Matsui I, Kawazura M, Fukuyama Y.* A mental retarded boy with minute Y chromosome. *J Pediat* 1965; 67: 1163—1167
 18. *Jacobs PS, Ross A.* Structural abnormalities of the Y chromosome in man. *Nature* 1966; 210: 352—354
 19. *Su H, Chris Lau YFC.* Identification of the transcriptional unit, structural organization, and promoter sequence of the human sex-determining region Y(SRY) gene, using a reverse genetic approach. *Am J Hum Genet* 1993; 52: 24—38
 20. *Haqq CM, King CY, Donahoe PK, Weiss MA.* SRY recognizes conserved DNA sites

- in sex-specific promoters. *Proc Natl Acad Sci USA* 1993 ; 90 : 1097—1101
21. Numabe H, Nagafuchi S, Nakahori Y, Tamura T, Kiuchi H, Namiki M, Kohda N, Fukushima Y, Fuse H, Kusano M, et al. DNA analysis of XX and XX-hypospadiac males. *Hum Genet* 1992 ; 90 : 211—214
 22. Abbas NE, Toubblanc JE, Boucekkine C, Toubblanc M, Affara NA, Job JC. A possible common origin of “Y-negative” human XX males and XX true hermaphrodites. *Hum Genet* 1990 ; 84 : 356—360
 23. Berkovitz GD, Fechner PY, Marcantonio SM, Bland G, Stetten G, Goodfellow PN, Smith KD, Migeon CJ. The role of the sex-determining region of the Y chromosome (SRY) in the etiology of 46,XX true hermaphroditism. *Hum Genet* 1992 ; 88 : 411—416
 24. Nakagome Y, Seki S, Fukutani K, Nagafuchi S, Nakahori Y, Tamura T. PCR detection of distal Yp sequences in an XX true hermaphrodite. *Am J Med Genet* 1991 ; 41 : 112—114
 25. Yoshida M, Kakizawa Y, Moriyama N, Minowada S, Higashihara E, Aso Y, Nakagome Y, Nakahori Y, Nagafuchi S, Tanae A. Deoxyribonucleic acid and cytological detection of Y-containing cells in an XX hypospadiac boy with polyorchidism. *J Urology* 1991 ; 146 : 1356—1358
 26. Levilliers J, Quack B, Weissenbach J, Petit C. Exchange of terminal portions of X- and Y-chromosomal short arms in human XY females. *Proc Natl Acad Sci USA* 1989 ; 86 : 2296—2300
 27. Blagowidow N, Page DC, Huff D, Mennuti MT. Ullrich-Turner syndrome in an XY female fetus with deletion of the sex-determining portion of the Y chromosome. *Am J Med Genet* 1989 ; 34 : 159—162
 28. Hawkins JR, Taylor A, Berta P, Levilliers J, Aumera BV, Goodfellow PN. Mutational analysis of SRY : nonsense and missense mutations in XY sex reversal. *Hum Genet* 1992 ; 88 : 471—474
 29. Hawkins JR, Taylor A, Goodfellow PN, Migeon CJ, Smith KD, Berkovitz GD. Evidence for increased prevalence of SRY mutations in XY females with complete rather than partial gonadal dysgenesis. *Am J Hum Genet* 1992 ; 51 : 979—984
 30. Page DC, Fisher EMC, McGilvray B, Brown LG. Additional deletion in sex-determining region of human Y chromosome resolves paradox of X, t(Y ; 22) female. *Nature* 1990 ; 346 : 279—280
 31. Jäger RJ, Anvret M, Hall K, Scherer G. A human XY female with a frame shift mutation in the candidate testis-determining gene SRY. *Nature* 1990 ; 348 : 452—454
 32. Tsutsumi O, Iida T, Hakuno N, Sadatsuki M, Okai T, Taketani Y, Nagafuchi S, Nakahori Y. Y chromosome analysis and laparoscopic surgery in XY pure gonadal dysgenesis : A case report and a review of literature. *Asia-Oceania J Obstet Gynaecol* 1993 ; 19 : 95—99
 33. Mittwoch U. Sex determination and sex reversal : genotype, phenotype, dogma and semantics. *Hum Genet* 1992 ; 89 : 467—479
 34. Troche V, Hernandez E. Neoplasia arising in dysgenetic gonads. *Obstet Gynecol Surv* 1988 ; 41 : 74—79
 35. Nagafuchi S, Tamura T, Nakahori Y, Takano K, Nishi Y, Iwatani N, Kitao M, Hori Y, Konda S, Hasegawa T, et al. The majority of the marker chromosomes in Japanese patients with stigmata of Turner syndrome are derived from Y chromosomes. *Hum Genet* 1992 ; 89 : 590—592
 36. Scherer G, Schempp W, Fraccaro M, Bausch E, Bigozzi V, Maraschio P, Mortali E, Simoni G, Wolf U. Analysis of two 47,XXX males reveals X-Y interchange and maternal or paternal nondisjunction. *Hum*

- Genet 1989; 81: 247—251
37. *Ogata T, Hawkins JR, Taylor A, Matsuo N, Hata J, Good fellow PN.* Sex reversal in a child with a 46,X,Yp+karyotype: Support for the existence of a gene(s), located in distal Xp, involved in testis formation. *J Med Genet* 1992; 29: 226—230
 38. *Jotterand M, Juillard E.* A new case of trisomy for the distal part of 13q due to maternal translocation. *Hum Genet* 1976; 33: 213—222
 39. *Vollrath D, Foote S, Hilton A, Brown LG, Beer-Romero P, Bogan JS, Page DC.* The human Y chromosome: A 43-interval map based on naturally occurring deletions. *Science* 1992; 258: 52—59
 40. *Foote S, Vollrath D, Hilton A, Page DC.* The human Y chromosome: Overlapping DNA clones spanning the Euchromatic region. *Science* 1992; 258: 60—67
- 参考文献
1. *Thompson MW, McInnes RR, Willard HF.* Genetics in medicine, 5th Edition. Philadelphia: Saunders, 1991
 2. *Therman E, Susman B.* The similarity of phenotypic effects caused by Xp and Xq deletions in the human female: A hypothesis. *Hum Genet* 1990; 85: 175—183
 3. *Burgoyne PS, Mahadevaiah SK, Sutcliffe MJ, Palmer SJ.* Fertility in mice requires X-Y pairing and a Y-chromosomal “spermiogenesis” gene mapping to the long arm. *Cell* 1992; 71: 391—398
 4. *Human Gene Mapping 11: Cytogenetics and Cell Genetics 58, Basel: Karger, 1991*
 5. 毛利秀雄 監修. 精子学. 東京大学出版会, 1992
 6. 睾丸決定因子 (TDF) をめぐって. ホと臨 1993年2月号
 7. 中込弥男. 性差の分子生物学. 日本性研究会議 会報, 第4巻, 第1号, 1992年
 8. 中込弥男. X染色体とY染色体. 新小児科学大系年刊版, 小児医学の進歩, 1991; '91A(別冊)
 9. 中込弥男, 永瀬成夫, 中堀 豊, 田村高志. Y染色体の分子生物学. 内分泌学の進歩 1991; 9: 166—176
 10. 中込弥男, 永瀬成夫, 中堀 豊. PCRによる性の決定. 蛋白質・核酸・酵素 1992; 37: 2191—2195
 11. 中込弥男, 中堀 豊, 永瀬成夫. Y染色体のゲノム解析. 蛋白質・核酸・酵素 1993; 38: 278—283
 12. 堤 治, 武谷雄二. 胎児新生児の性機能. 産と婦 1993; 60: 789—794