(昭和12年11月30日受領)

滿洲國產タイリクカブトエビに関する研究¹⁾

I. 奉天神社外苑産タイリクカブトエビに就きて(1)

(8 挿圖, 5 表)

Studies on *Apus sinensis* UÉNO of Manchoukuo

I. *Apus sinensis* UÉNO from a Pond in the Hôten Shrine, Mukden(1)

(8 Figures and 5 Tables)

木 場 一 夫

滿洲國 奉天滿鐵教育研究所

Kazuo KOBA

Educational Institute, South Manchuria Ry. Co., Mukden

Résumé

The present paper deals with *Apus sinensis* UÉNO (= *A. numidicus* var. *sinensis* UÉNO) inhabiting a temporary pond in the grounds of the Hôten Shrine in Mukden.

The water of the pond was fed by an artesian well in its neighbourhood and was introduced for the first time in the beginning of June, 1937. The greatest depth of the water was about 30 cm on July 1st and the water was yellowish brown in color due to the dissolution of loess-like clay which forms the pond-basin. The temperature of the pond water on the afternoon of July 2nd was as high as 33°C, which nearly corresponds to the air-temperature at that time; the pH-values of the water were 6.6-7.1. This habitat seems therefore to be suitable for the propagation of the species which can endure a considerably higher temperature. Since the supply of water by the pump was stopped on July 22nd, the pond dried up on 24th of the same month. All the inhabitants, including *Apus sinensis*, *Eocyclus mongolianus*, certain aquatic insects and tadpoles, exposed in consequence their dead bodies in air.

On July 1st, 2nd and 13th there were collected total 362 individuals of *Apus sinensis*, 200 of which were measured and closely examined.

1. There is a marked difference in the form of the carapace between both sexes. The carapace is more strongly curved downward on both sides in the female than in the male, and the ratio of its median length to the total length of the body is also greater in the female than in the male.

2. The female is much more dark green in color than the male.

3. The number of somites uncovered by the carapace varies greatly, but it is usually greater in the male than in the female.

4. The number of the post-pedigerous somites is comparatively constant, 8-11 (average 9.4) in the male and 5-7 (average 6.6) in the female.

5. In the male the spinules on the ventral posterior margin of the telson and on the

1) 滿洲産動物に関する報文, no. 2; 滿洲産甲殻類に関する報文, no. 1.

ventral surface of the caudal rami are scale-like in shape.

6. The caudal rami are mostly shorter in the male and longer in the female than the total length of the body.

7. The egg is spherical in shape, reddish brown in color, and is 0.4–0.5 mm in diameter. The number of eggs carried in the egg-sac is from 73 to 186 in four females examined.

8. Two hundred and sixteen males were found among 362 individuals caught in the pond mentioned; the ratio of the male to the female is therefore 1.5 : 1.

* * *

1. 緒 言

滿洲國産タイリクカブトエビ *Apus sinensis* UENO に就きては既に上野益三博士に依りて報告されたり(1925, '27, '35)。同博士の教示によれば、本種は南滿洲及び支那に分布す。

筆者は本年(1937)、奉天神社外苑の池に發生したるタイリクカブトエビに就きて若干の觀察を爲したるに依り茲に報告せんとす。本第1報は7月1日より24日に至る觀察を含み、8月1日以後の調査は第2報に譲る。

本報を草するに際し、本文閱讀の勞を執られ又種名其他に就きて懇篤なる教示を與へられたる京都帝國大學理學部講師上野益三博士に衷心より拜謝す。尙ほ池の調査を許可されたる奉天神社山内祀夫氏並に調査採集及び個體測定に援助されたる桑野喜八郎・北野永兩氏に感謝の意を表す。

II. 奉天神社外苑池の概觀

タイリクカブトエビの棲息せる奉天神社は奉天附屬地の東北部に位し、神社の西部に接する外苑に池ありて、水は池の北部約25mを距つる掘抜井戸に依りて給せらる。奉天神社の山内祀夫氏の談に依れば、本年は6月初め貯水し初めたるものにして、それ以前には池に貯水なく、底部は乾燥し子供の遊び場なりしと云ふ。筆者が初めてタイリクカブトエビを發見したる7月1日に於ける池水の深度は最深部にて約30cmを示し、一般に淺く、水は黄土質粘土²⁾の溶解に依りて黄褐色を呈し底部を覗く能はず。山内氏に依れば、水は黄土を浸透し去り、貯水容易ならずと云ふ。池中及び池の周邊部にはミヅビエ *Echinochloa crus-galli* BEAUV. subsp. *genuina* HONDA 良く繁茂せり。

第1圖 奉天神社外苑を西南より望む
(VIII 6 '37) [木場撮影]

タイリクカブトエビの夥しく棲息するは池の東部にして、掘抜井戸より水の注入する附近(池の西部)にては7月1日に1成體を認めたるのみなり。棲息場所の水溫は注入する地下水に比して著しく高溫にして、7月上・中旬

2) 遠藤隆次博士の教示に依る、茲に謝意を表す。

に於ける午後の水温に等しく、水は略々中性を示せり
(第1表)。

第1表

月 日	時 刻 h. m.	氣 温 C°	水 温 C°	pH
1. VII	15.00	30.5	27.8	7.1
2. VII	15.10	28.8	30.8	—
13. VII	14.00	30.0	33.0(10.0)	6.6(6.0)

括弧内は掘抜井戸より出づる水の温度、pHを示す。

7月24日には22日よりの断水に依りて貯水は殆ど涸渴し、池の一部分に極く少量の水溜を残せるのみにして、タイリクカブトエビの死骸の散在せるを見たり。

III. タイリクカブトエビの記載

Apus sinensis UÉNO タイリクカブトエビ

Apus numidicus var. *sinensis*, UÉNO, 1925, 動雜, 37 (443), p. 431; UÉNO, 1927, Mem. Coll. Sci., Kyoto Imp. Univ., (B), 2 (5), p. 265, pl. 29, fig. 33.

Apus numidicus (in part.), UÉNO, 1935, Phyllopods of Jehol, p. 4.

タイリクカブトエビの形態に就きては上野博士の報文(1925, '27, '35)に詳細に記載すれば、本篇にては主として各部の變異に就きて述べん。以下の記載及び測定は生の材料に就きてなせるものにして、體各部の測定は200個體に就きて行ひ、雌雄の比のみは全採集個體に就きて算出せり。

背殻 Carapace は略々圓形にして中央背稜部に於ける長さは略々最大幅に等しく、平滑にして背稜を中心として左右に體を包むが如く擴がり、色は緑褐色を呈す。雌の背殻は背稜より殻の外縁に至る部分が腹部に著しく彎曲し、色は雄よりも濃く暗綠色を呈し、背殻腹面の頭端近き部分即ち Sub-frontal plate は黄綠色を帶ぶ。雌にては其他の部分に於ても一般に色濃く、肢の先端に近き部分は黄綠色を呈するにより、生時には其色彩と背殻の彎曲程度に依りて雌雄を區別すること容易なり。

背殻に被はれざる體節數は變異に富めり。雄にては最少21節より最多28節に及び、平均24.8節、mode は25節にして、24—26節のもの雄總數の65%を占め、雌に於ては最少—最多15—25、平均22.5節、mode は23節にして、22—24節のもの雌總數の73%にあたり、概して雌の露出體節數は雄に於けるよりも尠し(第2表)。

かくの如く露出體節數の變化多き故、體長と背殻の中央背稜部の長さとの割合が著しく異れり。雄にては、no. 106 に於て、殻長對體長の比 1:1.5 にして背殻の長さが背殻に被はれざる體長より稍々長く、nos. 10, 22, 30, 31, 39 等に於ては背殻の長さが背殻に被はれざる部分と等しく、nos. 33, 44, 69, 74 にては背殻の長さは背殻に被はれざる體長より短く、殻長對體長の比 1:2.3 なり。

第2圖 奉天神社外苑の池のタイリクカブトエビ棲息所：前方の人物は桑野氏、後方は筆者(VII 2, '37) [北野撮影]

第 2 表

雄			雌		
背殻に被はれざる體節數	個 體 數	雄總數に對する割合	背殻に被はれざる體節數	個 體 數	雌總數に對する割合
21	2	2.0%	15	1	1.0%
22	10	11.0"	16	—	—
23	14	14.1"	17	1	1.0"
24	19	19.2"	18	1	1.0"
25	25	25.2"	19	2	2.0"
26	20	20.0"	20	10	10.2"
27	8	8.1"	21	7	7.2"
28	2	2.0"	22	21	21.4"
	合計 99		23	30	30.6"
			24	21	21.4"
			25	4	4.1"
			合計 98		

雌にては nos. 145, 163 等に於て殻長對體長の比 1:1.4 にして背殻の長さが背殻に被はれざる體長より稍々長く, nos. 43, 119, 124 等に於ては背殻の長さが背殻に被はれざる部分と等しく, no. 41 にては背殻の長さは背殻に被はれざる體長より短く, 殻長對體長の比 1:2.1 なり。

次に背殻長對體長の比と個體數との關係に就て見るに, 雄に於ては比 1:1.9—2.2 個體は雄總數の 85% を占め, 雌にては比 1:1.7—1.9 の個體は雌總數の 79% にあたり, 比 1:1.4—1.9 のものは雌總數の 93% を占め, 雌の背殻長は雄に比して稍々長し(第3圖, 第3表)。

第3圖 横軸は體長の背殻長に對する比, 縦軸はその個體數; M=雄, F=雌

第 3 表

	雄	雌
背殻の長さが背殻に被はれざる體長より長きもの	{ 殻長:體長 } 32個體 { 1:1.5—1.9 }	{ 殻長:體長 } 92個體 { 1:1.4—1.9 }
背殻の長さが背殻に被はれざる體長に等しきもの	{ 殻長:體長 } 30 " " { 1:2 }	{ 殻長:體長 } 6 " " { 1:2 }
背殻の長さが背殻に被はれざる體長より短きもの	{ 殻長:體長 } 37 " " { 1:2.1—2.3 }	{ 殻長:體長 } 1 " " { 1:2.1 }

第4圖 體長と背殻長との成長關係を示す；横軸は體長，縦軸は背殻長，圓は雄，三角は雌

背殻長の増加は體長 20mm より 42mm に至る雌雄にては，略々體長の増加に比例す。計測せる 200 個體にては雄の體長は最小—最大 27—42mm にして，平均 34.9mm なり。雌は最小—最大 20—38.2mm を示し，平均 30.4mm にして，雌は一般に體長小なり(第4圖)。

肢を有せざる體節數は割合に一定せり。即ち雄に於ては最少—最多 8—11 節を數へ，平均 9.4節，mode は 9 節にして，9—10 節の個體は雄總數の 96% を占む。雌に於ては雄に於けるよりも少く 5—7 節にして，平均 6.6 節，mode は 7 節にして，6—7 節の個體は雌總數の 98% を占む(第4表)。

第 4 表

雄			雌		
肢を有せざる體節數	個體數	雄總數に對する割合	肢を有せざる體節數	個體數	雌總數に對する割合
8	3	3 %	5	2	2 %
9	57	57.5 %	6	36	37.5 %
10	38	38.4 %	7	60	61 %
11	1	1 %		合計 98	
	合計 99				

奉天神社外苑産のものは，肢を有せざる體節數より觀れば上野博士が嘗て *Apus numidicus* GRUBE var. *sinensis* とされたる型に屬す。

第1胸肢の第5内枝 Fifth endite は鞭狀にして長く，一般に背殻中央背稜部の長さに等し

きか又は稍々長く、自然の位置に於ては後方に伸長すれども尾節に達せず〔カブトエビ *Apus aequalis* PACKARD に於ては鞭狀枝は尾節に達す（上野, 1925, p. 426）〕。この鞭狀枝の長さの

第5圖 横軸は體長の第1胸肢第5内枝に對する比、縦軸は其個體數；M=雄，F=雌

體長に對する割合は雌雄に於て略々等しく、性に依る顯著なる差異なきが如し（第5圖）。

雌の第11胸肢の第6内枝 Sixth endite は稍々橢圓形にして半球狀を呈し、其周邊部は稍々肥厚して綠色を帶ぶ。フラベラム Flabellum は内枝の蓋に變じ内側に少しく凹みて淺き皿狀をなし、卵囊 Egg-sac（育囊 Brood-pouch）を形成す。奉天神社外苑産の雌 101 個體中にて卵囊中に卵を有するものは77個

體にして、其等の體長は最小より最大に及ぶ（體長20—38.2mm）。卵囊中に在る卵は堅く附着し、又卵囊外にも多數附着せり。第5表の no. 149 は其1例なり。卵は球狀にして赤褐色を呈し、直徑0.4—0.5mmを算し、多數のものは0.44mmなり。卵數を4個體に就きて計算するに74—210個にして、是等の腹部を解剖せしに4個體共に多數の卵を有せり（第5表）。

第 5 表

個體番號	體長 (mm)	卵囊(mm) 長徑×短徑×深さ	卵			合 計
			右 卵 囊	左 卵 囊	卵 囊 外*	
no. 144	31.5	5.5×4.5×2	99	87	—	186
no. 145	26.5	5×4×1.5	58	91	—	149
no. 146	34.5	5.5×4.5×1.5	—	73	—	73
no. 149	29.0	4.5×3.5×1.5	35	43	132	210

* 肢に附着せるもの。

尾節 Telson は短く圓筒狀にして1對の長き尾鞭を具へ、中央部に於ける長さはその最大幅の半分より稍々短かし。背面は平滑にして中央部及び兩側部に群をなせる棘ありて其數及び形狀に變異を示せり。

背面正中線には3—4個の前後に並べる後向きの棘あり、これを中心として尾節後縁に左右1對又は1個の棘を有し、又數個の微棘は正中線中央部附近及び後縁に存す。腹面後縁の棘は鱗片狀を呈すれども、雌に於ては小形の棘なり。

尾鞭(尾) Caudal styles, Furcal rami は細長にして略々體長に等しきも、これを詳細に觀察すれば雌雄に依りて多少の差異を示せり。即ち雄に於ては尾鞭の長さは體長より短きもの多數にして、雌にては尾鞭の長さは體長より長きもの多數を占む（第6圖）。

次に大小の個體に就て體長對尾長の關係を見るに、大形の雌(no. 6)に於ては體長對尾長は37.5:49.5にして尾鞭の長さは體長の約1.3倍にあたり、最小の雌(no. 14)にては20:24に

して、尾長は體長の1.2倍にあたる。最大の雄(no. 74)にては41.5:37.5にして、尾長は體長の約0.9倍にあたり、最小雄(no. 79)にては27:25にして約0.9倍にあたり、前述の如く雌雄に於ける體長對尾長の差異は體長の長短に拘らず明かなり。

上野博士は北平産の雄にては尾長は背殻の長さに等しく、南滿産の var. *sinensis* とされたるものの雌雄に於ては殆ど體長に等しと述べられたり(1927, p. 265)。

尾鞭の棘を観察するに、雄に於ては尾鞭基部より尾長の約三分の一までの腹面に生ぜる棘は鱗片状を呈し、終末部にては腹面内側に存し小數となれり。雌にては棘は鱗片状を呈せず。

雄の尾鞭の色は基部黄褐色にして先端に至るに従ひて淡黄色となる。棘は赤褐色を呈し基部のものは濃色なり。雌にては雄よりも一般に色濃し。

第6圖 横軸は尾の體長に對する比、縦軸はその個體數、M=雄；F=雌

IV. 雌雄の比

カブトエビ科 Apodidae にては、雄の數は甚だ少く、嘗て C. VON SIEBOLD³⁾ は *Apus* の 13,000 個體中にて雄は 319 個體のみなりしと述べたり。即ち雌雄の比は 40:1 なり。又 VON SIEBOLD⁴⁾ は Bavaria の 1 産地にて 5 年間繼續して數千の個體を調査せるも雄を 1 個體も發見せざりき。或る機會に Breslau 附近産 1026 個體を検し 114 個體の雄を發見せり。即ち雄は全個體の 11% にあたる。然れども翌年には 1% 以下の雄を發見せりと云ふ。

LUBBOCK⁵⁾ は 1863 年に Rouen 附近にて採集せる 72 個體中にて 33 個體の雄を發見せり。雌雄の割合は 39:33 にして雌は雄の約 1.2 倍にあたり雌は雄より稍々多し。

上野博士に依れば和歌山縣西牟婁郡富田村産(1924年7月1日採集)のカブトエビ 45 個體の標本は總て雌なりと云ふ(1925, p. 433)。

J. JÉZÉQUEL⁶⁾ (1921) はヘラカブトエビ屬の 1 種 *Lepidurus productus* に於て雄 323 個體、雌 63 個體を報告せり。雌雄の比は 50:1 となり雄甚だ多數を占む。

奉天神社外苑産の 362 個體(7月1, 2日採集の 333 個體と7月13日採集の 29 個體) に就きて雌雄の割合を見るに、雄 216 個體、雌 146 個體にして雌雄の比は 1:1.5 となり、LUBBOCK の報告せる場合よりも雄の個體數多きは注意す可き事實なり。

3) 川村(1918) p. 218 に依る。

4) 5) SMITH, G. (1923) Crustacea, Cambridge Natural History, vol. 4, p. 32 に依る。

6) 上野(1925) op. cit., p. 433 に依る。

V. 生 態

P. A. BUXTON⁷⁾ に依れば *Apus* 其他の葉脚類に於て、卵の儘數年の乾燥に耐へて生存するものあり。乾燥の再發期は彼等の生存に必要な故、彼等が世界各地の砂漠又は半砂漠に發生するは異常に非ずと云ひ、或る葉脚類にては發育休止の卵を有する泥が水に浸り、淺き水溜が砂漠の太陽に熱せられて極めて速かに成長すと述ぶ。

SPENCER⁸⁾ は中部オーストラリアに於て、*Apus* が降雨後2週間にして64mmに成長したるを記録せり。

上野博士⁹⁾ に依れば熱河省赤峰附近翁牛特産タイリクカブトエビは天然曹達を多量に含める強アルカリ性の潑留水にモウコカヒエビ *Eocyzicus mongolianus* UENO と共に棲息すと云ふ。

奉天神社外苑の池は前述の如く深度淺き故、水は熱せられ易くタイリクカブトエビの

速かなる成長に好き状態を示せしものと思はる（水温に就きては第1表参照）。多數の本種を發見するは池の東部にしてミツビエの生育せる場所なり。池水濁れる故、その運動状態を觀察すること不可能なれど、これを實驗室内にて池の泥土を入れたる水槽中に飼養觀察するに、胸肢及び腹肢を前後に動かして速かに泥土上を匍匐し、泥土上にその通過せる跡を印す。又餌を求めて水中を自由に遊泳し、稍々勢弱りたる個體は水面に浮びて腹部を上部に向け、肢を動かせども前進すること少し。

池水は7月22日の斷水（ポンプの故障）により24日には殆ど涸渴し、タイリクカブトエビは蛙の蝌蚪・タイコウチ・ヤゴ及び多數のモウコカヒエビ等と共に死するに至れり。少量の泥水中には尙ほ少數のモウコカヒエビが生存せり。實驗室内にてタイリクカブトエビは5日以上飼育に未だ成功せし事なきも、7月24日採集のモウコカヒエビは今日（8月10日）に至る18日間生存せり。これ等の事實より推察するに、タイリクカブトエビはモウコカヒエビに比して環境の變化に對する抵抗力弱きが如く、

第7圖 水の涸渴せる春日公園の池、第2圖と同じき場所、植物はミツビエ (VII 24 '37) [木場撮影]

第8圖 死せるタイリクカブトエビ(中央)とモウコカヒエビ及びヤゴ (VII 24 '37) [木場撮影]

7) 8) BUXTON, P. A. (1923) *Animal life in desert*, pp. 94—95.

9) 上野益三 (1935) *陸水生物學概論*, p. 154.

温水狭適温性 “Warmstenotherm” の動物の1種なるが如く推察せらる。

奉天神社外苑の池は K. GAJL¹⁰⁾の云ふ不恆存性 astatic の陸水と考へられ、上野博士¹¹⁾はこの不恆存水域の生態的特徴として“水棲動物の生活にとって最大の悪条件を具へた水溜であるから何れもそれに備へる用意がある。動物は水底の泥土上を匍匐生活するものが最も多く、大形のものでは豊年蟲 *Branchinella*, カブトエビ *Apus* の如き葉脚類がその代表的のものである。”と述べられたるに該當するが如し。

カブトエビの棲息する水域の水質に就き、上野博士は熱河赤峰の瀕留水はアルカリ性なりと述べられたり。今回調査せる奉天神社外苑の池は黄土質粘土を溶解せる略々中性の水質を示す事實より推して、本種は南滿に於けるアルカリ性及び中性の週期的瀕留水中に棲息し、其の分布地域は今日まで報告されたるよりも廣きに及ぶものと思考さる。

VI. 摘 要

- 1) タイリクカブトエビの棲息する奉天奉天神社外苑の池の状態を記載せり。
- 2) タイリクカブトエビの雌雄に依る背殻の形状及び色彩の差違を述べたり。
- 3) 背殻に被はれざる體節數は變化に富むも、雄の露出體節數は雌のそれよりも少し。
- 4) 背殻長と體長との割合を雌雄に就きて見るに雌の方稍々大なり。
- 5) 肢を有せざる體節數は割合に一定し、雄にては平均 9.4 節にして、雌にては 6.6 節なり。
- 6) 第1胸肢の第5内枝の長さに就きては雌雄に依る差違を認めず。
- 7) 雌の第11胸肢の卵囊及び卵に就きて記載せり。
- 8) 尾節の棘は雌雄に依りて異り、雄の腹面後縁の棘は鱗片状を呈す。
- 9) 尾鞭の長さは、雄にては體長より短きもの多く、雌にては體長より長きもの多し。
- 10) 尾鞭腹面の棘は雌雄に依りて相異り、雄にては鱗片状を呈す。
- 11) 奉天神社外苑産 362 個體に於ける雌雄の比は 1:1.5 はして雄の個體多し。
- 12) 奉天神社外苑の池水は夏季高温にして、水は略々中性を示し、タイリクカブトエビの棲息繁殖に適せり。

〔附記〕 個體計測表は多くの頁を占むるにより本報にては割愛することとせり。

参 考 文 献

川村多實二(1918) 日本淡水生物學, 上卷. 東京. 木場一夫(1937a) 奉天のタイリクカブトエビとホウネンエビに就いて. 滿洲生物學會報, 1, 13. 木場一夫(1937b) 滿洲國奉天, 奉天神社外苑の池に發生せるタイリクカブトエビに就て(豫報). 科學, 7(11), 446—447. 上野益三(1925) 東亞の *Apus* 屬に就いて(豫報). 動雜, 37(443), 423—435. 上野益三(1926—27) 鰓脚類雜記(1, 2). 動雜, 38(458), 439—442; 39(467), 372—375. UENO, M.(1927) The freshwater Branchiopoda of Japan, I. Mem. Coll. Sci. Kyoto Imp. Univ., (B), 2 (5), 259—311, 11 tab. 上野益三(1935) 熱河省産甲殼類, 葉脚目. 第一次滿蒙學術調査研究團報告, 第5部, 第1區, 第2編, 第6輯, 1—16 5 tab. 上野益三(1937) 日本動物分類, 鰓脚目. 東京.

10) 上野(1935) op. cit., pp. 13, 151に依る.

11) 上野(1935) op. cit., p. 151.