

石狩・空知・後志支庁の気象

平成20年 夏のまとめ（2008年6月～8月）

札幌管区気象台
平成20年9月26日

気象概況

7月中旬や8月下旬は曇りや雨となる日が多かったが、6月下旬や7月下旬～8月上旬は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。7月上旬は顕著な高温となったが、8月下旬には寒気が入り平年よりかなり低い地点も多かった。

《3か月の平均気温》

6月から7月上旬にかけて気温が高めに経過したが、7月中旬以降は低めに経過した。3か月の平均気温は、北空知や石狩南部、南空知や後志西部などの一部で平年を下回った他は、平年を上回った地点が多かった。

《3か月の降水量合計》

概ね平年並か平年より少なく経過した地点が多く、3か月の降水量の合計は、ほぼ全ての地点で平年を下回った。

《3か月の日照時間合計》

7月中旬や8月下旬は少なかったが、6月下旬や8月上旬は高気圧に覆われ晴れた日が多かったため、3か月の日照時間の合計は、ほとんどの地点で平年を上回った。

各月の気象概況

（6月）

この期間の天気は、上旬と中旬は周期的に変化したが下旬はオホーツク海の高気圧に覆われ晴れた日が多かった。月平均気温は、平年並の地点が多かった。月降水量は、石狩南部で平年より多かった他は、概ね平年並か平年より少なかった。月間日照時間は、ほとんどの地点で平年より多く、石狩北部や中空知ではかなり多かった。

（7月）

期間のはじめと終わりには高気圧に覆われ晴れた日もあったが、気圧の谷の影響で曇りや雨となる日が多かった。また、上旬は南風の日が続いて気温が高く経過した。

月平均気温は、石狩南部や北空知・南空知で平年並の地点が多かった他は、概ね平年より高かった。月降水量は、石狩北部や北空知・中空知で平年より多い地点があった他は、平年並か平年より少なかった。月間日照時間は、後志や南空知で平年より少ない地点が多かった他は概ね平年並だった。

（8月）

この期間は、上旬は高気圧に覆われ晴れた日が多かったが、その後は気圧の谷や低気圧の影響で曇りや雨となる日が多く、29日には前線が停滞した影響で石狩や空知で大雨となった所もあった。また、期間の後半は寒気の影響により気温が低く経過した。

月平均気温は、石狩中部や中・南空知の一部で平年並の他は平年より低かった。月降水量は、石狩北部や北・南空知では平年並の地点が多かったが、その他は概ね平年より少なかった。月間日照時間は、平年並か平年より多かった。

6～8月の気象官署・特別地域気象観測所の統計値

	気 温 (℃)				降 水 量 (mm)			
	3 か月 平均	平年値	平年差	階 級	3 か月 合計	平年値	平年比	階 級
札 幌	19.9	19.6	+0.3	高い	159.5	255.9	62%	少ない
寿 都	18.3	18.2	+0.1	平年並	156.5	268.7	58%	かなり少ない
岩見沢	18.9	18.9	0.0	平年並	209.0	295.5	71%	少ない
倶知安	18.5	18.3	+0.2	高い	192.5	281.9	68%	少ない
小 樽	19.0	19.0	0.0	平年並	127.0	235.1	54%	かなり少ない

	日照時間 (時間)			
	3 か月 合計	平年値	平年比	階 級
札 幌	528.6	536.4	99%	平年並
寿 都	517.8	516.8	100%	平年並
岩見沢	518.4	520.7	100%	平年並
倶知安	501.0	477.6	105%	平年並
小 樽	520.4	532.1	98%	平年並

- (注1) 統計値の階級は「高い(多い)」、「平年並」、「低い(少ない)」の3段階で表示します。各階級の幅は、平年値の作成期間(1971年～2000年の30年間)における各階級の出現率が1:1:1となるように決めてあります。なお、高い(多い)方から上位10%に該当する場合は「かなり高い(多い)」、低い(少ない)方から下位10%に該当する場合は「かなり低い(少ない)」で表しています。
- (注2) 「」付きの数値は欠測を含むことを表します。

6～8月の気象官署・特別地域気象観測所の極値更新と気象災害

《極値更新表》

なし

《気象災害発生状況》

期 日 期 間 (日)	発生 支庁名	気象災害名 (気象現象名)	総観気象的 状 況	気象観測値及び被害状況
6/11	空知	雷 ひょう (あられ) 落雷害 ひょう (あられ) 害	雷雨 (熱雷を除く) 気圧の谷	最大風向・風速: NW 7.8m/s 岩見沢、WNW 8m/s 美唄(空知) 最大瞬間風向・風速: NW 13.1m/s 岩見沢 最大1時間降水量: 6.5mm 岩見沢 最大10分間降水量: 3.5mm 岩見沢 日最高気温・平年差: 21.9℃(+1.2℃) 岩見沢、23.0℃(+1.6℃) 芦別(空知) 日最低気温・平年差: 9.3℃(-1.6℃) 岩見沢 [停電 1949件、降ひょうにより農作物に軽微な被害]

注: 気象災害一覧表は、気象災害報告から9月24日現在で集計。観測所名の後ろに()付き支庁名が付加されている場合、アメダスの観測値から求めたことを示す(その他は気象官署・特別地域気象観測所)。
また、数値に()が付く場合は、統計した期間に欠測が含まれていることを示す。

夏日等の日数（ ）の中は平年値

官署名	夏日日数			真夏日日数			降水日数		
	6月	7月	8月	6月	7月	8月	6月	7月	8月
札幌	4(5.3)	22(15.4)	15(19.1)	0(0.1)	2(3.0)	2(4.5)	8(6.7)	5(7.5)	7(8.8)
寿都	1(0.7)	4(6.3)	12(12.0)	0(0.0)	0(0.5)	0(0.9)	6(7.8)	7(7.2)	10(9.3)
岩見沢	5(5.3)	20(15.4)	18(19.4)	0(0.2)	1(2.6)	1(4.1)	8(8.3)	8(8.6)	7(9.4)
倶知安	4(3.3)	16(12.3)	14(16.4)	0(0.1)	1(1.3)	0(2.5)	7(7.6)	9(7.8)	8(9.4)
小樽	2(2.5)	12(10.5)	14(16.2)	0(0.1)	2(2.0)	0(3.3)	7(7.3)	5(7.9)	7(9.1)

官署名	不照日数			霧日数		
	6月	7月	8月	6月	7月	8月
札幌	2(3.3)	2(3.7)	4(3.3)	0(0.6)	0(0.5)	0(0.5)
寿都	1(4.3)	7(3.7)	6(4.4)	3(2.0)	1(1.6)	0(0.3)
岩見沢	3(3.9)	4(4.4)	8(4.3)	2(―)	2(―)	3(―)
倶知安	2(4.2)	4(4.3)	5(4.3)	5(―)	5(―)	7(―)
小樽	2(3.5)	3(3.6)	4(3.5)	1(―)	0(―)	0(―)




(注1) 小樽は平成11年3月1日から、岩見沢と倶知安は平成18年10月1日から特別地域気象観測所へ移行し、「霧」の観測は機器による自動観測によって行われております。また、上記統計項目の「霧日数」は統計切断（平年値なし）となっています。

(注2) 「」や「」付きの数値は欠測を含むことを表しています。




(注3) 降水日数は、日降水量1.0mm以上の日数を表しています。

2008 年 6 月～8 月 気象経過図（気象官署・特別地域気象観測所）




札幌






岩見沢





倶知安



寿都




小樽




（※岩見沢・倶知安・小樽は
特別地域気象観測所）

2008 年 6 月～ 8 月 アメダス気象経過図（石狩支庁の主な地点）


浜益




新篠津




山口




石狩



江別






恵庭島松






2008 年 6 月～ 8 月 アメダス気象経過図（空知支庁の主な地点）




石狩沼田






深川






滝川





芦別



月形




長沼




2008 年 6 月～ 8 月 アメダス気象経過図（後志支庁の主な地点）


余市




岩内




真狩




喜茂別



蘭越




黒松内




アメダス気象分布図(6～8月)

・ 3 か月平均気温平年差 (°C)



アメダス気象分布図(6～8月)


・ 3 か月合計降水量平年比 (%)



※ //は平年値なし、×は期間内に一定量を超える欠測を含むため値を求めていることを表します。なお、数値の前の点は観測所の位置を示します。

アメダス気象分布図(6~8月)

・ 3か月合計日照時間平年比 (%)



※ //は平年値なし、×は期間内に一定量を超える欠測を含むため値を求めていることを表します。なお、数値の前の点は観測所の位置を示します。