

病院薬局における特殊製剤の調査・研究

第5小委員会 委員長 ○吉成昌郎

(委員) 伊藤 博, 大竹康友, 笠原伸元, 島田慈彦,
村田正弘, 山瀬康正, 山村喜一

I. アンケート回収実態

「病院薬局製剤—特殊処方とその調製法」第2版の編集にご協力いただいた137施設に、今回新たに6施設を加え、合計143施設にアンケートを発送し、139施設から回答を得た。回答率は98.2%であった。さらに、指名病院以外でも有用な製剤で貢献されている施設があるのではないかとこの当委員会の見解から、JJSHP, Vol.25, No.10 (1989)で募集したところ、4施設から応募があった。以下に回答施設名、応募施設名*を記す。

○大学病院(64)

北海道大, 札幌医科大, 旭川医科大, 東北大, 山形大, 東京慈恵会医科大, 慶応義塾大, 東京医科大, 東京女子医科大, 順天堂大, 東京大, 東京大分院*, 昭和大, 東邦大, 日本大学板橋, 帝京大, 自治医科大, 筑波大, 群馬大, 埼玉医科大, 防衛医科大, 千葉大, 横浜市立大, 北里大, 聖マリアンナ医科大, 聖マリアンナ医科大横浜西部, 東海大, 昭和大学藤が丘, 新潟大, 信州大, 富山医科薬科大, 金沢大, 金沢医科大, 岐阜大, 名古屋大, 名古屋市立大, 三重大, 大阪大, 大阪市立大, 大阪医科大, 関西医科大, 京都大, 京都府立医科大, 滋賀医科大, 神戸大, 奈良県立医科大, 和歌山県立医科大, 鳥取大, 島根医科大, 岡山大, 川崎医科大, 広島大, 山口大, 徳島大, 香川医科大, 高知医科大, 愛媛大, 九州大, 久留米大, 長崎大, 熊本大, 九州大生体防御医学研, 宮崎医科大, 鹿児島大

○国公立, その他の病院(79)

市立札幌, 国立札幌, 市立室蘭総合, 市立旭川, 釧路赤十字, 市立釧路総合, 青森県立中央, 八戸市立市民, 岩手県立中央, 大館市立総合, 平鹿総合, 東京通信, 自衛隊中央, 共済組合虎の

門, 国立病院医療センター, 東京都立墨東, 関東通信, 国立東京第二, 日赤医療センター, 癌研附属, 共済組合立川, 上都賀総合, 佐野厚生総合, 君津中央, 国立千葉, 国立国府台, 国立横浜, 国立相模原, 横須賀共済, 市立川崎, 山梨県立中央, 佐渡総合, 新潟市民, 佐久総合*, 富山市民, 富山赤十字, 高岡市民, 石川県立中央, 福井県立, 聖隷浜松, 聖隷三方原, 豊橋市民, 蒲郡市民*, 国立名古屋, 県立岐阜, 市立四日市, 国立大阪, 東大阪市立中央, 新千里, 市立堺, 京都第二赤十字, 共済組合近畿中央, 神戸市立中央市民, 鳥取県立中央, 鳥取赤十字, 島根県立中央, 岡山赤十字, 国立呉, 県立広島, マツダ(株)マツダ, 国立岩国, 山口県立中央, 山口労災, 高松市民, 高松赤十字*, 愛媛県立中央, 松山赤十字, 国立病院四国がんセンター, 高知県立中央, 新日鉄八幡, 九州厚生年金, 九州労災, 飯塚, 佐賀県立好生館, 国立長崎中央, 国立別府, 大分赤十字, 県立宮崎, 鹿児島市立

II. 調査内容

1. 調査依頼文の要旨

当委員会では先生方のご協力により1986年に出版した「病院薬局製剤—特殊処方とその調製法」第2版の改訂作業を始めることになり、今後のすすめ方として、当委員会メンバーがそれぞれ担当する病院に、前回と同じ要領でアンケートをお願いすることになった。すなわち、別添資料は貴施設より寄せられた資料から当時の当委員会が採用させていただき掲載したものであるが、この内容の取捨選択と追加品目などの追加事項について、別添資料に朱筆を入れるだけの訂正と、新たに追記するものについては、同封の原稿用紙に記入していただきたい。

そして、この結果を日本薬学会第110年会の病院薬局協議会に発表すると共に、第3版として日本病院薬剤師会より出版する予定であるので、よろしくご協力をお願いします。

なお、その製剤が編集目的に沿うものかどうかの判定はなかなか難しい問題であることを経験したが、一応、今回も院内約束処方粉末製剤と判断したものと、I.V.Hのbase solutionを除外することにした。そしてご回答いただいた品目の中で、その採否につき担当委員と再度協議していただくことがあると思うが、その節はよろしくをお願いします。

また、前回同様、例えば神経ブロック用注射剤や人工肛門周囲びらん用軟膏のように処方類似した製剤が複数ある場合はその一つを代表として詳述し、その他のものは欄末に処方と施設名の紹介にとどめる場合があるが、この選択に当り当委員会の判断に対しご寛容願いたい。

さらに、参考文献の確認は本作業の性質上重要事項になるので、この充足については格別のご協力をお願いします。

2. 調査項目

1) 製剤名：貴院でつけられている名称。もし一般的に通用する名称があれば、それも併記して下さい。

2) 処方

3) 製剤企画の動機：〔例〕医師からの要望、薬局からの提言一文献検索から、薬局の研究から、本書から。

4) 処方薬剤規格：〔例〕局方品、試薬特級、メルク製品に限るなど。

5) 処方薬剤入手方法：市販品として入手できず、特別のルートがある場合ご記入下さい。

6) 調製法及び製剤を収納する容器：〔例〕カプセル（エランコ○号）、カプセル100個を密封ガラス瓶に収納し、1瓶単位で交付、幼児用なので特に小型カプセル（エランコ○号）。なお、一般的な方法と判断された場合は記入していただくなくても結構です。

7) 貯法

8) 有効期限または使用期限：用時調製か、予

製をしておくものか、有効期限を設定しているのか、その根拠をご記入下さい。〔例〕予製一製剤後1年（データあり、データはないが経験的に1年としている）。用時調製一変質が速いと判断される。安定性のデータがない。

9) 供用先：〔例〕外来診察室、病棟ナースステーション、手術室、臨床検査室、調剤室あるいは患者に直接交付。

10) 適応

11) 用法・用量

12) 製剤情報提供の可否：本書出版日（平成2年8月頃）より3年間（第4版改訂まで）、本製剤に関する他施設からの問い合わせに対し回答できるか。できる。できない。

13) 医師の評価：〔例〕治療上不可欠。有用性があるので可能な限り欲しい。製剤環境によっては辞退してもよい。

14) 備考：その他の補足的な事項をご記入下さい。

15) 文献：著者名、標題もご記入下さい。

16) 3), 8), 12), 13) の調査項目は今回新たにご回答願うものです。第2版より継続で掲載される製剤にもご記入下さい。

3. 調査結果

イ. 回答された全製剤数（応募を含む）1,327

ロ. イのうち、当委員会が“第3版”に代表として紹介すべきと判定した製剤数856、その内訳を表1、表2に示す。

ハ. ロのうち“第3版”に新規収載された製剤（以下新規収載製剤と略）数238、その内訳を表3、表4に示す。

ニ. 第2版には代表製剤処方として紹介されているが、“第3版”では削除された製剤数147、その内訳を表5に示す。

ホ. 新規収載製剤を一覧表にして表6に示す。（P.S-44～S-53）

4. 総括

1) 新規収載製剤を内用、注射、外用剤および検査・診断用剤に分類した場合、内用剤16剤（6.7

%), 注射剤 34 剤 (14.3%), 外用剤 168 剤 (70.6%), 検査・診断用剤 20 剤 (8.4%)

2) 1)を剤形・用途別に分類した場合, 外皮用軟膏剤 50 剤 (21.1%), 注射剤 33 剤 (13.9%), 吸入剤 18 剤 (7.6%), 消毒剤・保存剤 17 剤 (7.1%), 皮膚塗布剤 16 剤 (6.7%), 点眼液 15 剤 (6.3%), 坐剤 13 剤 (5.5%), 検査・診断用剤 11 剤 (4.8%), 内用液剤 8 剤 (3.4%), 含嗽剤 7 剤 (3.0%), 歯科口腔用塗布剤 7 剤 (3.0%)

以上, 上位 10 位まで (全体の 82.4% を占める).

3) 新収載製剤が多く利用されている 適応対象.

a. 皮膚外用剤の緑膿菌, 真菌を含む感染症 (褥瘡, 熱傷, 火傷, 潰瘍, 瘡瘍等) (抗菌剤配合処方) 26 剤

b. 歯科口腔用剤の口内炎・舌炎等の口腔内の炎症性疾患 14 剤

c. 眼科用剤の角膜炎・角膜潰瘍等の角膜の炎症性疾患 11 剤

d. 耳鼻科用剤の細菌感染を伴う (又は感染防止を必要とする) 外耳・中耳又は上気道の炎症性・アレルギー性疾患 (抗生物質・副腎皮質ホルモン配合処方) 11 剤

e. 手指, 皮膚, 粘膜の消毒剤 8 剤

f. 抗悪性腫瘍用 (疼痛緩和を含む) の坐剤 5 剤

g. 乳癌用の塩酸ドキシソルビシン配合軟膏 3 剤

h. 人工肛門周囲のびらん用の軟膏 3 剤

i. 色素散布法による胃内視鏡検査用試薬 3 剤

j. 乾癬用のアントラリン配合軟膏 2 剤

k. 潰瘍性大腸炎用の注射剤 2 剤

l. 自己導尿カテーテルの消毒剤 2 剤

m. 悪性腫瘍診断用の注射剤 2 剤

n. 尿細管性アシドーシス負荷試験用の注射剤 2 剤

4) 今回新たに設けた調査項目の回答結果

イ. 製剤企画の動機を明示した製剤数は 517 で, このうち, 医師からの要望によるものが 471 で,

91.1%, 薬剤部からの提言によるものが 46 で 8.9% (医師と薬剤師との共同企画, 共同研究の結果としたものが 2 剤あり, いずれも両方に加算した).

ロ. 製剤情報提供の可否を表明した製剤数は 519 で, このうち, 本書出版日より 3 年間本製剤に関する他施設からの問い合わせに対し回答できるとしたものは 503 で 96.9%, できないとしたものは 16 で 3.1%.

ハ. 医師の評価が表明された製剤数は 462 で, このうち, 治療上不可欠としたものは 248 で 53.7%, 有用性があるので可能な限り欲しいとしたものは 198 で 42.9%, 両方を加算すると 446 で, 全体の 96.6% を占める. なお, 製剤環境によっては辞退してもよいとしたものは 15 で 3.2%, 有用性はないと思われるとしたものが 1 例 (0.2%) あった.

5) 削除製剤

第 2 版には代表製剤処方として紹介されているが, “第 3 版” では削除された製剤は 147 あり, その削除理由としては前回同様, ①現在製剤していない (削除された大半がこれに相当する). ②同一成分の製剤が市販された (ポリミキシン B カプセル, クエン酸マグネシウム液, 硝酸イソソルビド注射液, インタール点眼液, ホスミン点耳液, テガフルズポ, サラゾピリン坐薬, アルギニン注の 8 製剤). ③医薬品再評価により配合成分の有用性が否定された (アネステジン加ホウ砂グリセリンの 1 製剤) があげられる.

6) その他

製剤別索引は, “第 3 版” に新収載の製剤についてはゴシック体で, 第 2 版に新収載の製剤については中ゴシック体で記載した. また, 初版から削除された製剤については * マークを付すと共に初版のページを, 第 2 版から削除された製剤については ** マークを付すと共に第 2 版のページをそれぞれ掲載した.

なお, 製剤のコード番号は新収載品の増加に伴い今回新たに付け直した.

表 1. 第3版収載代表製剤総計

分類	製剤数	割合(%)
内用剤	79	9.2
注射剤	120	14.0
外用剤	562	65.7
検査・診断用剤	95	11.1
合計	856	100.0

表 3. 新収載製剤総計

分類	製剤数	割合(%)
内用剤	16	6.7
注射剤	34	14.3
外用剤	168	70.6
検査・診断用剤	20	8.4
合計	238	100.0

表 2. 第3版収載代表製剤の内訳

分類		製剤数	割合(%)	
内用剤	散剤	10	1.2	
	錠剤	28	3.3	
	カプセル剤	9	1.0	
	丸剤	1	0.1	
	液剤	31	3.6	
小計		79	9.2	
注射剤		119	14.0	
外用剤	眼科剤	点眼液	62	7.2
		眼軟膏	14	1.7
		小計	76	8.9
	耳鼻科剤	吸入剤	31	3.6
		点耳液	23	2.7
		点鼻液	5	0.6
		塗布剤	17	2.0
	小計		76	8.9
	歯科口腔剤	含嗽剤	17	2.0
		塗布剤	27	3.1
		小計	44	5.1
	皮外用剤	散布剤	7	0.8
軟膏剤		178	20.8	
塗布剤		64	7.5	
小計		249	29.1	
泌尿生殖器用剤	膀胱洗浄剤	12	1.4	
	浣腸・注腸剤	18	2.1	
	坐剤	37	4.3	
	その他	1	0.1	
	小計	68	7.9	
消毒剤・保存剤		43	5.0	
検査・診断用剤	内用剤	10	1.2	
	注射剤	50	5.8	
	点眼液	8	0.9	
	軟膏・塗布剤	17	2.0	
	その他	10	1.2	
小計		95	11.1	
その他		7	0.8	
合計		856	100.0	

表 4. 新記載製剤の内訳

分 類		製剤数	割合(%)	
内 用 剤	散 剤	3	1.3	
	錠 剤	4	1.6	
	カプセル剤	1	0.4	
	丸 剤	0	0.0	
	液 剤	8	3.4	
小 計		16	6.7	
注 射 剤		33	13.9	
外 科 剤	眼用 科剤	点 眼 液	15	6.3
		眼 軟 膏	3	1.3
		小 計	18	7.6
	耳用 鼻 科剤	吸 入 剤	18	7.6
点 耳 液		4	1.6	
点 鼻 液		1	0.4	
塗 布 剤		4	1.6	
小 計		27	11.2	
用 科 腔 剤	歯用 口 腔剤	含 嗽 剤	7	3.0
		塗 布 剤	7	3.0
		小 計	14	6.0
皮外 用 膚 剤	皮外 用 膚剤	散 布 剤	1	0.4
		軟 膏 剤	50	21.1
		塗 布 剤	16	6.7
		小 計	67	28.2
剤	泌尿 生殖 器用 官剤	膀胱洗浄剤	1	0.4
		浣腸・注腸剤	5	2.1
		坐 剤	13	5.5
		そ の 他	1	0.4
		小 計	20	8.4
消毒剤・保存剤		17	7.1	
検 査 ・ 診 断 用 剤	検 査 ・ 診 断 用 剤	内 用 剤	4	1.6
		注 射 剤	11	4.8
		点 眼 液	0	0.0
		軟膏・塗布剤	4	1.6
		そ の 他	1	0.4
小 計		20	8.4	
そ の 他		6	2.5	
合 計		238	100.0	

表 5. 削除製剤の内訳

分 類		製剤数	割合(%)	
内 用 剤	散 剤	2	1.4	
	錠 剤	5	3.4	
	カプセル剤	1	0.7	
	丸 剤	0	0.0	
	液 剤	12	8.1	
小 計		20	13.6	
注 射 剤		18	12.2	
外 科 剤	眼用 科剤	点 眼 液	15	10.2
		眼 軟 膏	4	2.7
		小 計	19	12.9
	耳用 鼻 科剤	吸 入 剤	10	6.8
点 耳 液		3	2.0	
点 鼻 液		2	1.4	
塗 布 剤		1	0.7	
小 計		16	10.9	
用 科 腔 剤	歯用 口 腔剤	含 嗽 剤	3	2.0
		塗 布 剤	11	7.5
		小 計	14	9.5
皮外 用 膚 剤	皮外 用 膚剤	散 布 剤	0	0.0
		軟 膏 剤	34	23.2
		塗 布 剤	4	2.7
		小 計	38	25.9
剤	泌尿 生殖 器用 官剤	膀胱洗浄剤	2	1.4
		浣腸・注腸剤	1	0.7
		坐 剤	8	5.4
		そ の 他	0	0.0
		小 計	11	7.5
消毒剤・保存剤		2	1.4	
検 査 ・ 診 断 用 剤	検 査 ・ 診 断 用 剤	内 用 剤	0	0.0
		注 射 剤	4	2.7
		点 眼 液	0	0.0
		軟膏・塗布剤	3	2.0
		そ の 他	1	0.7
小 計		8	5.4	
そ の 他		1	0.7	
合 計		147	100.0	

表6. 新収載製剤一覧表

(A) 内用剤 (16処方)

製剤名	主成分 (含量)	適応
〔散剤〕 (3処方)		
胆汁末 炭酸カルシウム顆粒 中性リン酸ソーダ散	ヒト胆汁 沈降炭酸カルシウム 無水リン酸2水素ナトリウム(21.7%) 無水リン酸水素2ナトリウム(78.3%)	手術までの胆汁補給 人工透析患者の高リン酸血症予防 低リン酸くる病
〔錠剤〕 (4処方)		
アスピリン50mg錠 ヨウ化カリウム錠 G錠(プラセボ錠) ジゴキシン錠	アスピリン(50mg/錠) ヨウ化カリウム(10mg I/錠) 乳糖・トウモロコシデンプン ジゴキシン(0.125mg/錠)	血栓防止 ¹³¹ I 使用検査時の甲状腺ブロック プラセボ 強心剤
〔カプセル剤〕 (1処方)		
リジン・シトルリンカプセル	リジン・シトルリン(1g・0.5g/カプセル)	アミノ酸代謝異常
〔液剤〕 (8処方)		
2.5%Eniacolyx L-KG(小児用総合感冒剤)	アルギン酸ナトリウム・リドカイン アセトアミノフェン・臭化水素酸デキストロ メトルファン・マレイン酸クロルフェニラ ミン・dl-塩酸メチルエフェドリン・カフェ イン・アスコルビン酸	食道癌の疼痛の緩解 小児用総合感冒剤
経口トロンビン用リン酸緩衝液	リン酸1水素2ナトリウム・リン酸2水素1 カリウム	トロンビンによる上部消化管出血 止血時
経口デキササルチンゼリー ジクロル酢酸水溶液 DMSOシロップ 柿のへた煎剤 バンコマイシン矯味液	デキササルチン軟膏®・精製水 ジクロル酢酸(10mg/ml) ジメチルスルホキシド(5%) 柿のへた6個以上 クエン酸・酒石酸・エタノール・単シロップ・ パラベン・水	逆流性食道炎 cytochrome c oxidase欠損症 ニーマン・ピック病(C型) 横隔膜痙攣 バンコマイシン散の矯味

(B) 注射剤 (33処方)

製剤名	主成分 (含量)	適応
新生児用アミノ酸輸液	アミノ酸18種配合	フェニルケトン尿症等アミノ酸代 謝異常
TOXY液 Cu-EDTA注射液	塩化ナトリウム・乳酸ナトリウム・ブドウ糖 Cu-EDTA(Cu 1 mg/1 A 1 ml)	急性薬物中毒に対する初期輸液 Menkes Kinky hair症候群の銅補 充療法
リン補給液II	リン酸1水素2ナトリウム・リン酸2水素1 ナトリウム(P15.5mg/1 ml)	低リン血症
Zn - Cu 注	塩化亜鉛・塩化第二銅(Zn3.09mg・Cu0.3 mg/1 A 2 ml)	高カロリー輸液施行時の微量元素 欠乏症
セレン注射液	亜セレン酸ナトリウム(Se 50µg/1 A 1 ml)	セレン欠乏症, 長期高カロリー輸 液による微量元素欠乏症
腹膜灌流液(Ca-Free)	塩化ナトリウム・塩化マグネシウム・乳酸ナ トリウム・ブドウ糖(Na ⁺ 140.5, Mg ²⁺ 1.5, Cl ⁻ 96.5, L-lactate 45.5mEq/L)	悪性腫瘍の骨転移や多発性骨髄腫 による高カルシウム血症で腎不 全を合併している患者の腹膜透 析
ADM-HPC液	塩酸ドキシソルピシン・ヒドロキシプロピルセ ルロース	膀胱腫瘍

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
EPIROS注	塩酸エピルピシン・リビオドールウルトラフ ルイド®	肝腫瘍に対する動注療法
C P L S	シスプラチン・リビオドールウルトラフ イド®	肝細胞癌, 卵巣癌に対する動注療 法
C P S	カーボンブラック・PVP	リンパ流検索用, リンパ節郭清の 指標
乳酸注射液	乳酸(0.1ml/ml)	MMC大量投与時の副作用の軽減
ヘマトポルフィリン注	ヘマトポルフィリンナトリウム(5 mg/ml)	癌のレーザー光化学治療
アンギオテンシンII注射液	アンギオテンシンII(2 µg/ml)	動脈造影時の血管収縮剤
エタノールアミノオレエート注 射液	モノエタノールアミン・オレイン酸・イオバ ミドール	食道静脈癌硬化療法の硬化剤
20%ガラクトース溶液	D-(+)-ガラクトース(200mg/ml)	ABO式血液型不適合患者の腎移 植時
30%ガラクトース注射液	ガラクトース(300mg/ml)	肝細胞代謝クリアランス用静脈負 荷試験
人工精液瘤灌流液	塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシ ウム・ブドウ糖・アルブミン・炭酸水素ナ トリウム・エリスロマイシン	精管閉塞による無精子症患者に対 し, 人工精液瘤を造設
人工髄液(No.19)	塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化マグネ シウム・塩化カルシウム・リン酸1カリウ ム・乳酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・ ブドウ糖	脳神経外科手術時の頭蓋内洗浄と 脳室灌流
CAVH置換液	塩化ナトリウム・グルコン酸カルシウム	CAVH施行時の補充液
DMSO注射液	ジメチルスルホキシド	アミロイドーシス
0.01M EDTA・2 Na	エチレンジアミン4 酢酸ナトリウム(74.4mg /1 A20ml)	重金属の解毒
トリヨードサイロニン注	トリヨードサイロニン(10µg/ml)	粘液水腫昏睡
タウリン注射液	アミノエチルスルホン酸(800mg/1 A20ml)	肝機能の改善, 体力消耗の改善等
ヒスタミン注	ヒスタミン(5 mg/1 A 5 ml)	腕神経叢麻痺
1%塩酸プロカイン注射液	塩酸プロカイン(10mg/ml)	伝達麻酔
20%イントラリピッド注(10ml)	20%イントラリピッド®100ml注 10mlずつに分割封入	内視鏡的ポリペクトミーの応用と して病変粘膜下に注入
レダコート液	酢酸トリアムシノロン(12.5mg/1 V10ml)	円形脱毛症, 痒痒のひどい皮膚病, ケロイド
リオチロニンナトリウム注射液	リオチロニンナトリウム(50µg/ml)	脳下垂体機能低下症で経口摂取不 能時
塩化メチルロザニリン注	塩化メチルロザニリン	ストーマ位置の決定
オキシリン硫酸塩注射液	オキシリン硫酸塩(100µg/ml)	¹¹¹ In標識白血球シンチグラフィ
0.42M トリツマベース注	トリツマベース(50.88mg/ml)	¹¹¹ In標識白血球シンチグラフィ
人工羊水	アミノ酸14種・塩化カリウム・塩化カルシウ ム・塩化ナトリウム・乳酸ナトリウム	羊水過少症

(C) 眼科用剤 (18処方)

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
〔点 眼 液〕 (15処方)		
0.5%硫酸ストレプトマイシン点眼液	硫酸ストレプトマイシン(5 mg/ml)	結核性強膜炎

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
4%シノミン点眼液	スルファメトキサゾールナトリウム(40mg/ml)	眼感染症(ブドウ球菌・連鎖球菌)
0.1%フロリード点眼液	ミコナゾール(1mg/ml)	角膜真菌症
フィブネクチン点眼液	患者血液(クエン酸加)	難治性角膜上皮障害
10%血清・10%コリマイC点眼液	患者血清・コリマイC点眼液(血清10倍希釈)	角膜潰瘍
1%硝酸メチルアトロピン点眼液	硝酸メチルアトロピン(10mg/ml)	有機リン中毒及びペーチェット病の眼発作
MTA ₃ 点眼液(人工涙液)	塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム・クエン酸ナトリウム・ヒドロキシエチルセルロース等	乾性角結膜炎, びまん性表層角膜炎の人工涙液
KT-1点眼液(人工涙液)	塩化ナトリウム・ポリビニルピロリドン・メチルセルロース等	涙液減少症, 角膜乾燥症
BSS(硝子体灌流液)	塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシウム・ブドウ糖・炭酸水素ナトリウム	硝子体灌流液
30%グリセリン点眼液	グリセリン(0.289ml/ml)	角膜浮腫
ヴェノピリン点眼液	アスピリンDL-リジン(45mg/ml)	角膜びらん・電気性眼炎の消炎鎮痛, コンタクトレンズ装着時の炎症改善
0.1%ピソルボン点眼液	塩酸ブロムヘキシシ(1mg/ml)	乾燥性角膜症
レプチラーゼ点眼液	レプチラーゼ注2.5倍希釈	眼内出血
1%オピゾート点眼液	塩化アセチルコリン(10mg/ml)	白内障手術時の縮腫, 角膜再生
10%ネオシネジン点眼液	塩酸フェニレフリン(100mg/ml)	手術時の散腫維持
〔眼 軟 膏〕 (3 処方)		
0.5%モダシン眼軟膏	セフトジジム・眼科用白色ワセリン(0.5%)	角膜潰瘍等の重症感染症など, 手術後の感染防止
0.2%フロリード眼軟膏	ミコナゾール・眼科用カナマイシン軟膏®(0.2%)	角膜真菌症
ゼラチン棒(ゼラチン・ロッド)	ゼラチン・硫酸ミクロノマイシン	乏涙症

(D) 耳鼻科用剤 (27処方)

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
〔吸 入 剤〕 (18処方)		
ネブライザーA液	リン酸ベタメタゾンナトリウム・エピネフリン	アレルギー性鼻炎, 耳管狭窄症, 慢性咽喉頭炎
インドメタシン吸入液	インドメタシン・リン酸緩衝液(0.035M, pH 7.4)	びまん性汎細気管支炎
鼻腔吸入液	硫酸ジベカシン・リン酸ベタメタゾンナトリウム	鼻炎, 副鼻腔炎
吸入用デカドロン	リン酸デキサメタゾンナトリウム(0.2mg/ml)	上気道炎, 急性副鼻腔炎, 急性咽喉頭炎
鼻吸入液	リン酸デキサメタゾンナトリウム・エピネフリン・硫酸アミカシン	慢性副鼻腔炎, 鼻アレルギー等
喉頭吸入液	リン酸デキサメタゾンナトリウム・塩酸ブロムヘキシシ・硫酸アミカシン	急性咽喉頭炎等
ネブライザーD液	リン酸ベタメタゾンナトリウム・硫酸ネチルマイシン	耳鼻科用ネブライザー

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
硫酸ネチルマイシン・デキサメ タゾン・ネブライザー液	デキサメタゾン・硫酸ネチルマイシン	鼻前庭及び周囲の炎症, アレルギー 性鼻炎
ゲンタマイシン・バンコマイシ ン吸入液	硫酸ゲンタマイシン・塩酸バンコマイシン	白血病患者用咽頭ネブライザー
ビスタマイシンネブライザー液 1%硫酸シソマイシン吸入液 (ベタメタゾン含有)	硫酸リボスタマイシン・エピネフリン 硫酸シソマイシン・リン酸ベタメタゾンナト リウム	副鼻腔炎, 上顎洞炎 咽頭炎, 副鼻腔炎
吸入用フォーチミシン	硫酸アストロマイシン(10mg/ml)	上気道炎, 急性副鼻腔炎, 急性喉 頭炎
ホスミシンネブライザー	ホスホマイシンナトリウム・リン酸デキサメ タゾンナトリウム・アレベール®	慢性副鼻腔炎等
フロリード吸入液 ネブライザーI液	ミコナゾール・塩酸ブロムヘキシ ン コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム・硝 酸ナファゾリン・リンデロンA液®	呼吸器内科ネブライザー 急性副鼻腔炎, 慢性副鼻腔炎の急 性増悪期
喉用ネブライザー	コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム・リ ン酸デキサメタゾンナトリウム・エピネフ リン	上気道炎等
テイカゾンブロンカスマベルナ 液	リン酸デキサメタゾンナトリウム・ブロンカ スマベルナ®	アレルギー性鼻炎, 慢性副鼻腔炎
3%プロピレングリコール液	プロピレングリコール(3%)	喀痰溶解剤(ネブライザー用)
〔点 耳 液〕(4 処方)		
キ セ イ	リドカイン・ハッカ油・液状フェノール・エ タノール	鼓膜麻酔
クロマイデキサメサゾン	リン酸デキサメタゾンナトリウム・クロラム フェニコール	中耳炎等
ペントシリンヒドロコチゾ ン液	ピペラシリンナトリウム・コハク酸ヒドロコ ルチゾンナトリウム	中耳炎, 外耳炎
ファンギゾン点耳液	アムホテリシンB(50µg/ml)	真菌感染による慢性中耳炎
〔点 鼻 液〕(1 処方)		
スノール液	塩化ナトリウム・グリセリン・ポリソルベ ート80・塩化ベンザルコニウム	いびきの軽減
〔塗 布 剤〕(4 処方)		
50%塩化第二鉄液 ナーゼン・ザルベ	塩化第二鉄(50%) 白色ワセリン・流動パラフィン・ハッカ油	鼻出血, 扁桃摘出後の止血 副鼻腔術後処置, 鼻出血
80%トリクロル酢酸	トリクロル酢酸(80%)	アレルギー性鼻炎
10%硝酸銀溶液	硝酸銀(10%)	扁桃腺炎, 鼻口腔粘膜の焼灼
(E) 歯科口腔用剤 (14処方)		
製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
〔含 嗽 剤〕(7 処方)		
0.5%塩酸テトラサイクリン含嗽 液	塩酸テトラサイクリン(5 mg/ml)	再発性アフタ
イソジン口腔洗淨液	イソジン液®50倍希釈	抜歯前の含嗽, 術後の消毒, 急性炎 症切開後の洗淨
アクリノール含嗽液	0.1%アクリノール液20倍希釈	放射線性口内炎の予防

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
2%重曹・デカドロン含嗽液	炭酸水素ナトリウム・デキサメタゾン・塩化メチルロザニリン	抗癌剤使用患者の口腔内粘膜炎
エレース含嗽液	エレース末 [®] ・アズレンスルホン酸ナトリウム・リドカイン	難治性口内炎
ザイロリック含嗽液	アロプリノール(1mg/ml)	癌化学療法における口内炎の予防
滅菌含嗽用水道水	水道水	口腔内潰瘍患者の含嗽用
〔塗 布 剤〕(7処方)		
アクリノール・ハネー	アクリノール・ハチミツ・グリセリン	口内炎, 口角びらん
0.01%アズノールグリセリン	アズレンスルホン酸ナトリウム・グリセリン(0.1mg/ml)	口内炎, 驚口瘡, 舌炎など
20%アネステジンペースト	アミノ安息香酸エチル・ポリアクリル酸ナトリウム・白色ワセリン	口腔内局所麻酔
テトラサイクリントロンピン CMC軟膏	塩酸テトラサイクリン・トロンピン末・CMC-Na・白色ワセリン	口腔内外の創傷部の治療
口腔用ファンギゾン軟膏	アムホテリシンB・アミノ安息香酸エチル・ポリアクリル酸ナトリウム・アズノール軟膏 [®]	真菌性口内炎
ADフィルム	塩酸テトラカイン・ジメチルイソプロピルアズレン・ヒドロキシプロピルセルロース・無水エタノール	広範囲の激しい痛みを伴う口腔内びらん病変
口腔用プロスタグランディン軟膏	リマプロスト α -シクロデキストリン包接化合物・デキサルチン軟膏 [®] ・ゲンタシン軟膏 [®] ・ソルコセリル軟膏 [®] ・ポリアクリル酸ナトリウム	口腔内潰瘍性口内炎

(F) 皮膚外用剤 (67処方)

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
〔散 布 剤〕(1処方)		
サリチル酸フランセチンTパウダー	サリチル酸・フランセチンTパウダー [®]	新生児臍帯の乾燥
〔軟 膏 剤〕(50処方)		
PLB軟膏	硫酸ポリミキシンB・ゾンネベース [®] (12,000単位/g)	熱傷
バニマイシン・ソルベース	硫酸ジベカシン・マクロゴール軟膏	緑膿菌感染症
ミノマイシンアネステジン軟膏	塩酸ミノサイクリン・アミノ安息香酸エチル軟膏 [®]	放射性皮膚炎後の潰瘍部
アクネCLDクリーム	塩酸クリンダマイシン・プレドニゾロン・プロピオン酸エストリオール・吸水軟膏	尋常性痤瘡
1%クリンダマイシン軟膏	塩酸クリンダマイシン・親水軟膏(1%)	尋常性痤瘡
NET軟膏	硫酸ネチルマイシン・エレース軟膏 [®] ・テラジアバスタ [®]	熱傷創, 感染創
塩酸バンコマイシン軟膏	塩酸バンコマイシン・親水軟膏	化膿性股関節炎におけるMRSAの感染治療
0.4%フォーチミシン軟膏	硫酸アストロマイシン・白色ワセリン(0.4%)	乳癌術後の感染予防, 熱傷, 創傷, 皮膚炎

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
ネチリンC-1, C-2軟膏	硫酸ネチルマイシン・コリスチンメタンスルホン酸ナトリウム・精製ラノリン・白色ワセリン	熱傷
0.3%タリビッドエレース	オフロキサシン・エレース軟膏 [®]	熱傷, 褥創
2%アスピリン軟膏	アスピリン・フラスチベース [®]	帯状疱疹後神経痛
0.025%カフサイシン親水軟膏	カフサイシン・親水軟膏(0.025%)	疱疹後神経痛
ゲーベンシュガー軟膏	白糖・ゲーベッククリーム [®]	褥瘡, 難治性潰瘍
0.5%アドリアシン軟膏	塩酸ドキシソルピシン・親水ホロイド [®] (0.5%)	再発性乳癌の皮膚転移
0.5%アドリアシン軟膏	塩酸ドキシソルピシン・ヒアルロニダーゼ・ゾンネベース [®]	皮膚癌, 乳癌
アドリアシン軟膏	塩酸ドキシソルピシン・アズノール軟膏 [®] (0.04%)	炎症性乳癌
DMSO軟膏	ジメチルスルホキシド・親水軟膏(20%)	アミロイドーシス
5%エナルモン軟膏	エナント酸テストステロン・吸水軟膏(5%)	尿道下裂の極小陰茎
2%テストステロン軟膏	エナント酸テストステロン・白色ワセリン(2%)	外陰ジストロフィー
0.3%チガゾン吸水軟膏	エトレチナート・吸水軟膏(0.3%)	扁平苔癬
1%(3%)アントラリン親水軟膏	アントラリン・親水軟膏(1%・3%)	乾癬
2%アントラリン軟膏	アントラリン・サリチル酸・固形ハラフィン・コーンスターチ・白色ワセリン	尋常性乾癬
二硫化セレン軟膏	二硫化セレン・サリチル酸・スルフイソキサゾール・ゾンネベース [®]	にきび
イオウ・レゾルシン・ワセリン	沈降硫黄・レゾルシン・ヒマシ油・白色ワセリン	尋常性乾癬, 脂漏性湿疹
GHパスタ	酸化亜鉛・トウモロコシデンファン・黄色ワセリン・親水ホロイド [®] ・スクワラン・ハラフィン	脂漏性湿疹, 慢性湿疹, 汗疹, おむつかぶれ
0.5%グリテールワセリン	グリテール [®] ・白色ワセリン(0.5%)	紅斑症, 紅皮症
1%イクタモール亜鉛華単軟膏	イクタモール・亜鉛華単軟膏(1%)	湿疹, 皮膚炎
0.5%リバカーボワックス	アクリノール・マクロゴール軟膏(0.5%)	発赤, 小水疱, びらん, 潰瘍
0.1%RCW-E	アクリノール・エレース末 [®] ・マクロゴール軟膏	皮膚びらん, 潰瘍
0.1%ピオクタニンワセリン	塩化メチルロザニリン・白色ワセリン(0.1%)	股間, 背部びらん部塗布
ヒドロキノン軟膏	ヒドロキノン・アスコルビン酸・乳剤性軟膏基剤	難治性色素沈着症
2%・5%ハイドロキノンプラスチックベース	ヒドロキノン・アスコルビン酸・フラスチベース	肝斑, 尋常性白斑
メタコリン軟膏	塩化メタコリン・サリチル酸フィゾスチグミン・親水軟膏	先天性無汗無痛覚症等汗腺組織の低形成
エレース・インシュリン軟膏	インスリン亜鉛水性懸濁注・エレース軟膏 [®]	糖尿病の瘡疽, 皮膚潰瘍
5%L-フロリン・グリシン軟膏	L-フロリン・グリシン・白色ワセリン	フロリターゼ欠損症における皮膚疾患の改善
アクトシン軟膏	ブクラデシンナトリウム・マクロゴール軟膏(3%)	全身性強皮症による難治性潰瘍
10%コレステロール軟膏	コレステロール・親水軟膏(10%)	伴性遺伝性魚鱗癬

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
ビタミンEクリーム	酢酸トコフェロール・剤剤性軟膏基剤(1%)	ステロイド剤塗布療法のち脱ステロイド皮膚保護剤として用いる
ビタミンD ₃ 軟膏	カルシトリオール・白色ワセリン	乾癬
乳傷膏M	アンピシリン・クロキサシリン・リン酸ベタメタゾンナトリウム・マクロゴール軟膏	乳腺炎等
凍傷軟膏	d-カンフル・クレオソート・ペルーバルサム・黄色ワセリン	水疱性, 潰瘍性凍瘡
カンファ・レシチン・ワセリン	カンフル・レシチン・白色ワセリン	しもやけ, 多形浸出性紅斑, 薬疹
I. L. S. R	トラゾリン・ルチン・マクロゴール400・親水軟膏	しもやけ
3%サリチル酸ワセリン	サリチル酸・白色ワセリン(3%)	角皮症
脱毛クリーム	チオグリコール酸カルシウム・水酸化カルシウム・グリセリン・親水軟膏	多毛症
7%リドカインクリーム	リドカイン・クリーム基剤(7%)	レーザー皮膚剥離手術時の麻酔, ドライアイス圧抵法の代用
アルミニウム特殊軟膏	アルミニウム末・キシロカインゼリー [®] ・チンク油・亜鉛華軟膏	人工肛門周囲のびらん
ゼブリヒド軟膏	次没食子酸ビスマス・亜鉛華デンブン・精製ラノリン・オリブ油	褥瘡, 人工肛門周囲のびらん
人工肛門軟膏	酸化亜鉛・テブレノン・リフラップ軟膏 [®] ・プラスチックベース [®] ・マクロゴール軟膏	人工肛門周囲のびらん
アルキサトラジロール	酸化亜鉛・リフラップ軟膏 [®] ・プラスチックベース [®] ・アプロチニン・アルキサ軟膏 [®]	人工肛門周囲のびらん
〔塗布剤〕(16処方)		
アクネローション	クエン酸・ホウ酸・塩酸ホモスルファミン・フェノールスルホン酸亜鉛・メタ重亜硫酸ナトリウム・エタノール	尋常性瘰癧
BPローション	過酸化ベンゾイル(1%, 1.5%)	瘰癧
SADBE液	squaric acid dibutyl-ester・アセトン(2%, 0.1%, 0.01%, 0.0001%)	円形脱毛症
シクロスボリン外用液	シクロスボリン・イソプロパノール(2.5mg/ml)	全頭脱毛症
カルシトリオール液	カルシトリオール(1.5μg/ml)	難治性乾癬
F D S	硝酸ミコナゾール・ジメチルスルホキシド	爪のカンジダ症, 白癬症
10%ハッカ油加オリブ油	ハッカ油・オリブ油	皮膚癢痒症の止痒剤
MTGイソプロパノール	メントール・チモール・グリセリン・イソプロパノール	皮膚癢痒症
ヨモギローション	ヨモギ液・メントール・エタノール	止痒剤
アスピリン・クロロホルム	アスピリン・クロロホルム(12mg/ml)	帯状疱疹後神経痛の疼痛緩和
デュオフィルム	サリチル酸・乳酸・ヒマシ油・コロジオン	水いぼ
アセモール	硫酸アルミニウムカリウム・サリチル酸・酸化亜鉛・タルク・エタノール・メントール等	あせも
MonseI's solution	硫酸・硝酸・硫酸第二鉄	子宮頸部上皮内腫瘍レーザー治療直後に塗布
ボスミン液	ボスミン液 [®] 7倍希釈	血管収縮(充血除去, 止血)

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
アクロマイ・リンデロンオリブ油 ワルツ水	塩酸テトラサイクリン・リンデロンVG軟膏®・ 白色ワセリン・オリブ油 アミノ安息香酸エチル・タンニン酸・グリセリン	婦人科における瘻孔の治療 授乳婦の乳頭保護剤

(G) 泌尿生殖器官および肛門用剤 (20処方)

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
〔膀胱洗浄剤〕 (1処方)		
膀胱洗浄用イソジン液	ポビドンヨード(イソジン液®20倍希釈)	膀胱洗浄
〔洗腸・注腸剤〕 (5処方)		
リンデロンゼリー 4%石ケン洗腸液 5 アミノサリチル酸注腸液 注腸用PAS 3.75%CMC注腸用液	リン酸ベタメタゾンナトリウム(0.02mg/ml) ラウリル硫酸ナトリウム(40mg/ml) 5-アミノサリチル酸(40mg/ml) ハラアミノサリチル酸ナトリウム・0.25%ニ 酸化ケイ素散 カルボキシメチルセルロースナトリウム(37.5 mg/ml)	放射線照射後の直腸炎 洗腸 直腸炎・左側大腸炎・全大腸炎型 の潰瘍性大腸炎 左側潰瘍性大腸炎 放射線による直腸潰瘍
〔坐 剤〕 (13処方)		
5-FU坐薬 シスフラチン坐薬 AB-PC錠 フロゲステロン坐薬 RA-200坐薬 フェノバルビタール坐薬 メフェナム酸坐薬 ナイキサン坐薬 モルヒネ・インドメタシン坐剤 ブフレノルフィン坐剤 リマクタン坐薬 中空坐剤外型 フラセボ坐薬	フルオロウラシル(100mg/個) シスフラチン(20mg/個) アンピシリン(100mg/個) フロゲステロン(25mg/個) チオヘンターールナトリウム・硫酸アトロピン (200mg/個) フェノバルビタール(5mg/個) メフェナム酸(2mg/個) ナフロキセン(300mg/個) 塩酸モルヒネ10mg・インドメタシン50mg/個 塩酸ブフレノルフィン(0.3mg/個) リファンピシン(150mg/個) ウイテフゾール(ホスコH-15®) ウイテフゾールW35	子宮癌 子宮癌 GBS感染症 黄体機能不全患者へのホルモン補 給 小児の基礎麻酔 痙攣発作(新生児・未熟児) 極小未熟児の動脈管開存症 消炎、鎮痛、解熱(特に腫瘍熱) 癌末期の疼痛緩和 癌性疼痛、術後疼痛 結核 坐薬の基剤 インドメタシン坐薬のフラセボ
〔そ の 他〕 (1処方)		
5-FUエマルジョン	フルオロウラシル(3.35mg/ml)	子宮癌

(H) 消毒剤・保存剤 (17処方)

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
ベスハス 酢酸バンド水 酢酸水溶液 マーキュロ水 マーキュロアルコール 3倍ピロゾン オキシフル生食	塩化ベンザルコニウム・エタノール 酢酸アルミニウム(20%) 氷酢酸(4%) マーキュロクロム(2%) マーキュロクロム・アセトン・エタノール オキシドール3倍希釈 オキシドール・生理食塩液	手指消毒 局所洗浄・消毒 膀胱時の膀胱殺菌 皮膚、粘膜消毒、創面消毒 皮膚消毒 創面の殺菌・消毒 創面の消毒、器具洗浄、含嗽等

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
リバノール水 三色(素)液	アクリノール(0.1%) ゲンチアナバイオレット・ブリアントグリー ン・アクリノール	化膿局所の消毒, 化膿予防 新生児の臍帯ヘルニア, 第II度熱 傷の皮膚消毒
イソジングリセリン液 オスバングリセリン	イソジン液®・グリセリン(0.5%・1%) オスバン液®・グリセリン(0.02%)	自己導尿カテーテルの消毒 自己導尿カテーテルの潤滑, 消毒, 保存
塩化ベンゼトニウムゼリー 膀胱鏡粘滑剤	ハイアミン液®(0.025%) トラガント末・グリセリン・液状フェノール・ 精製水	ヒビテン産科用クリームの代替品 膀胱鏡挿入時の粘滑剤
DMSO液 精子洗浄液	ジメチルスルホキシド・生理食塩液(10%) Na, K, Ca, Mg, Cl, HCO ₃ , phosphate等の 電解質・Percoll®・HEPES・ブドウ糖・人 血清アルブミン・抗生物質等	骨弁の保存 男子不妊症における精液性状不良 症例の治療
HTF-Medium(IVF用)	Na, K, Ca, Mg, Cl, HCO ₃ , phosphate, lactate, sulfate等の電解質・D-グルコース・ヒルビ ン酸ナトリウム・抗生物質等	in vitro fertilization(IVF)用の洗 浄液, 培養液
潤滑キシロカインゼリー	キシロカインゼリー®・グリセリン	男性膀胱鏡前の尿道麻酔

(1) 検査・診断用剤 (20処方)


製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
〔内 用 剤〕(4 処方)		
PABA内服液	P-アミノ安息香酸(169.5mg/10ml)	PABA吸収試験(消化吸収障害の 診断)
10%内服用脂肪乳剤(胃部CT撮 影用)	大豆油(10%)	胃部CT撮影用
25%硫酸マグネシウム 1%BB液	硫酸マグネシウム(25%) ブリアントブルー(1%)	十二指腸ゾンデ法による胆汁採集 胃疾患における色素内視鏡検査用
〔注 射 剤〕(11 処方)		
滅菌インクレミン液	インクレミンシロップ®(10%)(溶性ピロリン 酸第2鉄3mMol/L)	造影剤
微粒子活性炭CH-40懸濁液	ミツビシ#40炭素(1%)	胃癌手術における胃リンパ流路の 確認
リビオドール・アドリアマイシ ンエマルジョン	塩酸ドキシソルピシン・リビオドールウルトラ フルイド	悪性腫瘍の診断
リビオドール・マイトマイシ ンエマルジョン	マイトマイシンC・リビオドールウルトラフル イド	悪性腫瘍の診断
0.1Mリン酸バッファー注射液	リン酸水素2ナトリウム(2.87%)・リン酸2 水素ナトリウム(0.33%)	尿細管性アシドーシス負荷試験
5%塩酸チラミン注	塩酸チラミン(5%)	自律神経機能検査
0.1%HCO ₂ -60皮内テスト液	ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油60(0.1%)	ビタミンK ₂ 注皮内テスト
4%硫酸ナトリウム注射液	硫酸ナトリウム(4%)	尿細管性アシドーシス負荷試験
ソマトスタチン注射剤	ソマトスタチン(0.25mg/ml)	インスリン感受性試験
30%膀胱注入用乳剤	重質流動パラフィン・ツイン・スパン	膀胱CT撮影用
イソペークCMC-Na液	イソペーク280®・カルボキシメチルセルロー スナトリウム	尿道造影剤

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
〔軟膏・塗布剤〕(4処方)		
0.3%コンゴーレッド液・0.5% 重曹液 トルイジンブルー液 1%硝酸ナトリウム液 リオチロニンナトリウム液	コンゴーレッド(0.3%)・炭酸水素ナトリウム (0.5%) トルイジンブルー(2%) 硝酸ナトリウム(1%) リオチロニンナトリウム(0.1%)	胃切除時の診断用 色素散布法による胃内視鏡検査 イオントフォレーシスの対極用溶 液 下垂体灌流実験
〔そ の 他〕(1処方)		
塩化メタコリン吸入液	塩化メタコリン(25000 μ g/ml~49 μ g/ml)	気道過敏性検査

(J) その他 (6処方)

製 剤 名	主 成 分 (含量)	適 応
骨 ろ う 滅菌ワセリンガーゼ 滅菌エキザルベガーゼ 重曹加食塩水浴用剤 温研ハップ 青酸中毒セット	サラシミツロウ・オリブ油・フェノール 尺角ガーゼ・白色ワセリン エキザルベ®・局方ガーゼ 塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化カルシ ウム・炭酸水素ナトリウム 精製イオウ・酸化カルシウム 亜硝酸アミル・亜硝酸ナトリウム・チオ硫酸 ナトリウム	骨切断面の止血 熱傷創面などの保護 第II度熱傷創面に貼布 熱傷の温水療法 乾癬 青酸中毒

自然な眠りです



睡眠導入剤

第Ⅰ種
第Ⅱ種
レンドルミン®錠
(プロチゾラム)

■効能・効果
不眠症、麻酔前投薬

※用法・用量、使用上の注意等については添付文書をご確認ください。

〔資料請求先〕
日本ベリンガーインゲルハイム株式会社 学術部
〒606-01 川西市矢間高田103



製造
日本ベリンガーインゲルハイム株式会社
川西市矢間高田103



販売
田辺製薬株式会社
大阪市中央区通修町3-2-10



販売
大日本製薬株式会社
大阪市中央区通修町2-6-8



販売
三亜薬品工業株式会社
東京都中野区鷺宮3-13-6